一般演題 (E ポスター)

セッション 1	手術療法	P-1-1	－	P-1-26
セッション 2	頸部郭清術	P-2-1	－	P-2-2
セッション 3	再建	P-3-1	－	P-3-15
セッション 4	咬合再建 (インプラント、顎補綴など)	P-4-1	－	P-4-4
セッション 5	化学療法	P-5-1	－	P-5-11
セッション 6	放射線療法	P-6-1	－	P-6-9
セッション 7	化学放射線療法	P-7-1	－	P-7-12
セッション 8	分子標的	P-8-1	－	P-8-13
セッション 9	臨床統計	P-9-1	－	P-9-35
セッション 10	支持療法	P-10-1	－	P-10-3
セッション 11	リハビリ・嚥下	P-11-1		
セッション 12	画像診断	P-12-1	－	P-12-9
セッション 13	病理	P-13-1	－	P-13-22
セッション 14	前癌病変	P-14-1	－	P-14-4
セッション 15	周術期口腔管理	P-15-1	－	P-15-5
セッション 16	バイオマーカー	P-16-1	－	P-16-6
セッション 17	遺伝子	P-17-1		
セッション 18	腫瘍免疫	P-18-1	－	P-18-2
セッション 19	その他	P-19-1	－	P-19-38

P-1-1

舌および脳実質に同時に転移を認めた腎細胞癌の 1 例

Simultaneous Metastases of Renal Cell Carcinoma to the Tongue and the Brain

- 金丸 健太¹、内堀 雅博¹、逢坂 竜太¹、吉田 佳史¹、関根 理予¹、鈴木 崇嗣¹、加藤 久視¹、佐々木 剛史¹、大鶴 光信¹、青木 隆幸¹、太田 嘉英¹、金子 明寛¹、秋庭 健志²

¹ 東海大学医学部付属病院 口腔外科、
² 東海大学医学部 放射線治療科

Kenta Kanamaru¹, Masahiro Uchibori¹, Ryuta Osaka¹, Yoshifumi Yoshida¹, Riyo Sekine¹, Takatsugu Suzuki¹, Hisashi Katou¹, Masashi Sasaki¹, Mitsunobu Otsuru¹, Takayuki Aoki¹, Yoshihide Ota¹, Akihiro Kaneko¹, Takeshi Akiba²

¹Department of Oral Surgery, Tokai University, School of Medicine, Kanagawa, Japan, ²Department of Radiation Oncology, Tokai University School of Medicine, Kanagawa, Japan

【諸言】悪性腫瘍の他臓器からの口腔領域への転移は非常にまれである。頻度の高い転移部位は下顎骨や歯肉であり、舌への転移は全体の 0.2% といわれている。今回われわれは、腎細胞癌の舌および脳への同時転移を認め、転移巣の同時切除を行った 1 例を経験したのでその概要を報告する。【症例】患者:69 歳、女性。2015 年 2 月に右腎細胞癌 (cT2aN0M1 stage4) の診断の下に、当院泌尿器科にて右腎摘除術を施行。2015 年 7 月上旬より左舌縁部の灼熱感を主訴に当科初診となった。現症:左舌縁部に正常粘膜に被覆された 20×5mm 大の硬結を伴う外向性腫瘍が認められた。造影 CT では造影効果を伴わず、周囲組織との境界は不明瞭であった。頸部リンパ節の有意な腫大は認められなかった。舌超音波検査では左舌縁部に 19×7×7mm 大と 9×4mm 大の 2 つの低エコー腫瘍が連なって描出された。生検にて腎細胞癌舌転移の診断を得た。【処置および経過】当科での精査期間中にオートバイで転倒し、右半身の痺れを自覚。当院脳神経外科を受診、CT にて右後頭葉に 30mm 大の腫瘍性病変が認められ、腎細胞癌の脳への転移が疑われた。2015 年 8 月上旬に全身麻酔下に当科での舌部分切除術と脳神経外科での開頭腫瘍切除術を同時に施行した。病理組織学的診断にて、切除された舌、脳の病変はいずれも腎細胞癌の転移であった。現在術後一カ月経過したが、再発・転移を認めず経過良好である。

P-1-3

当科における複数回皮弁再建の検討

Multiple free flap reconstruction of the oral cancer

- 望月 裕美、島本 裕彰、富岡 寛文、平井 秀明、原田 浩之
東京医科歯科大学大学院歯学総合研究科 顎口腔外科学分野

Mochizuki Yumi, Shimamoto Hiroaki, Hirofumi Tomioka, Hideaki Hirai, Hiroyuki Harada
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Tokyo Medical and Dental University

口腔癌において皮弁移植を行う機会は増えているが再発、術後合併症などのために複数回の皮弁再建を行う場合も少なくない。そこで当科における症例を検討した。2004 年 1 月から 2015 年 6 月までに当科で頭頸部悪性腫瘍切除後の皮弁再建を施行した 434 例のうち複数回行った症例 26 例を対象とした。原発部位は下顎歯肉 18 例、頬粘膜 4 例、舌 3 例、口底 1 例で、病理診断は扁平上皮癌 24 例、粘表皮癌 1 例、低悪性型筋線維芽細胞肉腫 1 例であった。2 回目の再建要因は再発 13 例、皮弁壊死 6 例、プレート破折・露出 3 例、口腔皮膚瘡 3 例、形態修正 1 例で、使用皮弁は肩甲骨皮弁 9 例、前腕皮弁 6 例、腹直筋皮弁 6 例、大胸筋皮弁 4 例、広背筋 1 例であった。3 回目再建要因は再発 3 例、下顎欠損部の骨移植 1 例で、腹直筋皮弁 2 例、肩甲骨皮弁 1 例、肩甲骨広背筋皮弁 1 例で再建され、4 回目再建は再発 1 例で前外側大腿皮弁 1 例が施行された。術後合併症として 2 回目再建後に静脈血栓 1 例、感染(MRSA)3 例、口腔皮膚瘡 1 例を認め、3 回目以降の再建症例には合併症は認めなかった。感染 3 例のうち 2 例は感染 (MRSA) の既往が術前にあった。2 回目以降の再建 31 皮弁のうち有茎皮弁 5 例 (大胸筋 4 例、広背筋 1 例)を除く 26 皮弁について血管吻合側は患側 12 皮弁、健側 14 皮弁で、血栓 1 例は健側頸部吻合で生じていた (1/14 例 7.7%)。

P-1-2

舌部分切除術における吸収性ポリグリコール酸シートと自己血由来フィブリン糊を用いた創部処置に関する臨床統計学的検討

Clinical evaluations of autologous fibrin glue and polyglycolic acid sheets as oral surgical wound coverings after partial glossectomy

- 瀧野 衆、野上 晋之介、森 士朗、山内 健介、橋元 亘、宮下 仁、高橋 哲

東北大学大学院歯学研究科 口腔病態外科学講座顎顔面・口腔外科学分野

Atsumo Kouketsu, Shinnosuke Nogami, Shiro Mori, Kensuke Yamauchi, Wataru Hasimoto, Hitoshi Miyashita, Tetsu Takahashi
Division of Oral and Maxillofacial Surgery, Department of Oral Medicine and Surgery, Tohoku University Graduate School of Dentistry, Miyagi, Japan

【緒言】近年、口腔外科手術における組織欠損部に対して吸収性ポリグリコール酸シート (PGA シート) とヒト血液由来フィブリン糊スプレーによる創部被覆法が頻用される。自己血由来のフィブリン糊は、種々の感染症やアレルギーのリスクを回避でき、安価である。今回われわれは、PGA シートと自己血由来フィブリン糊を用いた創部被覆法の予後因子について臨床統計学的に検討した。【対象・方法】症例は 2013 年 1 月から 2015 年 2 月までの間に当科において舌腫瘍切除後に、PGA シートを貼付した計 35 例とした。自己血由来フィブリン糊を用いた創部被覆法は、種々の感染やアレルギーのリスクを回避でき、安価である。今回われわれは、PGA シートと自己血由来フィブリン糊を用いた創部被覆法の予後因子について臨床統計学的に検討した。【対象・方法】症例は 2013 年 1 月から 2015 年 2 月までの間に当科において舌腫瘍切除後に、PGA シートを貼付した計 35 例とした。自己血由来フィブリン糊を用いた創部被覆法は、種々の感染やアレルギーのリスクを回避でき、安価である。今回われわれは、PGA シートと自己血由来フィブリン糊を用いた創部被覆法の予後因子について臨床統計学的に検討した。【結果】PGA シート平均付着日数は A 群で 24.8 日、B 群で 25.3 日であり有意差を認めず、手術時間、術後疼痛 (NRS)、経口摂取量、舌運動機能にも有意差を認めなかった。B 群の 1 例において縫合処置を有する術後出血を認め、A 群の 2 例において創部より肉芽増生を認めた。【結論】本法は十分な止血凝固作用と生体接着効果を有し、安全に施行できる創部処置法であり、今後口腔外科領域における使用拡大が期待できる。

P-1-4

多発性骨転移を生じた下顎転移性エナメル上皮腫の一例

A case of metastasizing ameloblastoma of the mandible occurring multiple bone metastases

- 宮崎 亮、中井 史、中井 康博、岩崎 昭憲、小川 尊明、大林 由美子、三宅 実

香川大学医学部 歯科口腔外科学講座

Ryo Miyazaki, Fumi Nakai, Yasuhiro Nakai, Akinori Iwasaki, Takaaki Ogawa, Yumiko Ohbayashi, Minoru Miyake
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Medicine, Kagawa University

患者:73 歳、女性。主訴:右側下顎骨精査。現病歴:2014 年 3 月、下顎骨の疼痛を自覚し紹介医受診した。左側下顎 34 の抜歯、抜歯窩から生検を行い、エナメル上皮癌が疑われたため、5 月、当科を紹介され受診した。既往歴:2 型糖尿病、深部静脈血栓症、脳動脈瘤。画像所見:CT では右側下顎枝から右側下顎前歯部にかけて皮質骨の破壊と骨髄の粗造化を認め、左側下顎前歯部から左側下顎小白歯部にかけて多房性嚢胞性病変を認めた。FDG-PET では右側下顎枝から左側下顎白歯部に至る下顎骨、右乳腺及び S 状結腸に FDG 集積を認めた。経過:紹介医にて作成された組織標本は当院病理診断科にてエナメル上皮腫と再診断された。2014 年 6 月再度当科にて右側下顎白歯部より組織生検を施行し、線維増生が認められ、化骨性線維腫が疑われた。エナメル上皮腫と化骨性線維腫の混合病変の臨床診断にて全身麻酔下に右側下顎骨辺縁切除術を施行し、病理診断はエナメル上皮腫であった。また同月当院消化器内科にて内視鏡下に大腸癌の切除を行った。7 月、当院乳腺内分泌外科にて右側乳癌 TisNOMO に対し右乳房部分切除術、センチネルリンパ節生検、術後放射線治療 (50Gy/25fr) を施行した。2015 年 7 月撮影した骨シンチにて左肩甲骨、両側肋骨、頸椎、胸椎、両腸骨、仙骨に集積を認め、左腸骨より骨生検施行したところ、生検組織よりエナメル上皮腫に類似した像が認められたため、エナメル上皮腫の多発骨転移と診断した。

P-1-5

遊離植皮術におけるボタンの使用による tie-over 法の工夫
Improvement of tie-over method by the use of buttons in the free skin graft surgery

- 高橋 理¹、笹栗 正明¹、上原 雅隆¹、土生 学¹、吉賀 大午¹、
田中 純平²、早川 真奈¹、吉岡 泉²、富永 和宏¹

¹九州歯科大学歯学部歯学科 生体機能学講座顎顔面外科学分野、

²九州歯科大学歯学部歯学科 生体機能学講座口腔内科学分野

Osamu Takahashi¹, Masaaki Sasaguri¹, Masataka Uehara¹, Manabu Habu¹,
Daigo Yoshiga¹, Junpei Tanaka², Mana Hayakawa¹, Izumi Yoshioka²,
Kazuhiro Tominaga¹

¹Department of Science of Physical Functions Division of Oral and Maxillofacial Surgery, Kyushu Dental University, Kitakyushu, Japan, ²Department of Science of Physical Functions Division of Oral Medicine, Kyushu Dental University, Kitakyushu, Japan

【緒言】遊離植皮術は移植皮片を生体より完全に離断し、これを移植する方法である。他の臓器移植と異なり、主要血管の吻合術を行わないため、術後の植皮片の固定が不十分なときは、植皮片が移動し生着の必須条件である植皮片への血行再開は破壊し壊死に陥ってしまう。植皮片の移動の防止には一般的に tie-over 法が広く用いられている。しかし複雑な形態や曲面においては圧迫固定が不十分になるという欠点が挙げられる。今回われわれは、tie-over 法にボタンによる圧迫を追加し、植皮片の移動を防止する方法を考案したので報告する。【材料および方法】本方法は通常の tie-over 方法と同様に、植皮片を縫合した糸を切らずに残した状態で、植皮片中央と口腔外にボタンを配置し、3-0 ナイロン糸で全てを貫通させボタンを固定する。その後口腔内の植皮片上のガーゼ塊もナイロン糸を貫通させ、ガーゼの上でそれぞれの糸を結び固定する。【結論】今回われわれが行った tie-over 法は強固にガーゼを固定し、植皮片の生着に有用であると考えられた。

P-1-7

口蓋に発生した線維形成性線維芽細胞腫の1例
A case of desmoplastic fibroblastoma in the palatal area

- 小林 泰、大井 一浩、平井 真理子、木村 依世、北原 寛子、
野口 夏代、加藤 広禄、川尻 秀一

金沢大学医薬保健研究域医学系がん医科学専攻 細胞浸潤学分野

Yutaka Kobayashi, Kazuhiro Ooi, Mariko Hirai, Iyo Kimura, Hiroko Kitahara,
Natsuyo Noguchi, Koroku Kato, Shuichi Kawashiri
Department of Cell & Tissue Biology, Division of Cancer Medicine, Kanazawa University Graduate School of Medical Science, Ishikawa, Japan

線維形成性線維芽細胞腫は、線維芽細胞と筋線維芽細胞由来の良性腫瘍で、頭頸部領域は好発部位の1つであるが、口腔内に生じることが極めて稀である。今回われわれは口蓋に生じた線維形成性線維芽細胞腫の1例を経験したので、その概要を報告する。患者は33歳の女性で、10年前から口蓋の腫瘍を自覚していたが放置していた。平成26年10月に近医歯科を受診した際に同部の腫瘍を指摘され、同年11月に当科を紹介受診となった。既往歴・家族歴、全身所見に特記事項はなかった。左側口蓋に、20×20mm大の有茎性で弾性軟の腫瘍性病変が認められた。CT像では内部は均一で、腫瘍と接する骨に吸収像はなく、所属リンパ節にも異常所見は認められなかった。口蓋良性腫瘍の臨床診断のもと、手術を行う方針となったが、授乳中であったため、卒乳後の平成27年6月に全身麻酔下に腫瘍摘出術を行った。腫瘍の有茎部周囲の健常組織を含めて骨膜上で摘出し、術中迅速病理組織診断を行い、線維腫の診断を得た。創部に保護床を装着して、手術を終了した。摘出標本では、上皮下で密な膠原繊維が増加しており、淡好塩基性間質の混在が認められ、紡錘形細胞は小型で異型に乏しく、細胞密度は低かった。術後の病理組織診断は、線維形成性線維芽細胞腫であった。術後1週で保護床を除去し、術後1か月で創部は上皮化した。術後3か月が経過した現在、再発の所見はなく、経過良好である。

P-1-6

頬粘膜に発生した線維腫症の1例
A case of fibromatosis occurred in the buccal mucosa

- 千葉 卓¹、古城 慎太郎¹、阿部 亮輔¹、阿部 亜希¹、
山谷 元気¹、中畑 健太郎¹、水城 春美^{1,2}、泉澤 充²、
武田 泰典³

¹岩手医科大学歯学部 口腔顎顔面再建学講座口腔外科学分野、

²岩手医科大学歯学部 口腔顎顔面再建学講座歯科放射線学分野、

³岩手医科大学歯学部 病理学講座病態解析学分野

Suguru Chiba¹, Shintarou Kogi¹, Ryouyusuke Abe¹, Aki Abe¹, Genki Yamaya¹,
Kentarou Nakahata¹, Harumi Mizuki^{1,2}, Mitsuru Izumisawa², Yasunori Takeda³
¹Division of OMS, Dept of Reconstructive OMS, School of Dentistry, Iwate Medical University, Iwate, Japan, ²Division of Dental Radiology, Dept of Reconstructive OMS, School of Dentistry, Iwate Medical University, Iwate, Japan, ³Division of Anatomical and cellular Pathology, Dept of Pathology, School of Dentistry, Iwate Medical University, Iwate, Japan

【緒言】線維腫症は、異型に乏しい線維芽細胞/筋線維芽細胞の増殖からなり、組織学的に同様の形態を呈する一群の疾患で、口腔領域での発生は非常に稀である。今回われわれは頬粘膜に発生した表在性線維腫症の1例を経験したので報告する。【症例】60歳代女性。【主訴】右側頬粘膜の腫瘍。【既往歴】腎盂炎、虫垂炎、白内障。【現病歴】平成24年6月上旬から右側頬粘膜部の無痛性の腫瘍を自覚し、近医受診したところ当科での精査を勧められ紹介受診。腫瘍の大きさに変化は認めなかった。【現症】右側頬粘膜に弾性硬で表面粘膜色の約8mm大の腫瘍を認めた。【画像所見】MRIにて右側上顎白歯後部部に12×12×14mmの境界明瞭な造影増強効果を伴う腫瘍性病変を認めた。【処置及び経過】画像検査からは良悪の鑑別が判然とせず、平成24年8月全身麻酔下に生検を兼ね右側頬粘膜腫瘍切除術を施行した。術後、創の治癒は良好で、切除組織の病理組織学的診断は線維腫症であった。術後約1年半経過し、再発は認めていない。【考察】本腫瘍は病理組織学的には間葉系紡錘形細胞の増殖が主体で、境界不明瞭な結節を形成するため、他の疾患との鑑別には免疫組織学的検索を含め慎重な検討を行うことが重要である。また線維腫症は良性腫瘍性病変に分類されているが、なかには局所再発率が高いものも認められるため、病変の確実な切除や術後の十分な経過観察も必要であると考えられた。

P-1-8

上顎に生じた原発性骨内扁平上皮癌の1例
A case of Primary intraosseous squamous cell carcinoma in Maxilla

- 太田 貴久¹、江原 雄一²、足立 誠²、本橋 征之²、
村松 泰徳¹、住友 伸一郎²

¹朝日大学歯学部附属村上記念病院 歯科口腔外科、

²朝日大学歯学部 口腔病態医療学講座口腔外科

Takahisa Ohta¹, yuichi Ehara², Makoto Adachi², Masayuki Motohashi²,
Yasunori Muramatsu¹, Shinichiro Sumitomo²
¹Department of Oral and maxillofacial surgery, Asahi University School of Dentistry Murakami Memorial Hospital, Gifu, Japan, ²Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Asahi University, School of Dentistry

原発性骨内扁平上皮癌 (Primary intraosseous squamous cell carcinoma, PIOSCC) は極めて稀な歯原性悪性腫瘍の一つで、顎骨中心性に存在する歯原性上皮あるいは上皮遺残から発生する口腔粘膜との連続性がなく、他臓器からの転移ではないものと定義され、さらに亜分類として充実型、角化嚢胞性歯原性腫瘍由来、歯原性嚢胞由来に分けられている。今回、われわれは上顎に生じた歯原性嚢胞由来の PIOSCC を経験したため、その概要を報告する。患者は55歳男性。2014年6月にかかりつけ歯科医院にて左側上顎第一大臼歯の根尖性歯周炎と診断され同歯を抜歯。2015年4月に同部違和感と排膿が出現し、精査加療を目的に同年6月に朝日大学歯学部附属病院口腔外科を紹介受診された。エックス線およびCT画像にて左側上顎第二小臼歯から第二大臼歯におよぶ嚢胞様の病変を認め、7月中旬に同部歯牙の抜歯と嚢胞摘出術を施行。摘出物の病理検査にて嚢胞壁の一部に異型上皮の増殖と浸潤を認め、PIOSCC、断端陽性と診断された。再度、画像検査を施行するも原発部の残存腫瘍が上顎洞内や軟組織に及ぶ様相は認められず、また領域リンパ節や他部位への転移も認めなかった。同年9月に左側上顎癌 (PIOSCC, T2N0M0) の臨床診断にて上顎部分切除術を施行した。現在、再発等認めないが今後も慎重に経過観察を行う予定である。

P-1-9

口腔に発生した紡錘細胞癌 4 例の治療経験
Treatment of 4 cases spindle cell carcinoma in the oral cavity

○高後 友之、細川 周一、山下 徹郎、上田 倫弘、林 信、
山下 新之助、新山 宗、佐久間 俊光、中嶋 頼俊
恵佑会札幌病院 歯科口腔外科

Tomoyuki Kohgo, Shuichi Yamashita, Tetsuro Yamashita, Michihiro Ueda,
Shin Rin, Shinnosuke Yamashita, Takashi Niiyama, Toshimitu Sakuma,
Yoritoshi Nakajima
Keiyukai Sapporo Hospital, Oral and Maxillofacial Surgery, Sapporo, Japan

【緒言】紡錘細胞癌は、一つの組織中に扁平上皮癌成分と肉腫様発育をした紡錘細胞成分が同時に認められる二相性の悪性像を呈する腫瘍であり、WHO の分類では扁平上皮癌の一亜型として分類されている。口腔領域における発生頻度はまれであるが、悪性度が高く、比較的再発、転移が多い。今回、われわれは紡錘細胞癌の 4 例を経験したので報告する。【症例の概要】症例は男性 2 例、女性 2 例、平均年齢 78 (77 - 81) 歳であった。治療は、全例に外科的切除を施行、3 例に術後補助放射線療法を行った。全例術後半年以内に再発を認めた。転帰としては、遠隔転移にて 2 例死亡、1 例は他病死であった。1 例は頸部リンパ節転移を認めるも現在担癌生存中である。【結語】口腔に発生した紡錘細胞癌の 4 例を経験した。紡錘細胞癌は、これまでの報告の通り悪性度が高く、治療成績向上のため、診断も含めた治療法の確立が必要である。

P-1-10

蛍光光学機器を用いた腫瘍切除マージンの比較検討 ～第 1 報～
A comparative review of tumor free surgical margins in Fluorescence Visualization and iodine stain

○池田 雄介¹、野村 武史¹、高野 伸夫²、田中 陽一³、橋本 和彦³
¹東京歯科大学市川総合病院 オーラルメディスン・口腔外科学講座、
²東京歯科大学市川総合病院 口腔がんセンター、
³東京歯科大学市川総合病院 臨床検査科病理

Yusuke Ikeda¹, Takeshi Nomura¹, Nobuo Takano², Youichi Tanaka³,
Kazuhiro Hashimoto³
¹Department of oral medicine and maxillofacial surgery Tokyo dental college Ichikawa general hospital, ²Oral cancer center Tokyo dental college Ichikawa general hospital, ³Department of clinical pathological laboratory Tokyo dental college Ichikawa general hospital

【目的】口腔がんの切除範囲の設定に蛍光光学機器が臨床応用され始めてきている。これらは口腔扁平上皮癌あるいは上皮異形成に対して蛍光可視化の消失 (FVL) という形で描出される。今回我々は、従来行われてきたヨード染色と光学機器 2 種類による腫瘍切除マージンの検討比較を行ったので研究経過を含めて、第一報として発表する。【方法】対象は T1 ~ Early T2 の表在性口腔扁平上皮癌もしくは上皮異形成の 31 例とする。術前蛍光光学機器による切除マージンの設定ならびに、マーキングを行う。その後ヨード染色を行い、病変を切除し、境界部の病理組織学的相違を比較検討した。【成績】FVL とヨード不染部の描出率を比較した結果、FVL が 31 例中 27 例 (87.1%) であるのに対して、ヨード染色不染部が 22 例 (71.0%) と蛍光光学機器の描出能が優れている結果となった。【結論】蛍光光学機器がヨード染色とともに切除マージン設定の一助となることが示された。

P-1-11

舌に発生した胎児型横紋筋肉腫の 1 例
A case of embryonal rhabdomyosarcoma of tongue

○小林 大輔、西堀 陽平、神山 勲、杉山 健太郎、重松 司朗
東京都立多摩総合医療センター 歯科口腔外科

Daisuke Kobayashi, Youhei Nishihori, Isao Kamiyama, Kentaro Sugiyama,
Shiro Shigematsu
Tokyo Metropolitan Tama Medical Center Department of Dentistry and Oral Surgery, Tokyo, Japan

【緒言】横紋筋肉腫は未分化間葉系細胞から発生する悪性腫瘍で、頭頸部から軀幹、四肢まで全身のあらゆる部位から発生する可能性をもつ軟部腫瘍である。一般的に予後は不良であるために化学療法を含めた集学的治療が必要であることが多い。今回われわれは、舌に発生した胎児型横紋筋肉腫の 1 例を経験したのでその概要を報告する。【症例概要】患者は 16 歳女性。2013 年 9 月に右側舌縁に無痛性の腫瘍を自覚し近医受診したのちに当科紹介受診した。初診時右側舌縁に長径 20 ミリ大の外向性の腫瘍を認めた。生検の結果は悪性所見を認めなかったが、増大傾向にあったため 2014 年 1 月全身麻酔下舌部分切除を行った。その際悪性腫瘍に準じた切除範囲で切除した。術中の迅速病理診断において断端は陰性であった。永久標本の病理診断で胎児型横紋筋肉腫と判明した。術後 2 か月の PET では異常集積を認めなかったが同年 8 月右側上内頸領域に 30 ミリ大のリンパ節転移を認めたため当院耳鼻咽喉科・頭頸部外科にて右側頸部郭清術施行した。集学的治療が必要と判断され同年 9 月より頸部への放射線治療 (Total 44 グレイ) および腫瘍内科へ転科し VAC 療法 [ビンクリスチン (VCR) + アクチノマイシン (ACD) + シクロホスファミド (CPA)] による化学療法を計 16 コース施行した。現在、再発・転移ともに認められないが今後も緊密な経過観察が必要である。

P-1-12

予後不良な T1N0 早期舌癌の 2 例
Two cases of T1N0 early tongue cancer with poor prognosis

○松井 太輝、重田 崇至、赤澤 登
兵庫県立がんセンター 口腔外科

Taiki Matsui, Takashi Shigetate, Noboru Akazawa
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Hyogo Cancer Center, Hyogo, Japan

【緒言】近年舌癌の治療成績は向上しつつあるが、T1N0 早期舌癌においても予後の悪い症例を認める。われわれは T1N0 早期舌癌で予後不良な 2 例を経験したので報告する。【対象】2004 年 1 月 ~ 2015 年 9 月に兵庫県立がんセンター口腔外科で治療された舌癌 T1N0 58 例を対象とした。予後不良例は 2 例であった。【症例 1】50 歳男性 2012 年 7 月初診。右舌部分切除後 2 か月で右側頸部後発転移を認め、2012 年 10 月に舌可動部半側切除、右側頸部郭清術 (I ~ V)、前腕皮弁による即時再建術を施行した。節外浸潤を有する頸部転移を認め、原発巣には癌を認めなかった。術後に CDDP (100mg/m²) 1 コースと 50Gy の CCRT を施行したが、施行後 5 か月で多発肺転移を認め、2012 年 11 月に死亡した。【症例 2】51 歳男性 2014 年 4 月初診。左舌部分切除後 9 か月で左側頸部後発転移を認め、2015 年 3 月に舌可動部半側切除、左側頸部郭清術 (I ~ V)、前腕皮弁による即時再建術を施行した。節外浸潤を有する頸部転移を認め、原発巣には癌を認めなかった。同月に右側頸部転移を認め、2015 年 3 月に右側頸部郭清術 (I ~ IV) を施行した。頸部転移を認めたが、節外浸潤はなかった。術後に CDDP (100mg/m²) 3 コースと 60Gy の CCRT を施行したが、施行後 3 か月で多発肺転移を認め、現在担癌生存中である。【結語】予後不良な T1N0 早期舌癌については現在のところその病態も不明で治療戦略がないのが現状である。今後さらに生物学的特性などの再考が必要と思われる。

P-1-13

外側咽頭後リンパ節転移を伴った頬粘膜扁平上皮癌の1例

A Case of squamous cell carcinoma of the buccal mucosa with laterel retropharyngeal lymph node metastasis

○大竹 一平、石原 修、山田 龍平、矢田 光絵、泉山 大介、桐生 萌、金山 宏幸、平田 真弓
大阪府立急性期・総合医療センター 口腔外科

Ippei Otake, Osamu Ishihara, Ryuhei Yamada, Mitsue Yada, Daisuke Izumiya, Megumi Kiriu, Hiroyuki Kanayama, Mayumi Hirata
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Osaka General Medical Center, Osaka, Japan

外側咽頭後リンパ節、いわゆるルビエールリンパ節は咽頭後間隙に存在するリンパ節で、口腔癌からの転移は稀である。今回初診時よりルビエールリンパ節転移を伴った頬粘膜扁平上皮癌の1例を経験したので報告する。症例は70代の女性で右側頬粘膜腫瘍の精査・加療目的に当科を紹介され受診した。初診時右側頬粘膜に咽頭側壁におよぶ腫瘍を認め、右側頸下リンパ節の腫脹を触知した。CTでは右側頬部～上顎洞、鼻腔、硬～軟口蓋におよぶ腫瘍を認め、右側頸部およびルビエールリンパ節の腫大を認めた。右側頬粘膜扁平上皮癌頸部リンパ節転移、ルビエールリンパ節転移 (cT4bN2bMO / stage IV B) との診断下に右側根治的頸部郭清術、ルビエールリンパ節切除、右側頬粘膜腫瘍拡大切除、遊離前外側大腿皮弁による再建術を施行した。切除標本の病理学的検査でもルビエールリンパ節が確認された。術後放射線治療を提案したが患者が希望されず、現在外来経過観察中であるが再発・転移の兆候は認めない。本症例では腫瘍が頬粘膜後方から上顎に進展していたため、頬部後方で上咽頭収縮筋や口蓋帆張筋を介して、あるいは鼻腔粘膜下や硬口蓋後方から口蓋帆挙筋を介してルビエールリンパ節への転移をきたしたと推察された。ルビエールリンパ節転移を来した口腔癌症例は比較的早期に遠隔転移をきたし、予後不良と報告されている。今後も厳重な経過観察が必要と考えた。

P-1-15

舌部分切除におけるポリグリコール酸シートとフィブリン糊による切除創被覆の臨床的検討

Clinical evaluation of mucosal defect covered with polyglycolic acid sheets with fibrin glue for partial glossectomy

○北畠 健一朗、飯野 光喜、石川 恵生、遊佐 和之、橘 寛彦、尾崎 尚
山形大学医学部 歯科口腔・形成外科

Kenichiro Kitabatake, Mituyoshi Iino, Shigeo Ishikawa, Kazuyuki Yusa, Hirohiko Tachibana, Hisashi Ozaki
Department of Dentistry, Oral and Maxillofacial Plastic and Reconstructive Surgery, Faculty of Medicine, Yamagata University

【目的】 Polyglycolic acid (PGA) シートはポリグリコール酸を材料とした吸収性組織補強材で、フィブリン糊スプレーとの併用で口腔外科手術の軟組織欠損部を被覆する方法が報告されている。今回、我々は舌部分切除症例に対してPGAシートとフィブリン糊スプレーを応用し、その有用性について臨床的検討を行ったので報告する。【方法】 当科にて舌部分切除症例にPGAシート(ネオパール)とフィブリン糊(ペリプラスPコンビセット)を使用した18例を対象とした。検討した項目は切除範囲、PGAシートの脱落時期、瘢痕拘縮・疼痛・出血等の有害事象の有無、経口摂取開始時期、PGAシートの貼付法(創部を一枚のシートで覆う従来法と細切れにしたシートを貼付するパッチワーク法)について検討した。【結果】 対象症例18例で、性別は男性10例、女性8例であり、従来法13例、パッチワーク法5例だった。切除範囲は平均45×31.5mmであり、瘢痕拘縮や嚥下痛は切除範囲が大きいほど出現する傾向があった。経口摂取開始時期は術後平均4.5日目であり、PGAシートの脱落時期は術後平均12.8日目から脱落し始めたが、パッチワーク法では従来法より付着期間が長かった。【結論】 舌部分切除症例におけるPGAシートとフィブリン糊での創部保護は有用であると考えられた。また、従来法による創部保護よりパッチワーク法が創に付着している期間が長く、瘢痕拘縮による嚥下痛や舌運動障害を緩和すると思われた。

P-1-14

口腔癌患者に行った輪状軟骨切開術

Cricotomy performed in patients with oral cancer

○長谷川 博¹、金子 哲治¹、山崎 森里生¹、遠藤 学²、門馬 勉²、菅野 千敬¹、鹿野 真人³

¹福島県立医科大学附属病院 歯科口腔外科、
²大原総合病院 歯科口腔外科、³大原総合病院 頭頸部顔面外科

Hiroshi Hasegawa¹, Tetsuharu Kaneko¹, Morio Yamazaki¹, Manabu Endo², Tsutomu Monma², Tihoro Kanno¹, Makoto Kano³
¹Department of Dentistry and Oral Surgery, Fukushima Medical University Hospital, Fukushima, Japan, ²Department of Dentistry and Oral Surgery, Ohara General Hospital, Fukushima, Japan, ³Department of Head and Neck, Facial Surgery, Ohara General Hospital, Fukushima, Japan

【目的】 気管切開術は口腔癌治療において必要不可欠な術式であるが、腫瘍出血に対する緊急時など、手技的にも困難で術中死のリスクが高いことがある。そこで、われわれは安全で緊急に気道確保できる術式として、輪状軟骨を鉗除することによる輪状軟骨気管切開術を考案したので報告する。【方法】 術式：皮膚切開は輪状軟骨上下縁を含む約3cmの正中縦切開とする。まず、鈍的に輪状甲状間膜を露出し、超緊急時は輪状甲状間膜切開を行う。輪状甲状筋を切除し、甲状軟骨下縁から輪状軟骨、第1気管輪まで露出する。リウエルや破骨鉗子にて輪状軟骨前方正中中部を鉗除すると、その直下は気道粘膜下組織である。輪状甲状間膜から第1気管輪までを切開し気道を確保する。永久気管口は、気管の縦切開の上下縁に横切開を追加し、気管と皮膚を縫合作成する。本術式を口腔癌7例(末期4症例と根治的治療中の3症例)に行った。【結果】 全例とも出血などの合併症なく、迅速に気道は確保された。4例に永久気管口を形成し、2例は気管カニューレが不要となった。一方、3例は気管口の閉鎖を行い6～30か月観察したが、気道狭窄なく経過は良好であった。【考察】 本術式は手技的に容易で、緊急時に対応できる安全性が高い術式である。頭頸部癌症例のみならず、通常の気管切開術ではリスクが高い症例にも適応し得ると考えられた。

P-1-16

耳下腺に発生した上皮筋上皮癌の1例

A case of Epithelial-myoepithelial carcinoma of the parotid gland

片山 雅文
国立病院機構高崎総合医療センター 歯科口腔外科

Masafumi Katayama
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, National Hospital Organization, Takasaki General Medical Center

上皮筋上皮癌は、唾液腺上皮性腫瘍の1%に満たない稀な組織型であり、上皮・筋上皮成分が二層性を示して増生する低悪性度腫瘍である。今回われわれは、耳下腺に発生した上皮筋上皮癌の1例を経験したので報告する。症例は68歳男性、左耳下腺部腫脹を自覚し、かかりつけ歯科医に相談したところ、精査・加療目的に当科を紹介され受診した。左耳下腺部に弾性硬で非可動性の15×15mm大の腫瘍を認めた。MR画像にて左耳下腺部にT2 (SPAIR) 高信号の境界明瞭な腫瘍を認め、穿刺吸引細胞診を施行した。結果は多形腺腫に類似した良性を考へる像もみられる一方、それだけでは説明出来ない病理組織像を認めたため、腫瘍全体を切除し、広範囲に観察、診断する必要があるとの報告を得た。良悪の判断が困難であったため、悪性腫瘍に準じて全身麻酔下に左耳下腺腫瘍摘出術を施行、腫瘍は耳下腺浅葉頭端側に存在し、浅葉と共に一塊に摘出、生検も切除した。摘出された腫瘍は類円形で暗赤色、表面はやや不整であった。病理組織検査の結果、上皮筋上皮癌と診断された。脈管侵襲を疑う部位はなく、断端に腫瘍が露出する像は認められなかったものの、Batsakisらの報告では67例中31%に再発が、18%にリンパ節転移、7%に肺・肝・腎への遠隔転移、7%に腫瘍死が認められるとされているため、再発・転移などないよう今後も注意深く経過観察を行う予定である。

P-1-17

下顎骨に発生した顎骨中心性血管腫の 1 例
One case of the jawbone medullary hemangioma which occurred to mandibular bone

○福田 仁、大山 定男、小川 千晴、長谷川 稔洋、加島 義久、山内 智博、内田 育宏、寺尾 保信
がん・感染症センター 都立駒込病院

Jin Fukuda, Sadao Ohyama, Chiharu Ogawa, Toshihiro Hasegawa, Yoshihisa Kashima, Tomohiro Yamauchi, Ikuhiro Uchida, Yasunobu Terao
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Tokyo Metropolitan Cancer and Infectious Diseases Center Komagome Hospital, Tokyo, Japan

【緒言】血管腫は、血管組織からなる腫瘍で口腔領域においては、口唇、舌、頬粘膜などの軟組織に多く認められるが、まれに顎骨中心性に発生する。今回われわれは顎骨中心性血管腫の治療を経験したので報告する。**【症例】**患者は 49 歳女性。右下顎の違和感と腫脹を自覚し前医受診となった。潰瘍を伴う歯肉増殖と画像検査による骨透過像を認め悪性腫瘍が疑われたため当科紹介となった。初診時、右下顎歯肉に 40 × 50mm 大の潰瘍を伴う歯肉腫脹を認め、歯肉癌を疑い潰瘍部から生検を施行したところ海綿状血管腫の診断を得た。画像検査後に治療方法を検討し、下顎骨区域切除術および遊離腭骨皮弁による再建術を実施した。現在術後 3 年 10 ヶ月経過しているが再発なく経過良好である。**【考察】**海綿状血管腫は ISSVA 分類では静脈奇形とされ、硬化療法または手術療法が主な治療法とされている。腫瘍自体が易出血性であることより治療法の選択には慎重な対応が必要である。顎骨中心性血管腫は顎骨切除を選択する必要がある場合もあるが、術中出血の問題もあり血管造影による腫瘍伸展範囲を把握することも有用とされ、必要に応じて主要動脈の結紮や塞栓術も適応とされている。今回われわれは区域切除を行い良好な結果をえているが、腫瘍残存による再発もあるため、今後も厳重な経過観察が必要と考えられた。**【結語】**顎骨中心性に発生した海綿状血管腫の 1 例を経験したので報告する。

P-1-19

口蓋に発生した神経鞘腫の一例
Schwannoma of the Palate

○佐藤 まゆ、大亦 哲二、木本 奈津子、木本 栄司
紀南病院 歯科口腔外科

Mayu Sato, Tetsuji Oomata, Natsuko Kimoto, Eiji Kimoto
Dentistry and Oral and Maxillofacial Surgery, Kinan Hospital

【諸言】神経鞘腫は末梢神経の Schwann 鞘から発生する良性腫瘍で、口腔領域では舌に最も多く見られるとされ口蓋に発生することは少ないとされる。今回小児の口蓋正中部に発生した神経鞘腫の一例を経験したため報告する。**【患者】**12 歳女性 (初診) 平成 26 年 11 月 (現病歴) 平成 26 年 5 月頃より口蓋正中の腫脹を自覚し、近医歯科医院より精査・加療依頼にて当科を受診した (**初診時所見**) 口蓋正中やや右側寄りに前後径 13mm* 頬舌径 12mm の弾性軟、表面平滑な腫脹を認めた。CT にて境界明瞭な骨吸収像を認め、内部は均一な筋組織と同等の CT 値を認めた。腫瘍性病変を疑い穿刺吸引施行も確定診断は得られなかった。**【処置及び経過】**口蓋良性腫瘍を疑い平成 26 年 12 月 8 日全身麻酔下での摘出術を施行した。骨面と腫瘍の剥離は容易で淡黄色の薄い被膜に包まれる弾性硬の房状の腫瘍を摘出した。口蓋粘膜との剥離は困難で周囲約 3mm の安全域をとり口蓋粘膜と共に切除した。摘出部は開窓とし、シーネを装着のうえ手術を終えた。術後 1 週間は経鼻栄養とし、その後シーネ装着下にて経口摂取開始、術後 11 日で退院となった。術後鼻腔側への Cavity の交通を認めたが、洗浄、創保護により交通は消失した。現在術後 9 ヶ月であるが再発なく経過良好である。**【結語】**神経鞘腫は被膜を有し完全摘出にて再発は少ないとされているが、今後も局所再発を含め定期的な経過観察を行なっていく予定である。

P-1-18

口底部に生じた巨大な舌下腺原発粘表皮癌の 1 例
A case of huge mucoepidermid carcinoma of sublingual gland in the oral floor

○小山 貴寛¹、池田 順行¹、小玉 直樹¹、星名 秀行²、隅田 賢正^{1,3}、西山 秀昌⁴、山崎 学³、程 君³、林 孝文⁴、高木 律男¹

¹新潟大学大学院医歯学総合研究科 顎顔面口腔外科学分野、
²新潟大学医歯学総合病院 インプラント治療、
³新潟大学大学院医歯学総合研究科 口腔病理学分野、
⁴新潟大学大学院医歯学総合研究科 顎顔面放射線学分野

Takahiro Koyama¹, Nobuyuki Ikeda¹, Naoki Kodama¹, Hideyuki Hoshina², Yoshimasa Sumita^{1,3}, Hideyoshi Nishiyama⁴, Manabu Yamazaki³, Jun Cheng³, Takafumi Hayashi⁴, Ritsuo Takagi¹
¹Division of Oral and Maxillofacial Surgery, Niigata University Graduate School of Medical and Dental Sciences, Niigata, Japan, ²Oral Implant Clinic, Niigata University Medical and Dental Hospital, Niigata, Japan, ³Division of Oral Pathology, Niigata University Graduate School of Medical and Dental Sciences, Niigata, Japan, ⁴Division of Oral and Maxillofacial Radiology, Niigata University Graduate School of Medical and Dental Sciences, Niigata, Japan

【緒言】大唾液腺における粘表皮癌の好発部位は耳下腺であり、舌下腺に発生するものは 2-4% と比較的稀である。今回われわれは口底部に生じた巨大な舌下腺原発粘表皮癌の 1 例を経験したので報告する。**【症例】**患者: 66 歳、男性。主訴: 右側口底部からの出血。現病歴: 20 年前より右側顎下部の腫脹を家族に指摘されていたが、痛みがないため放置していた。2012 年 3 月食事の際に口底からの出血を認めたため紹介元歯科を受診し、右側口底部に腫瘍性病変を認めたため、精査目的に当科紹介初診となった。初診時現症: 右側口底部に義歯床縁に一致した潰瘍を伴う 32 × 14mm の弾性硬の隆起性病変を認め、右側顎下部に口腔内から連続する 47 × 54mm の弾性硬の無痛性腫瘍を触知した。血液検査: CEA が 29.1ng/ml と高値を示した。CT・MRI 所見: 右側舌下腺に顎下腺を下方に圧排する 76 × 44 × 65mm の軟組織性病変を認め、悪性の腺系腫瘍が疑われた。また、右側上・中・下内頸静脈リンパ節に転移が疑われた。生検を施行し粘表皮癌の診断が得られた。2012 年 4 月全身麻酔下で腫瘍切除術、右側全顎部郭清術、遊離前腕皮弁による口底再建術を施行した。病理診断は低悪性度粘表皮癌で、上・中・下内頸静脈リンパ節に計 5 個の転移を認めた。現在術後 3 年 5 か月を経過しているが、再発や転移所見はなく経過良好である。**【結語】**無痛性で緩徐な発育を示し、口底部に生じた巨大な舌下腺原発粘表皮癌の 1 例を経験したので報告した。

P-1-20

14 歳の Fanconi 貧血患児に発生した舌癌の一例
Squamous cell carcinoma of the tongue in a 14-year-old man with Fanconi anemia: A case report

○多賀 智治、上田 優貴子、藤村 和磨
兵庫県立尼崎総合医療センター 歯科口腔外科

Tomoharu Taga, Yukiko Ueda, Kazuma Fujimura
Hyogo Prefectural Amagasaki General Medical Center Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Hyogo, Japan

Fanconi 貧血は、1927 年に身体奇形を併発した家族性の貧血として Fanconi が初めて報告した。病態としては、染色体の不安定性を背景に、1. 進行性汎血球減少、2. 骨髄異形成症候群や白血病への移行、3. 身体奇形、4. 固形癌の合併を特徴とする血液疾患である。表現型は多様で汎血球減少のみでそのほかの臨床症状が見られない場合もある。本邦では、出生 100 万にあたり 5 人前後とされ極めてまれな疾患である。諸家の報告によれば固形癌の合併は 5 ~ 10.4% にみられ、部位別では頭頸部や食道、婦人科領域での扁平上皮癌の発生頻度が高く、発症年齢も若年者に多いとの報告がある。今回、14 歳の Fanconi 貧血患児に発生した舌癌の一例を経験したので概要を報告する。**【症例】**患児: 14 歳、男児。初診: 2015 年 3 月。主訴: 左舌縁腫瘍性病変の精査希望。現病歴: 2014 年 12 月頃より舌違和感を自覚していたが放置、2015 年 2 月近医歯科にて生検施行、Squamous cell carcinoma (Well differentiated) の診断、当院小児科より精査加療目的に当科を紹介された。現症: 左舌縁に 25mm × 16mm × 5mm の周囲硬結を伴った腫瘍を認めた。受診後腫瘍は急速に増大した。両側顎下部、頸部のリンパ節は触知しなかったが、PET-CT では T2N2cM0 と診断された。処置および経過: 3 月上旬、舌部分切除術施行。術後化学放射線療法を行った。術後 8 か月経過、今後も経過観察予定である。

P-1-21

上顎歯肉、頬部、下顎骨中心性に扁平上皮癌を認め診断に苦慮した一例

A case of simultaneously double cancer in upper gingiva and primary intra osseous cancer of the mandible

○山田 龍平、石原 修、大竹 一平、矢田 光絵、泉山 大介、桐生 萌、金山 宏幸、平田 真弓
大阪府立急性期・総合医療センター 口腔外科

Ryuhei Yamada, Oasamu Ishihara, Ippei Otake, Mitsue Yada, Daisuke Izumiyama, Megumi Kiriu, Hiroyuki Kanayama, Mayumi Hirata
Osaka General Medical Center Oral and Maxillofacial surgery, Osaka, Japan

今回、上顎歯肉、頬部と下顎骨に同時に扁平上皮癌を認め、診断に苦慮した症例を経験したのでその概要を報告する。症例：65歳、男性。現病歴：2014年11月末頃より左上顎歯肉の腫脹を自覚され近医歯科受診。抗菌薬処方を受けるも改善せず2014年12月中旬、腫瘍性病変が疑われ、当科紹介来院となる。現症：左上顎犬歯部歯肉から臼歯部にかけての穿掘性潰瘍病変、口蓋にも膨隆した腫瘍性病変を認め、頬部皮膚には約30mm大の腫瘍病変を認め下顎と固着していた。上顎歯肉生検で中分化型扁平上皮癌、頬部腫瘍 FNA で扁平上皮癌の診断を得た。画像所見から術前診断を上顎歯肉癌 T4aN1M0 stageIV、頰リンパ節転移とした。術前動注化学療法3回施行しPR判定。2015年2月下旬、気管切開術、左側機能的頸部郭清術、副咽頭郭清術、下顎区域切除術、頬部皮膚合併切除術、上顎部分切除術、肋骨付き広背筋皮弁による再建術施行。摘出病理はpN2で節外浸潤はなく、下顎骨内にも扁平上皮癌を認めた。鼻腔内側壁の粘膜断端陽性であったため追加切除を行ったが同部に腫瘍は認めなかった。本症例は3部位に扁平上皮癌を認め、幾通りかの可能性が考えられるが、下顎骨の骨吸収像と頬部腫瘍との連続性は確認出来なかったことや、頬部腫瘍は転移性腫瘍の可能性が示唆されたことから上顎歯肉癌と下顎骨中心性癌の同時性重複癌で、頬部腫瘍は上顎歯肉由来と推測している。

P-1-23

維持透析中の進行舌癌症例に対する根治的治療の経験

A radical treatment for advanced tongue cancer in a patient receiving hemodialysis therapy

○秋田 大輔、峯村 俊一、西村 允宏、牧野 貴明、小田切 宏樹
飯田市立病院 歯科口腔外科

Daisuke Akita, Toshikazu Minemura, Masahiro Nishimura, Takaaki Makino, Hiroki Otagiri
Department of Dentistry and Oral Surgery, Iida Municipal Hospital, Nagano, Japan

近年、慢性腎不全より透析療法を行っている患者は増加傾向にあるが、免疫能の低下や血清中への発癌物質の蓄積などにより悪性腫瘍の発生率が高いとされている。口腔癌治療においても透析患者症例に遭遇する機会は徐々に増加しているものと思われるが、その報告例は少なく治療法の選択や術後管理に苦慮する点が多いのが現状である。今回、われわれは維持透析中の進行舌癌症例に対して根治的治療を行う機会を得たので、その概要を報告する。患者は51歳、男性で2014年9月にかかりつけ歯科より紹介で初診された。口腔内は右舌縁に硬結を伴い舌根部、舌正中部に達する長径約45mm大の潰瘍性病変を認め、自発痛を訴えた。右頸部で上内深頸領域に圧痛を伴う指示頭大のリンパ節腫大2個を触知した。既往歴として、35年前より慢性腎不全にて他院で維持血液透析を週3回行われていた。各種画像診断、病理組織診断より右舌中分化型扁平上皮癌 T4aN2bM0と診断した。術前放射線照射40Gy後、11月に気管切開、右根治的頸部郭清術、舌亜全摘、大胸筋皮弁による即時再建術を行った。血液透析は手術前日、術後は翌日から再開した。著名な貧血はみられず輸血は行わなかった。重篤な合併症はなく、術後約1ヶ月で軽快退院となった。術後約1年の現在、再発や転移認めず、機能的にも良好な結果を得ている。

P-1-22

抜歯窩からの細胞診が有用であった下顎骨中心性扁平上皮癌の一例

The case of central carcinoma of the jaw that cytodiagnosis was useful from socket

○木谷 憲典、藤井 信行、西尾 幸与
鳥取県立中央病院 歯科口腔外科

Kazunori Kidani, Nobuyuki Fujii, Sachio Nishio
Tottori Prefectural Central Hospital

顎骨中心性に扁平上皮癌が発生することはまれで、生検が困難場合もあり診断に苦慮する場合も多い。今回我々は抜歯窩治癒不全を契機に当科を受診し、細胞診にて癌が疑われ、診断に至った顎骨中心性扁平上皮癌を経験したので報告する。症例は79才男性。2014年9月初旬より左下7に痛みを覚えるも放置、10月末近医歯科受診し、中等度動揺および排膿、び慢性に骨吸収を認め根尖性歯周炎の診断下に11月初旬抜歯施行され、2週間後も疼痛が改善されず出血を認め11月下旬に再掻爬するも改善ないため2015年1月中旬当科に紹介され受診した。CTでは放射線読影医により下顎骨髄炎の診断であったが、画像および臨床経過を考慮し癌を疑い抜歯窩より細胞診を施行したところ、悪性の疑いと診断であったため、抜歯窩より生検を行い扁平上皮癌の診断を得た。下顎骨中心性癌の診断下に左全顎部郭清術、下顎骨区域切除、プレート再建を施行した。現在特に再発所見を認めない。細胞診は診断の補助として有様な方法と思われた。

P-1-24

10歳男児の硬口蓋に生じた粘表皮癌の1例

A case of mucoepidermoid carcinoma of the hard plate in a 10-year-old boy

○林 樹、井上 敬介、山下 知巳
厚生連高岡病院 歯科口腔外科

Itsuki Hayashi, Keisuke Inoue, Tomomi Yamashita
Department of Dentistry and Oral Surgery, Kouseiren Takaoka Hospital, Toyama

【緒言】粘表皮癌は、類表皮細胞・粘液産生細胞・中間細胞より構成されている唾液腺導管上皮由来の悪性腫瘍であり、30～50歳台に好発するとされている。今回、我々は10歳男児の硬口蓋に生じた粘表皮癌の1例を経験したのでその概要を報告する。【症例】患者：10歳男児。主訴：右側硬口蓋の腫脹。現病歴：2013年10月、近在歯科医院を受診した際に右側硬口蓋の腫脹を指摘され、同月精査加療目的で当科初診となる。現症：口腔内所見：右側硬口蓋粘膜下に2cm大の軽度青紫色を帯びた半球状腫瘍を認めた。画像所見：CT、MRIにて辺縁境界明瞭な腫瘍は内部に造影効果を認めた。口蓋部骨に平滑な骨吸収を認めた。臨床診断：右側硬口蓋腫瘍。【処置及び経過】2013年12月、全麻下に右側口蓋腫瘍摘出術施行。腫瘍直下の骨面を一層削合した。病理組織学的には、類表皮細胞と少数の粘液産生細胞および中間細胞が充実性胞巣を形成し、胞巣に含まれる腺管内にはPAS、ムチカルミン染色陽性の粘液を認めた。低悪性度粘表皮癌と診断された。切除断端陰性と判断されたため、経過観察を行っているが、現在まで再発は認めていない。【結語】口腔癌のうち15歳以下の症例は約0.4%とされ、粘表皮癌が最も多く報告されている。粘表皮癌の治療法は小児においても外科的切除が第一選択とされている。自験例は低悪性、低浸潤、断端陰性であったため、追加治療は行わなかった。

P-1-25

顎下部に発生した滑膜肉腫の 1 例

A case of synovial sarcoma of the submandibular region

○兼子 隆次¹、岡部 一登¹、河合 孝真¹、山本 憲幸²、日比 英晴²
¹豊田厚生病院 歯科口腔外科、²名古屋大学大学院医学研究科 頭頸部感覚器外科講座

Ryuji Kaneko¹, Kazuto Okabe¹, Takamasa Kawai¹, Noriyuki Yamamoto², Hideharu Hibi²
¹Department of Oral & Maxillofacial Surgery, Toyota Kosei Hospital, ²Department of Oral & Maxillofacial Surgery, Nagoya University Graduate School of Medicine

滑膜肉腫は悪性軟部腫瘍の中で発生頻度の低い腫瘍であり、特に頭頸部を原発とするものは稀である。今回、われわれは顎下部に発生した滑膜肉腫を経験し、併せて摘出標本の病理組織学的検討を行ったので報告する。症例は 36 歳男性。初診の数年前から左顎下部の腫瘍に気づくも放置していたが、1 年ほど前より徐々に腫瘍の増大を認めたため、2013 年 3 月に当科を受診した。初診時は左顎下部に約 30 mm 大の腫瘍を触知。CT、MRI 所見にて境界明瞭で比較的均一な腫瘍であった。穿刺吸引細胞診では一部に異型細胞を認めるも、悪性所見はみられなかった。画像および病変の進行状態から良性的腫瘍を疑い、全身麻酔下に腫瘍摘出術を行った。病変部は皮膜に被われ周辺の組織への癒着や明らかに浸潤を疑う所見は認められなかった。摘出部の病理組織学的診断は滑膜肉腫で、上皮様細胞はなく間葉性を示す紡錘形細胞の増殖部分からなる単相型を呈していた。同時に滑膜肉腫に特異的な SYT-SSX1 遺伝子の発現を確認した。摘出部断端の一部に腫瘍の浸潤が疑われたため、約 1 ヶ月後に病変に隣接していた下顎骨の辺縁切除と左顎下部のリンパ節郭清を含む拡大摘出術を施行した。術後の病理組織学的検討より、肉腫としての性質や診断、治療に関わるマーカーに反応し一定の情報を得られた。術後の経過は良好にて 2 年を経過した現在、明らかな再発・転移を認めない。

P-2-1

画像診断にて頸部リンパ節転移を強く疑ったが組織学的に否定された舌癌の 1 例

A case of tongue cancer which we strongly doubted neck metastasis by image diagnosis, but was denied histologically

○檀上 敦、下平 大治、鶴岡 祥子、山下 佳雄、後藤 昌昭
 佐賀大学医学部 歯科口腔外科学講座

Atsushi Danjo, Daiji Shimohira, Shoko Tsuruoka, Yoshio Yamashita, Masaaki Goto
 Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Medicine, Saga University

65 歳女性。左側舌縁部の白色病変の精査目的に当科紹介受診となった。舌側転位した左下 5 歯冠と一致して舌縁に 2 × 3mm の白色病変を認めた。全身麻酔下に左下 5 抜歯と左側舌白版の切除生検を行った。病理組織学的検査の結果は高分化型扁平上皮癌の診断で切除断端陰性であった。術後 4 年 2 か月経過したところで、同側顎下リンパ節の腫脹を認めた。採血所見や臨床所見からは細菌感染やウイルス性感染を疑う症状は認めなかったため、造影 CT 検査を施行。左顎下部に直径 10mm 大のリンパ節を認めたため、追加で MRI 撮影をおこなったところ顎下リンパ節、上内深頸リンパ節の腫大を認めた。PET-CT では、他部位の集積はないものの同リンパ節の高集積を認め、SUV 値 (max: early=7.97, delay=9.96) であった。上咽頭右側にも高集積を認めたが耳鼻咽喉科で内視鏡検査を行い、腫瘍性病変は認めなかった。頸部エコーで複数のリンパ節のリンパ門の狭小化もしくは消失を認めたため、転移リンパ節と判断した。患者へ説明した上で根治的頸部郭清術を行った。廓清組織中の 31 個のリンパ節を検討したがすべてのリンパ節に癌の転移は認めず、組織学的にはリンパ節炎の診断であった。

P-1-26

長期経過をたどった好酸球増加を伴う硬化性上唇粘表皮癌の 1 例

A case of sclerosing mucoepidermoid carcinoma of the upper lip after a long term course

○勝田 秀行^{1,2}、秋月 文子³、倉澤 侑也^{1,2}、八十 篤聡^{1,2}、江川 峻哉^{1,4}、櫛橋 幸民^{1,4}、池田 賢一郎^{1,4}、近藤 誠二³、代田 達夫³、嶋根 俊和^{1,2,4}

¹昭和大学病院 頭頸部腫瘍センター、²昭和大学歯学部 口腔外科学講座 口腔腫瘍外科学部門、³昭和大学歯学部 口腔外科学講座顎顔面口腔外科学部門、⁴昭和大学医学部 耳鼻咽喉科講座

Hideyuki Katsuta^{1,2}, Ayako Akizuki³, Yuya Kurasawa^{1,2}, Atsushi Yaso^{1,2}, Toshiya Egawa^{1,4}, Yukio Kushihashi^{1,4}, Kenichiro Ikeda^{1,4}, Seiji Kondo³, Tatsuo Shirota³, Toshikazu Shimane^{1,2,4}
¹Head and Neck Oncology Center, Showa University Hospital, Tokyo, Japan, ²Division of Oral Oncology, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, School of Dentistry, Showa University, Tokyo, Japan, ³Division of Maxillofacial Surgery, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, School of Dentistry, Showa University, Tokyo, Japan, ⁴Department of Otorhinolaryngology, School of Medicine, Showa University, Tokyo, Japan

好酸球増加を伴う硬化性粘表皮癌は甲状腺や唾液腺などで散見するが、小唾液腺での報告は非常に少ない。今回我々は、15 年以上の長期経過をたどった好酸球増加を伴う硬化性上唇粘表皮癌の 1 例を経験したため報告する。症例：67 歳、女性初診：2015 年 3 月主訴：左側上唇の腫瘍既往歴・家族歴：特記事項なし現病歴：1998 年頃から左側上唇に腫瘍を自覚するも放置していた。2007 年左側上唇の腫瘍が一部脱落したため某大学病院口腔外科を受診した。生検の結果良性腫瘍が疑われ、上唇腫瘍摘出術を予定されるも手術を拒否し、以後放置されていた。2015 年 3 月上唇の腫瘍が増大したため精査治療目的に当センターを受診した。生検を施行し、好酸球増加を伴う硬化性粘表皮癌や多形低悪性度腺癌が疑われた。現症：左側上唇に境界明瞭な弾性硬の赤唇に潰瘍を伴い皮下では白唇まで達する 37x17mm 大の腫瘍性病変を認めた。画像所見：CT 画像上は、左側上唇に境界明瞭な腫瘍性病変を認めるのみで、頸部や遠隔転移を認めなかった。MRI 画像では、左側上唇に T1・T2 で低信号、T1-Gd で不均一な高信号を伴う腫瘍性病変を認めた。経過：2015 年 5 月全身麻酔下に上唇悪性腫瘍切除術、口唇再建術を施行した。切除した左側上唇は Abbe flap および鼻唇溝皮弁を用い再建し、経過良好である。病理組織学的所見：著名な線維化および好酸球増加を伴う硬化性粘表皮癌

P-2-2

口腔扁平上皮癌の頸部リンパ節後発転移に対する超音波診断と治療に関する臨床的検討

Clinical study on ultrasonographic diagnosis and treatment of latent nodal metastasis in oral squamous cell carcinoma

○高橋 喜浩、河野 辰行、阿部 史佳、山本 哲彰、板井 健、田嶋 理江、河野 憲司
 大分大学医学部 歯科口腔外科学講座

Yoshihiro Takahashi, Tatsuyuki Kouno, Ayaka Abe, Noriaki Yamamoto, Takeshi Itai, Rie Tashima, Kenji Kawano
 Department of Dentistry and Oral Maxillofacial Surgery, Faculty of Medicine, Oita University

【目的】当科では、口腔扁平上皮癌の頸部リンパ節に対して頸部超音波検査（エコー）による経過観察を行い予防郭清は行わない方針で治療を行ってきた。今回、本治療方針が適切かにつて明らかにすることを目的とし、以下の検討を行った。【対象と方法】2000 年 1 月から 2013 年 12 月の期間に当科で受診し治療を行った口腔扁平上皮癌 1 次症例 331 症例を対象とした。エコーによる頸部リンパ節転移の診断精度と後発転移症例の治療成績について検討した。頸部郭清術を行わず 1 年以上経過して頸部リンパ節転移を認めない症例は cN(-) とした。【結果】初回治療前の頸部転移診断の検討では、エコー陽性・pN(+) は 44 例、エコー陽性・pN(-) は 27 例、エコー陰性・pN(+) は 57 例（そのうち後発転移と診断したのは 53 例）、エコー陰性・cN(-) は 203 例となり、感度 43.6%、特異度 88.3%、陽性的中率 62.0%、正診率 74.6% であった。後発転移と診断した症例は 53 例でエコー陽性・pN(+) は 46 例、エコー陽性・pN(-) は 7 例で陽性的中率 86.8% であった。後発転移診断時の診断をエコー診断とすると感度 95.7%、特異度 85.7%、陽性的中率 72.6%、正診率 88.5% となった。後発転移 pN(+)/46 例の治療成績は、頸部再発 3 例、うち 2 例は制御され、1 例が非制御であった。遠隔転移死は 2 例であった。【結語】エコーを用いた術後経過観察により後発転移診断時の頸部郭清術でも良好な結果を得ることができると考える。

P-3-1

末梢動脈疾患 (PAD) 患者とその予備軍における腓骨動脈温存の重要性
Importance of Preserving Peroneal Artery in Patients with Peripheral Arterial Disease and Its Candidates

- 中村 英玄¹、牧口 貴哉^{1,2}、船田 竜一³、倉林 正彦³、横尾 聡^{1,2}
¹群馬大学医学部附属病院 歯科口腔・顎顔面外科、
²群馬大学大学院医学系研究科 顎口腔科学分野、
³群馬大学医学部附属病院 循環器内科

Hideharu Nakamura¹, Takaya Makiguchi^{1,2}, Ryuichi Funada³, Masahiko Kurabayashi³, Satoshi Yokoo^{1,2}
¹Oral and Maxillofacial Surgery, Gunma University Hospital, Maebashi, Japan, ²Department of Stomatology and Maxillofacial Surgery, Gunma University Graduate School of Medicine, Maebashi, Japan, ³Cardiovascular Internal Medicine, Gunma University Hospital, Maebashi, Japan

【はじめに】近年、高齢化と食生活の欧米化に伴い、閉塞性動脈硬化症 (ASO) が大部分を占める末梢動脈疾患 (Peripheral arterial disease: PAD) の患者は増加傾向である。高齢者が多い口腔癌切除後再建においても、PAD 合併例とその予備軍は増えつつある。そのため、下肢の皮弁採取、とくに腓骨皮弁採取による虚血性合併症に留意する必要がある。今回われわれは、血管造影を用いて下腿3分枝の血行を評価し、PAD患者もしくはその予備軍における腓骨皮弁採取の適否について検討した。【対象および方法】2012年7月から2015年9月までに下肢虚血症状などを訴え、当院循環器内科を受診し、下肢造影検査を施行した45例65脚を対象とした。血管造影における下腿3動脈の開存状態を、末梢動脈障害スコア (PAD-score, 0: 狭窄なし, 1: 軽度狭窄, 2: 高度狭窄, 3: 完全閉塞) を用いて評価した。【結果およびまとめ】腓骨動脈、後脛骨動脈、前脛骨動脈の PAD-score はそれぞれ 1.09, 1.42, 1.67 であった。腓骨動脈は、統計学的有意に開存率が高かった。すなわち腓骨動脈は動脈閉塞性病変が最も起こりにくい血管であり、PAD患者の下腿血行において重要である可能性が示唆された。PAD患者とその予備軍では、可及的に腓骨皮弁採取を避けるべきであると考えられる。

P-3-3

下顎骨区域切除術後の再建にレジンフレームを用いた2例
Two cases of using a resin frame to the reconstruction of the mandible segmental resection surgery

- 中井 康博、岩崎 昭恵、宮崎 亮、田中 麻央、中井 史、小川 尊明、大林 由美子、三宅 実
香川大学医学部 歯科口腔外科学講座

Yasuhiro Nakai, Akinori Iwasaki, Ryo Miyazaki, Mao Tanaka, Fumi Nakai, Takaaki Ogawa, Yumiko Obayashi, Minoru Miyake
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Medicine, Kagawa, Japan

下顎骨に大きく浸潤した口腔癌では、一般的には下顎骨区域切除が選択される。しかし、下顎骨区域切除は咬合力の低下を招き、全体の QOL を下げる重要な因子となっている。下顎再建は整容的、機能的回復により QOL の低下を防止するが、そのためには術前と比較して高い再現性が求められる。我々は 3D モデルを用いてレジンフレームを作成することにより、下顎骨区域切除後の再建で高い再現性が得られたので報告する。症例1は75歳、男性。他院にて右下顎骨中心性癌と診断され、当科を紹介受診した。同診断の元、右下顎骨区域切除術、両側頸部郭清術、遊離腓骨皮弁再建術を施行した。手術に際して、3D モデルを作成し、金属プレートをプレベンディングした。さらに、プレベンディングした金属プレートを 3D モデルに位置付けした状態で、歯科印象トレー用レジンを削り取り範囲を含む下顎骨下縁に沿ったレジンフレームを作成した。下顎骨再建時に、レジンフレームを用いて下顎骨の位置を術前と同じ位置に再現し、金属プレートで固定した。症例2は76歳の女性、左顎下腺腫瘍疑いにて当院顎顔面外科を受診した。左顎下腺悪性腫瘍 (T4N0M0, Stage4) の診断の元、左顎下腺悪性腫瘍手術、左下顎骨区域切除術、両側頸部郭清術、右外側大腿皮弁再建術を施行した。症例1と同様に金属プレートとレジンフレームを作成し、さらにポジショニングプレートを併用することで、術前の下顎骨の位置を再現した。

P-3-2

口角を含む頬部広範全層欠損に対する再建戦略
Reconstruction strategy of through and through cheek defect involving the commissure

- 牧口 貴哉^{1,2}、宮崎 英隆^{1,2}、高山 優^{1,2}、小川 将^{1,2}、小杉 謙介^{1,2}、小坂橋 敦^{1,2}、清水 崇寛^{1,2}、菅原 圭^{1,2}、中村 英玄^{1,2}、横尾 聡^{1,2}
¹群馬大学大学院医学系研究科 顎口腔科学分野、
²群馬大学医学部附属病院 歯科口腔・顎顔面外科

Takaya Makiguchi^{1,2}, Hidetaka Miyazaki^{1,2}, Yu Takayama^{1,2}, Masaru Ogawa^{1,2}, Kensuke Kosugi^{1,2}, Atsushi Koitabashi^{1,2}, Hirotaka Shimizu^{1,2}, Kei Sugawara^{1,2}, Hideharu Nakamura^{1,2}, Satoshi Yokoo^{1,2}
¹Department of Stomatology and Maxillofacial Surgery, Gunma University Graduate School of Medicine, Maebashi, Japan, ²Oral and Maxillofacial Surgery, Gunma University Hospital

【はじめに】口角を含む広範頬部全層欠損に対する再建は、頬部粘膜と皮膚の両者を被覆すると同時に口角再建を要する。oral aperture (開口) と oral sphincter (括約、閉口) の機能面だけでなく、整容面においても良好な結果が求められる困難な再建である。良好な口角形態を再現するために、口角における上下赤唇の移行形態の評価・分類に基づいた再建を心掛けている。口角を含む広範全層欠損に対するわれわれの再建戦略について報告する。【対象・方法】群馬大学医学部附属病院で施行した口角を含む頬部全層欠損に対する再建全10例を対象とし、機能面・整容面の結果について検討を行った。【結果】再建に用いた皮弁は遊離皮弁と赤唇伸展皮弁の組み合わせが7例 (前腕皮弁6例、腹直筋皮弁1例)、DP皮弁と赤唇伸展皮弁による再建1例、頸部島状皮弁、口蓋粘膜弁や鼻唇溝皮弁と赤唇伸展皮弁の局所皮弁のみによる再建2例であった。遊離皮弁は全例全生着した。局所皮弁の部分壊死が1例に認められた。全例、最終的に良好な oral aperture, sphincter が獲得され、整容面でも acceptable な結果が得られた。【考察】頬部広範全層欠損において、広範な欠損を確実に被覆でき、かつ豊富な血行で赤唇・口角再建のために良好な土台を提供できる遊離皮弁が再建の workhorse となる。赤唇伸展皮弁を土台に縫着する際、口角形態の評価・分類が、より良好な整容的口角再建の一助になるとわれわれは考えている。

P-3-4

肩甲骨皮弁による硬性再建後、デンタルインプラントを応用した悪性黒色腫の1例
A case of oral malignant melanoma: Reconstruction with the scapular osteocutaneous flap and dental implants

- 原園 陽介^{1,2}、長谷川 和樹^{1,2}、宮本 日出雄¹、柴田 真里^{1,2}
¹静岡市立静岡病院、²東京医科歯科大学 顎顔面外科

Yosuke Harazono^{1,2}, Kazuki Hasegawa^{1,2}, Hideo Miyamoto¹, Mari Shibata^{1,2}
¹Shizuoka City Hospital, ²Maxillofacial Surgery, Tokyo Medical and Dental University

悪性黒色腫は口腔内においては比較的まれであり、予後不良な疾患である。今回われわれは口蓋の悪性黒色腫に対して切除後に肩甲骨皮弁による硬性再建を行い、さらにデンタルインプラントを応用した症例を経験したので報告する。患者は61歳男性で、主訴は口蓋の色素沈着であった。2003年に近歯科にて色素沈着を指摘されていた。2013年4月に右上顎6口蓋側歯肉の腫脹と出血を自覚し、近歯科にて切開処置を受けるも改善せず、同年9月上旬に当科に紹介された。現症として、右口蓋部に隆起と潰瘍を伴う60mm×40mmの潮濕性黒色病変を認め、PET-CTにて口蓋のみに集積を認めた。悪性黒色腫の病理診断のもと、同年10月に上顎部分切除、右頸部郭清術、肩甲骨皮弁による再建術を施行し、術後 DAV-Feron 療法を4クール行った。経過良好であり、2014年4月に顎堤形成術を施行し義歯を作製した。さらに約1年後にインプラントを埋入した。術後2年経過しているが、現在再発を認めず咀嚼機能も良好である。一般に口腔悪性黒色腫は予後不良であり、再建等が躊躇されることが多い。しかし積極的に硬性再建を行うことで術後の顔貌の変形を防ぎ、鼻腔との交通の遮断も可能となる。また経過良好であれば、顎堤形成、さらにデンタルインプラントを応用することによって著しい QOL の改善が期待できるものと考えられた。

P-3-5

遊離皮弁再建舌の経時容積動態と嚥下機能についての検討

Study of Volume changing of reconstruction tongue by free flap and Factions

○鈴木 大貴^{1,2}、井口 達也³、高橋 美穂¹、唐木田 一成¹、野村 武史^{2,4}、田中 一郎⁵、高野 伸夫⁴

¹東海大学付属八王子病院 口腔外科、²東京歯科大学 オーラルメディシン・口腔外科学講座、³東京歯科大学 摂食嚥下リハビリテーション科、⁴東京歯科大学 口腔がんセンター、⁵東京歯科大学市川総合病院形成外科

Taiki Suzuki^{1,2}, Tatsuya Iguchi³, Miho Takahashi¹, Kazunari Karakida¹, Takeshi Nomura^{2,4}, Ichiro Tanaka⁵, Nobuo Takano⁴

¹Department of Oral and Maxillofacial surgery, Hachioji hospital Tokai University, Tokyo, Japan, ²Department of Oral Medicine Oral and Maxillofacial surgery, Tokyo Dental College, Tokyo, Japan, ³Department of Dysphagia, Tokyo Dental College, Tokyo, Japan, ⁴Oral cancer center, Tokyo Dental College, Tokyo, Japan, ⁵Department of Plastic surgery, Ichikawa general hospital Tokyo Dental College, Ichikawa, Chiba

舌癌の切除は、範囲の拡大にしたがい可動域の減少に伴う摂食機能障害や、構音機能障害が生じてくる。そのため、少しでも機能障害が軽減されるよう種々の皮弁による再建術が試みられてきた。この遊離皮弁には少なからず経時的な組織減少が生じる。この再建舌の volume 低下により、術後のリハビリテーションで獲得した摂食嚥下運動が困難となる症例が時にみられる。我々は過去に、遊離皮弁再建舌の経時的な容積動態に関して、三次元的にボリウムトリを用い容積を算出し、再建舌の増減をもたらす要因に関して検討を行ってきた。しかし、その容積動態と機能との間にどのような関係があるかは未だに明確にされていない。そのため今回我々は、容積動態と嚥下機能に関する要因に関して検討を行った。【対象・方法】東京歯科大学口腔がんセンターにおいて舌癌に対し遊離皮弁再建術を施行した患者のうち、以下の条件を満たした 10 例である（画像および嚥下機能評価が半年以上追跡可能である、金属アーチファクトの影響を受けない、術後に皮弁に影響を及ぼす感染を伴わないもの）。内訳は舌半側切除 5 例、亜・全摘 5 例であった。これらに対し DICOM 画像処理ソフトウェアを用い経時的に再建舌の容積を算出した。嚥下機能評価として MASA-C 他と、容積に関係すると考えられる臨床データをそれぞれ統計学的に評価、検討した。【まとめ】遊離皮弁再建舌の縮小動態と嚥下機能の低下の関連が示唆された。

P-3-7

Double rotation flap による腹部採皮部一次縫縮

Primary closure technique using double rotation flaps for abdominal skin defect after skin harvest

○上原 雅隆、笹栗 正明、土生 学、岩永 賢一郎、吉賀 大午、富永 和宏

九州歯科大学 生体機能学講座顎顔面外科学分野

Masataka Uehara, Masaaki Sasaguri, Manabu Habu, Kenitirou Iwanaga, Daigo Yoshiga, Kazuhiro Tominaga
Department of Science of Physical Functions, Division of Maxillofacial Surgery, Kyushu Dental University

前腕皮弁採取部への植皮は、比較的大きな皮膚が必要となる。一般的な採皮部位として腹部、大腿部、鼠径部などがあるが、大きな皮膚採取には腹部を用いることが多い。採皮した欠損部分は dog ear を避けるため通常便宜的に皮膚を一部切除し、直線的な一次縫縮を行うことが一般的である。この場合、縫縮部は正中を超え、しばしば対側に及ぶ。腫瘍再発の場合、救済手術時に新たな再建が必要となり、その際は対側腹直筋皮弁が有望であるが無傷腹部でなければ同筋皮弁を用いることはできない。我々は、前腕皮弁採取部植皮のための採皮を腹部より行うに際し、double rotation flap を用いることにより正中を超えず片側のみにて縫縮を試みたので報告する。対象は口腔癌再建に前腕皮弁を用い、その前腕部への植皮に際し腹部からの採皮を行った 5 例である。皮膚欠損のサイズは 40x60 mm から 80x80 mm であった。皮膚欠損側および尾側にカーブ状の切開を加え、上下にフラップを作製する。このフラップを rotate させることにより、大きな dog ear を形成すること無く、かつ正中を超えず腹部皮膚欠損を一次縫縮することが可能であった。本法は極めてシンプルであり、腹部皮膚欠損の一次縫縮の際に有用であった。

P-3-6

前方口底即時再建症例の術後機能評価

Functional evaluation after immediate reconstruction of the anterior floor of mouth

○杉浦 康史¹、去川 俊二²、加持 秀明²、早坂 純一¹、土屋 欣之¹、野口 忠秀¹、神部 芳則¹、西野 宏³、森 良之¹

¹自治医科大学 歯科口腔外科、²自治医科大学 形成外科、³自治医科大学 耳鼻咽喉科

Yasushi Sugiura¹, Shunji Sarukawa², Hideaki Kamochi², Jyunichi Hayasaka¹, Yoshiyuki Tuchiya¹, Tadahide Noguchi¹, Yoshinori Jinbu¹, Hiroshi Nishino³, Yoshiyuki Mori¹

¹The Department of Dentistry, Oral and Maxillofacial Surgery, Jichi Medical University, Tochigi, Japan, ²The Department of Plastic Surgery, Jichi Medical University, Tochigi, Japan, ³The Department of Otolaryngology, Jichi Medical University, Tochigi, Japan

【緒言】舌背を含まない両側口底切除後再建症例は、舌切除量が少なく機能障害が少ないと思われがちだが、実際の術後機能が悪い症例がある。そこで当院の症例を検討した。

【対象と結果】2006 年から 2014 年までに、当院において舌背を含まない両側前方口底切除後即時再建症例は 11 例（口底癌 9 例、下顎歯肉癌 2 例）あり、そのうち半年以上再発が無かった 8 例を対象とした。欠損範囲は口底が 1 例、下顎辺縁合併が 5 例、下顎区域合併が 2 例であった。術後の食形態は 3 例で常食、3 例で加工食（咀嚼不要食）、2 例で胃瘻であった。術前後での食形態の低下は 5 例で、欠損範囲との有意な関係は認めなかった。放射線治療を行った患者は 6 例で、4 例で食形態の低下があった。

【まとめ】2014 年の本会において、われわれは再建すべき機能欠損を反映した、新しい舌欠損分類を提唱したが、両側のオトガイ舌筋が切除されて舌体部が残る前方口底欠損（GG-1）における術後機能についての考察が不十分であった。今回の結果では、症例が少ないにも関わらずばらつきを認めた。オトガイ神経切除に伴う知覚低下や歯牙欠損が原因の可能性も考えたが有意ともいえず、結果として機能障害となる因子は十分には考察できていない。今後更に症例を蓄積・検討を重ねるとともに、再建方法を工夫し機能向上に努めていきたい。

P-3-8

レジンフレームと 3D 実体モデルのコンビネーション法による下顎再建精度の向上と標準化への挑戦

Use of a combination resin frame and 3D model: a challenge to the standard mandibular reconstruction procedure

○早坂 純一^{1,3}、去川 俊二²、野口 忠秀¹、伊藤 弘人^{1,3}、神部 芳則¹、勝又 明敏⁴、森 良之¹

¹自治医科大学医学部 歯科口腔外科学講座、²自治医科大学医学部 外科学講座形成外科学部門、³那須赤十字病院 歯科口腔外科、⁴朝日大学歯学部 口腔病態医療学講座歯科放射線学分野

Junichi Hayasaka^{1,3}, shunji Sarukawa², Tadahide Noguchi¹, Hiroto Itou^{1,3}, Yoshinori Jinbu¹, Akitoshi Katsumata⁴, Yoshiyuki Mori¹
¹Department of Dentistry, Oral and Maxillofacial Surgery, Jichi Medical University, Tochigi, Japan, ²Departments of Plastic Surgery, Jichi Medical University, Tochigi, Japan, ³Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Nasu Red Cross Hospital, Tochigi, Japan, ⁴Department of Oral Radiology, Asahi University, School of dentistry, Gifu, Japan

【目的】「レジンフレーム」という下顎区域切除後に残存下顎を離断前の位置に再現する装置を開発し、顎骨の 3D 実体モデルと組み合わせて用いる下顎再建法を検討した。【対象】下顎再建 50 症例（レジンフレーム使用例および不使用例）【方法】レジンフレーム法による下顎再建の術式は以下のとおり。1. 3D 実体モデルを再建下顎デザイン通りにトリミング 2. 再建プレートを 3D 実体モデルの下顎下縁に沿ってベンディング 3. レジンにて下顎と再建プレートの位置を記録したレジンフレームを作成 4. 下顎区域切除後にレジンフレームに残存下顎をはめ込み、残存下顎と再建プレート配置が 3D 実体モデルと同部位に再現されたのを確認し、再建プレートを固定。咬合がある場合には、顎間固定を必ず行う。5. 移植骨は再建プレートをメルクマールにして配置固定する。【成績】各症例の術前後の CT 画像から下顎再建の精度を求めた結果、レジンフレーム使用例の精度は不使用例より有意に高かった。【考察】下顎再建は、術者、施設および患者によってデザインや術式が様々である。しかしレジンフレーム法は、術中の視認性に優れ、手術に関わる者が短時間で情報共有可能な事が利点である。また、高価な機材を必要としないため、各施設で導入可能と考える。【結論】レジンフレーム法は下顎欠損範囲の制限を受けず術前デザイン通りの良好な下顎形態が得られるため、下顎再建の精度を向上させ、術式の標準化に有用である。

P-3-9

上唇癌切除後の欠損に対して Bilateral advancement flap を用いて再建した 1 例
Upper lip reconstruction with bilateral advancement flap

○足立 誠¹、本橋 征之²、太田 貴久²、市田 正成³、村松 泰徳²、住友 伸一郎¹

¹朝日大学歯学部 口腔病態医療学講座口腔外科学分野、²朝日大学歯学部附属村上記念病院 歯科口腔外科、³いちだクリニック

Makoto Adachi¹, Masayuki Motohashi², Takahisa Ohta², Masanari Ichida³, Yasunori Muramatsu², Shinichiro Sumitomo¹
¹Department Oral and Maxillofacial Surgery, Asahi University, School of Dentistry, ²Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Asahi University Murakami Memorial Hospital, ³Ichida Clinic

上唇癌はまれであるが、上唇および鼻腔底を含めた切除後の組織欠損は多様な様相を呈し、切除後の再建には機能性とともにも審美性も要求される部位であり、再建方法の選択において迷うことが多い。今回われわれは上唇癌切除後の幅約 45mm の上唇欠損に対して、bilateral advancement flap を用いた再建を行ったので、その概要を報告する。症例は 45 歳女性、上唇粘膜の潰瘍を主訴に来院した。生検にて扁平上皮癌の病理組織診断を得た。上唇癌 T2N0M0 の診断にて全身麻酔下にて上唇、上顎前歯部歯肉・歯槽骨および右側鼻腔底の合併切除術を施行した。原発巣切除後、上唇には鼻腔底を含めて幅約 45mm の欠損となった。そこで、両側鼻翼外側部、両側口角外側部を含めて切開し、両側上唇を正中へ伸展させる bilateral advancement flap にて欠損部を閉鎖した。術前より欠損範囲を想定し顎義歯を作製、術直後より装着した。術後は感染等の異常無く良好に経過した。上顎歯槽骨欠損部には義歯が装着され咀嚼、発音においても特に問題はみられなかった。審美的には手術前に患者本人が想定していたよりも満足いくものであった。今後は再発の有無等嚴重な経過観察を行いながら、2 次修正手術についても検討していく予定である。

P-3-11

腓骨皮弁採取部における一期縫縮と植皮の比較
Comparison between primary closure and skin graft of free fibula osteocutaneous flap donor site

○渡邊 一博¹、明石 昌也¹、楠元 順哉^{1,2}、松本 耕祐¹、木本 明¹、榎原 晶子¹、長谷川 巧実¹、南川 勉¹、橋川 和信²、古森 孝英¹

¹神戸大学大学院医学研究科 口腔外科学、²神戸大学大学院医学研究科 形成外科

Kazuhiro Watanabe¹, Masaya Akashi¹, Junya Kusumoto^{1,2}, Kousuke Matsumoto¹, Akira Kimoto¹, Akiko Sakakibara¹, Takumi Hasegawa¹, Tsutomu Minamikawa¹, Kazunobu Hashikawa¹, Takahide Komori¹
¹Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Kobe University Graduate School of Medicine, ²Department of Plastic Surgery, Kobe University Graduate School of Medicine

【目的】腓骨皮弁は 20 cm 以上の長さの骨が採取可能なこと・体位変換が不要である等の利点から当科でも頻用している。ただ、同時に採取可能な皮膚・皮下組織の量は豊富でなく、軟組織の欠損量により適応が左右される場合もある。皮弁の採取量が大きくない場合腓骨皮弁採取部は一期縫縮が可能であるが、大きい場合は植皮が必要となる。植皮した群では縫縮した群より術後安静期間が延長する可能性が予想され、両群間に差があれば、その差を理解しておくことで、患者へのより詳細な術前インフォームドコンセントが可能となる。そこで本研究は、腓骨皮弁採取部を一期縫縮した群と植皮した群とで比較検討を行った。【対象と方法】下顎骨区域切除後などに遊離腓骨皮弁移植を施行した 33 例について、皮弁採取部一期縫縮群と植皮群間で、皮弁サイズを比較した。全例で下腿の長軸方向が長い楕円形の皮弁デザインとした。【結果】一期縫縮群 22 例では皮弁長径平均 10.9cm、短径平均 3.8cm、植皮群 11 例では皮弁長径平均 12.4cm、短径平均 4.5cm であった。両群間で長径に有意差は認めなかったが、短径で有意差を認めた (p < 0.05)。【考察および結論】皮弁の短径が長くなる場合採取部に植皮が必要となる可能性が高く、術後安静期間の延長が予想される。腫瘍等に対する軟組織切除量と採取部に植皮を要するかどうかを予測しておくことで、患者への詳細な術前説明が可能となると考えられた。

P-3-10

歯原性粘液腫の切除時に下歯槽神経の部分的修復手術を行った 1 例
A case of nerve repair surgery for myxofibroma

○高崎 義人、片山 雅文

国立病院機構高崎総合医療センター 歯科口腔外科

Yoshito Takasaki, Masafumi Katayama
Oral and maxillo-facial surgery, NHO Takasaki general medical center

従来より、下顎骨良性腫瘍切除時の下歯槽神経の処理法には神経掘り出し術 (Beker 法) や神経縫合術、神経移植術など様々な方法が報告されている。神経縫合に関しては部分的損傷であっても、一度神経幹を全部切断し神経縫合する術式が一般的である。今回私たちは部分的神経損傷に対して損傷部だけの修復を行ったので報告する。症例は 42 歳男性で、数年前より右下顎骨体部の腫脹を自覚するも放置、腫脹部の増大傾向を認めた為、近医歯科受診、2015 年 3 月当科紹介により来院。初診時右頬部に 56x52x32mm の外向性腫瘍を認めた。CT では境界明瞭単房性の骨透過像を示し、下顎管は下顎下縁方向に圧排された状態で、腫瘍部との境界は明瞭であった。2015 年 3 月 25 日局所麻酔下に生検を行った。病理検査結果は粘液線維腫の疑いであった。2015 年 5 月全身麻酔下に下顎骨切除手術とチタン製リコンストラクションプレートと腸骨による再建を行った。下歯槽神経の処理は Becker 法による神経保存を予定し、腫瘍との癒着が強い場合には神経縫合や神経移植を行うこととした。オトガイ孔は前方に圧排され同部の神経には強度の緊張がかかっている状態、剥離時に分枝の 1 本が切断された状態が確認できた。切断部位を手術用顕微鏡下 (x 8) に神経周膜縫合した。術後の感覚障害範囲より同部の神経はオトガイ枝であると判断された。

P-3-12

大分赤十字病院口腔外科における遊離組織移植
Free flap transfer in Oita red cross hospital

○平井 英治¹、去川 俊二²、今井 亮太¹、西川 健¹、山本 晃三¹

¹大分赤十字病院 歯科・口腔外科、²自治医科大学 形成外科

Eiji Hirai¹, Syunji Sarukawa², Ryota Imai¹, Takeshi Nishikawa¹, Kojo Yamamoto¹
¹Department of Oral and Maxillofacial Surgery Oita Red Cross Hospital, Oita, Japan, ²Department of Plastic Surgery Jichi Medical University, Tochigi, Japan

＜緒言＞口腔がんの外科治療において、いまや再建手術はかくことの出来ない手技である。有茎皮弁では対応困難な症例もあり、当院では 2011 年 8 月から口腔外科で遊離組織移植による再建手術を導入した。しかしこれには皮弁の全壊死という問題がある。今回再建手術導入後からの結果を評価したので報告する。＜対象と結果＞2011 年 8 月から 2015 年 8 月までに遊離組織移植による口腔再建手術を 35 例に行った。遊離組織の内訳は前腕 17 例、腓骨 13 例、腹直筋 3 例、前外側大腿皮弁 2 例であった。症例の内訳は、即時再建症例 30 例、二期再建 5 例で、原疾患の内訳は舌、口腔底癌 16 例、下顎骨肉癌 10 例、頬粘膜癌 4 例、上顎骨肉癌 3 例、良性腫瘍 2 例であった。組織の全壊死を前外側大腿皮弁で 1 例、腓骨皮弁で 1 例認めた。＜考察＞2 例の全壊死症例のうち、1 例は前外側大腿皮弁の皮弁挙上の問題により、1 例は血管の圧迫による血流障害で壊死に至り、両者とも皮弁の救済はできなかった。前外側大腿皮弁は他の皮弁と比較し、習得に時間を要すること、挙上に際し問題が生じやすいことから、他の皮弁で対応するようにした。腓骨皮弁の壊死症例は、粘膜欠損が少なく、皮弁を入れずにドップラーでモニタリングを行い、組織による圧迫で血流障害を来したが、感知できず壊死した。モニタリングを確実に、また組織による血管の圧迫を避けるため、このような症例や二期再建の症例に対して、皮弁を入れて対応するようにした。

P-3-13

局所的炭酸ガス投与による皮弁壊死抑制効果

The effect of local application of transcuteaneous carbon dioxide on the survival of random pattern skin flap

○齊藤 泉、長谷川 巧実、武田 大介、岩田 英治、有本 智美、
寛 康正、高橋 佑輔、榊原 晶子、明石 昌也、南川 勉、
古森 孝英

神戸大学大学院医学研究科 外科系講座口腔外科学分野

Izumi Saito, Takumi Hasegawa, Daisuke Takeda, Eiji Iwata, Satomi Arimoto, Yasumasa Kakei, Yuusuke Takahashi, Akiko Sakakibara, Masaya Akashi, Tsutomu Minamikawa, Takahide Komori
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Kobe University Graduate School of Medicine, Kobe, Japan

【緒言】口腔癌再建手術において、皮弁壊死は再手術、治療期間の延長など、患者にとって多大な苦痛を与えることとなる。しかし、皮弁壊死を防ぐ方策としては、臨床的に遷延皮弁とある種の薬剤のみというのが現状であり、いまだ皮弁血流改善のための有効な方法は少ない。われわれは以前に局所的炭酸ガス投与が組織内の低酸素状態を改善することを発見した。本研究はラット有茎皮弁モデルに対し、局所的炭酸ガス投与を行い、血管新生の促進、低酸素環境の改善に伴う皮弁血流改善効果について検討した。【材料・方法】SD ラット背部に McFarlane 法に準じた 8 × 3cm の皮弁術を施行し、皮弁作成後 1 日後より経皮的に炭酸ガス投与 (20 分/day × 5 日間) を行い、皮弁作成後 1、3、5 日目の皮弁生着範囲を評価した。また実験終了後 (5 日目) に生着した皮弁組織から標本を採取し、基部、中央、遠心の 3 部位における血管新生因子 (bFGF、VEGF)、低酸素誘導因子 (HIF1 α) を Real-time PCR, Western-blot 法、免疫染色法を用いて評価した。【結果】コントロール群と比較して、炭酸ガス投与群において皮弁壊死抑制効果が認められ、bFGF、VEGF の増加、HIF-1 α の減少を認めた。【結語】局所的炭酸ガス投与による血管新生の促進が明らかになり、皮弁壊死抑制効果が示唆された。

P-3-15

移植腓骨と下顎骨の癒合における骨膜温存の重要性

Importance of periosteal preservation for bone union of transferred fibula flaps in reconstructed mandibles

○明石 昌也¹、寛 康正¹、榊原 晶子¹、長谷川 巧実¹、南川 勉¹、
橋川 和信²、古森 孝英¹

¹神戸大学大学院医学研究科 口腔外科学、²神戸大学大学院医学研究形成外科学

Masaya Akashi¹, Yasumasa Kakei¹, Akiko Sakakibara¹, Takumi Hasegawa¹, Tsutomu Minamikawa¹, Kazunobu Hashikawa², Takahide Komori¹
¹Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Kobe University Graduate School of Medicine, ²Department of Plastic Surgery, Kobe University Graduate School of Medicine

【目的】口腔癌に対する下顎骨区域切除等による顎欠損に対し、腓骨皮弁は 20 cm 以上の長さの骨が採取可能なことや、体位変換も不要であるという利点から当科でも頻用している。近年再建顎骨に対する歯科インプラントの応用が普及しつつある反面、多くの解決すべき課題がまだ残されている。下顎再建症例では残存下顎骨断端と移植骨の骨癒合の程度が再建下顎骨の強度になる (西川ら、頭頸部腫瘍, 1999)。再建下顎骨に対し歯科インプラント埋入を考慮する場合、残存下顎骨と移植骨の骨癒合について理解しておくことで、強度の乏しい再建下顎骨への咬合負荷等のリスクを未然に防ぐことが可能となる。【対象と方法】下顎骨区域切除後などに遊離腓骨皮弁移植を施行し、術後 2 年以上パノラマ X 線と CT で経過観察し得た 20 症例に対し骨癒合の程度を経時的に評価した。【結果】全 56 骨接合部中、術後 2 年で癒合した症例は 51 接合部 (91%) であった。CT 軸位断で評価した結果、唇側骨接合部よりも舌側骨接合部で癒合が遅延することが判明した。【考察および結論】パノラマ X 線に加え CT 軸位断で評価することで、移植骨と残存下顎骨の癒合の程度がより詳細に評価可能となり、歯科インプラント埋入時期の検討等に寄与するものと考えられた。また舌側骨接合部での癒合は温存された骨膜下で仮骨形成が起こっている可能性が考えられ、改めて再建手術時の骨膜温存の重要性が示唆された。

P-3-14

インドシアニングリーン (ICG) 造影法で術中に吻合血管の血流を評価した前腕皮弁再建の 1 例

A case of forearm flap reconstruction evaluated the blood flow of vascular anastomosis using indocyanine green (ICG) angiography at intraoperative

○江口 貴紀¹、石田 璃久磨^{1,2}、荒 範博^{1,2}、金井 郁代^{1,2}、
川口 浩司²

¹東芝林間病院、²鶴見大学歯学部 口腔顎顔面外科学講座

Takanori Eguchi¹, Rikuma Ishida^{1,2}, Hironori Ara^{1,2}, Ikuyo Kanai^{1,2}, Kouji Kawaguchi²
¹Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Toshiba Rinkan Hospital, ²Department of Oral and Maxillofacial Surgery, School of Dental Medicine, Tsurumi University

【諸言】インドシアニンググリーン (ICG) は肝機能検査等で広く使用されている緑色色素である。一方で、血管内リアルタイムに造影できることから、近年、微小血管循環法として ICG 血管造影検査が広く応用されている。今回我々は、舌癌における前腕皮弁再建に対して、ICG 血管造影を行い、皮弁への血流確認に対する有用性を確認したため、それを報告する。【症例】66 歳男性。左舌癌、T2(late)N0M0、YK-4C 内向型の扁平上皮癌に対して左舌半側切除術、左機能的頸部郭清術、前腕皮弁再建術、腹部植皮、気管切開を行った。左前腕から採取した皮弁は顔面動脈と橈骨動脈を端端吻合し、橈骨静脈 (深部静脈および正中皮静脈系) をそれぞれ外頸静脈に端端吻合、内頸静脈に端端吻合した。血管クリップを外してリークが無いこと確認し、ICG 2.5mg/ml を 2ml 静注したところ、端端吻合した箇所 ICG の造影効果を認めなかった。吻合部を確認したところ、縫合糸が血管を巻き込んでいることが確認された。抜糸し、再度吻合して ICG を静注すると吻合箇所造影効果を確認できた。術後皮弁の生着は良好で、断端壊死もほぼ認めず経過している。【結論】遊離皮弁再建における ICG の使用は、皮弁への血流をリアルタイムに評価できる有用な方法であると考えた。

P-4-1

3D プリント石膏模型の硬化処理が表面性状と寸法精度に及ぼす影響

Influence of hardening treatment to 3D printed plaster model on surface roughness and dimensional accuracy

○石崎 憲^{1,2}、萩尾 美樹^{1,2}、野村 武史^{2,3}、小林 健一郎⁵、
高野 伸夫²、柴原 孝彦⁴、櫻井 薫¹

¹東京歯科大学 老年歯科補綴学講座、²東京歯科大学 口腔がんセンター、³東京歯科大学 オーラルメディスン・口腔外科学講座、⁴東京歯科大学 口腔顎顔面外科学講座、⁵こばやし歯科クリニック

Ken Ishizaki^{1,2}, Miki Hagio^{1,2}, Takeshi Nomura^{2,3}, Kenitrou Kobayashi⁵, Nobuo Takano², Takahiko Shibahara⁴, Kaoru Sakurai¹
¹Department of Removable Prosthodontics & Gerodontology, Tokyo Dental College, Tokyo, Japan, ²Oral Cancer Center, Tokyo Dental College, ³Department of Oral Medicine, Oral and Maxillofacial Surgery, Tokyo Dental College, ⁴Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Tokyo Dental College, ⁵Kobayashi Dental Clinic, Tokyo

【目的】腫瘍切除後の口腔顎顔面欠損症例において、著しい開口障害が認められる症例や咽頭部の補綴が必要な症例などには補綴装置作製のための印象採得が困難または断念せざるを得ないケースが多く存在する。これまでわれわれはこのような印象採得困難症例に対し、三次元造形技術を補綴装置作製プロトコルへ組み込むことで顎補綴装置を作製してきた。具体的な手法は、X 線 CT データから軟組織三次元形態を抽出し、3D プリントにより作業用模型を作製する。これは従来の間接法での義歯製作法で必須行程であった印象採得および模型作製の代替行程とするものである。しかし、3D プリントモデルはその素材、積層法、表面処理法などにより、その強度や表面性状が大きく変化し、現在のところ顎補綴装置作製への最適化は行われていない。そこで今回われわれは 3 次元造形技術による顎補綴用模型作製法の確立を目的に模型硬化処理が模型表面性状と寸法精度に及ぼす影響を検索した。【方法】無菌顎シリコーン模型を用い、1. 従来法と 2. 三次元造形技術応用法で模型作製、実験床ワックスアップ、レジン置換まで行った場合の模型および実験レジン床の表面性状と寸法精度を比較検討した。【成績】3D プリント石膏模型は表面硬化処理により大きな寸法変化を起こすことなく表面性状が改良され、レジン填入に耐えうる強度を持つことが明らかとなった。

P-4-2 **口腔癌術後インプラント補綴症例の周囲粘膜性状によるメンテナンス、予後への影響～長期経過症例を中心に～**
The influence of the mucosal property around implants with the patients after oral cancer treatment

○住田 知樹
九州大学病院 顔面口腔外科

Tomoki Sumida
Kyusyu University Hospital, Oral & Maxillofacial Surgery

口腔癌手術により顎骨を失った患者は、様々な機能を失うことを余儀なくされる。中でも、術前には何らかの方法で維持していたであろう咬合機能を失うことは、栄養状態や機能面だけでなく、精神的にも大きな影響を与える場合がある。我々口腔外科医は、口腔癌を治癒させることは当然の目的であるが、その後、失った機能を回復することにも目を向けなければならない。その中でもインプラントは咬合機能回復の強力なツールとして、適応症例には積極的に応用すべきである。今回、口腔癌術後にインプラント補綴を行い5年経過した33例に関して特に、インプラント周囲粘膜の性状に関して、メンテナンスや予後に与える影響を調査した。腭骨や大胸筋などの皮弁再建が行われている場合、基本的には植皮に置き換えてインプラント埋入をすることが良いと思われるが、患者の意向、それまでの治療による疲弊により、もう一度の手術は受け入れられない場合もある。そのような際は、皮弁をdenudeし、できるだけ薄い状態で埋入を行うが、特に腹直筋などは難しい場合も多い。薄く処理したつもりでも、その周囲を囲む皮弁はbulkyな場合がほとんどで、このような際は、ポケットが深くなるのが避けられない。一方、植皮例では症例によっては通常症例と変わらない術後のプロトコルが適応できる場合も有る。今回はインプラント周囲環境の違いがどのような影響を及ぼすか概説したい。

P-4-3 **口腔癌切除時に即時インプラント埋入を施行した広範囲顎骨支持型補綴の臨床的検討**
Clinical consideration of the cases treated with dental implant at the same time resection of oral cancer

○林田 咲、坂本 由紀、鳴瀬 智史、六反田 賢、柳本 惣市、梅田 正博
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 口腔腫瘍治療学分野

Saki Hayashida, Yuki Sakamoto, Tomofumi Naruse, Satoshi Rokutanda, Souichi Yanamoto, Masahiro Umeda
Department of Clinical Oral Oncology, Nagasaki University Graduate School of Biomedical Sciences

【諸言】2012年4月より腫瘍などで広範囲な顎骨欠損や歯槽骨欠損となった症例に対し「広範囲顎骨支持型装置と広範囲顎骨支持型補綴」としてインプラント治療が保険導入された。また当科では腫瘍切除と同時にインプラント埋入を行うことで、可能な限り早期に咬合再建を行い、患者のQOLの維持・向上に努めている。今回当科で口腔癌切除時に即時インプラント埋入を行った広範囲顎骨支持型補綴について検討を行ったので報告する。【対象・方法】2012年4月から2015年9月に口腔癌に対して当科で腫瘍切除および即時インプラント埋入を施行し広範囲顎骨支持型補綴による治療を行った7例について経過を後ろ向きに検討した。【結果】上顎の既存骨にインプラント埋入したものが6例、下顎1例であった。顎義歯装着が2例、顎義歯作製中のものが2例、インプラント埋入のみが3例であった。顎義歯の装着が完了している2例については咬合再建による摂食機能の回復が良好であった。【考察】口腔癌切除後に改めてインプラント埋入術を行う場合と比較すると、腫瘍切除時に同時にインプラントを埋入する方が患者の負担は少なく、咬合再建までの期間や予後などを考慮するとQOLの維持において有効だと考えられた。しかし、インプラントを埋入しても上部構造装着まで至らなかった症例もみられたことから、その適応については十分な配慮が必要と考えられた。

P-4-4 **口腔腫瘍患者に対する広範囲顎骨支持型装置についての臨床的検討**
A clinical study of bone anchored device used in oral tumor patients for the treatment of wide edentulous area

○北村 淳¹、田沼 裕志¹、野上 晋之介¹、川井 忠¹、樋口 景介¹、宮下 仁²、橋元 亘¹、森 士朗¹、山内 健介¹、小山 重人²、高橋 哲¹

¹ 東北大学大学院 口腔病態外科学講座顎顔面口腔外科学分野、
² 東北大学病院 顎口腔再建治療部

Jun Kitamura¹, Yuji Tanuma¹, Shinnosuke Nogami¹, Tadashi Kawai¹, Keisuke Higuchi¹, Hitoshi Miyashita², Wataru Hashimoto¹, Shiro Mori¹, Kensuke Yamauchi¹, Shigetoe Koyama², Tetsu Takahashi¹
¹Division of Oral and Maxillofacial Surgery, Tohoku University Graduate of Dentistry, ²Maxillofacial Prosthetics Clinic, Tohoku University Hospital

【目的】インプラント治療は1952年ブローネマルク氏が純チタンと骨のオッセオインテグレーションを発見して以来大きく発展し、本邦でも2012年4月より一部保険適応となった。今回、我々は口腔腫瘍と関連してインプラント治療を行った症例について検討したのでここに報告する。【方法】当院インプラントセンターが開設した2013年4月から同センターにて広範囲顎骨支持型装置による治療を行った8症例を対象とした。性別、年齢、顎堤の欠損となった原疾患、骨増生の有無や方法、埋入部位、使用したインプラントの種類・径・長さ、上部構造のタイプ、臨床経過を検討項目とした。【成績】平均年齢63.8歳±8.04、男性6例、女性1例で原疾患は悪性腫瘍が5例、エナメル上皮腫が3例であった。4例でチタンメッシュによる骨増生を行った。使用したインプラントはBraunemark System MkIIIが最も多かった。上部構造は4例でブリッジタイプ、4例がインプラントオーバーデンチャー（バーアタッチメント2例、ローケーター2例）であった。埋入した総本数は27本で1本にインプラント周囲炎による脱落があった。【結論】広範囲顎骨支持型装置による顎補綴治療の概要を検討した。2012年4月より一部広範囲支持型装置および補綴治療に保険適応となったが、コストの面からサージカルガイドの使用が難しい場合や補綴治療に制限があるなどの課題点があり、今後症例数を増やしさらなる検討と改善を目指していきたい。

P-5-1 **がん化学療法による好中球減少症予防に対するベグフィルグラスチム（ジーラスタ）の使用経験**
Use experience of pegfilgrastim for neutropenia prevention of cancer chemotherapy

○小原 圭太郎、山本 翼、鎌田 孝広、山田 慎一、栗田 浩
信州大学医学部 歯科口腔外科教室

Keitaro Kohara, Tubasa Yamamoto, Takahiro Kamata, Shinichi Yamada, Hiroshi Kurita
Department of Dentistry and Oral Surgery, Shinshu University School of Medicine

（背景）G-CSF製剤は、がん化学療法による好中球減少症の治療に対して広く臨床で使用されている。国内で承認されているこれまでのG-CSF製剤は発熱性好中球減少症に対する予防投与が認められていない。また、半減期が短いため好中球数が回復するまで連日投与が必要となり患者の負担が大きかった。2014年11月に発売されたベグフィルグラスチム（ジーラスタ）は持続型G-CSF製剤であり、予防的投与が可能になり、連日投与の必要がなくなった。今回我々は進行口腔癌における多剤併用化学療法において、ベグフィルグラスチムを使用し若干の知見を得たので報告する。

（症例1）右側顎下腺筋上皮癌（T3N2bM1）肺転移に対してExtreme試験に準じてC-mab + CDDP + 5FUを投与後16日目にGrade3の骨髄抑制が出現、2コース目に前コースの骨髄抑制を考慮し、5FU投与終了後2日目にベグフィルグラスチムを投与。骨髄抑制もGrade1程度で経過し、その後は副作用なく回復した。

（症例2）下顎歯肉癌（T4aN2cM0）に対して術前化学療法TPF（DOC + CDDP + 5FU）を施行。投与後6日目でGrade3の骨髄抑制が出現、ベグフィルグラスチムを使用し、その後は副作用なく回復した。

（結論）ベグフィルグラスチムの登場によって予防投与が可能となり、抗がん剤の投与量や治療スケジュールの遵守に寄与できると考えられた。多剤併用の化学療法における投与のタイミングに関しては検討が必要であろう。

P-5-6

脳出血後片麻痺患者の下顎歯肉癌に対して Cetuximab が有効であった 1 例
A case of oral cancer of lower gingiva in hemiplegic patient treated with Cetuximab

○吉濱 直哉、小川 芙美、雨河 茂樹、橘川 芳明、生田 有樹子、大西 徹郎
市立池田病院 歯科口腔外科

Naoya Yoshihama, Fumi Ogawa, Shigeki Amekawa, Yoshiaki Kitsukawa, Yukiko Ikuta, Tetsuo Onishi
Department of Oral and Maxillofacial surgery, Ikeda Municipal Hospital

超高齢者や有病者の癌治療の際に QOL や ADL の維持、全身状態を考慮することは治療を遂行する上で非常に重要である。今回、脳出血後片麻痺による全介助を要する患者の下顎歯肉癌の治療にあたり、当初は外科的治療の適応外と考え Cetuximab を用いた化学療法を行い、著明な腫瘍縮小効果により低侵襲に根治的治療を遂行できた 1 例を経験した。患者は 76 歳男性。左下 67 歯肉に骨破壊を伴う 25mm 大の潰瘍性病変を認め、精査の結果左側下顎歯肉扁平上皮癌 (T4aN0M0) であった。患側の完全麻痺であり再建を伴う長時間の手術が困難であることなどから根治的手術は適応外と判断し Cetuximab-FP 療法を firstline として選択し 2 クール施行した。腫瘍縮小率は 58.9% であり治療効果判定は PR であった。組織学的治療効果判定目的に局所麻酔下にて最小範囲で切除生検を施行し Grade2 であった。その後 Cetuximab の単独投与を計 12 回施行したが、休薬の 3 ヶ月後に局所再発を来したため、secondline として weekly paclitaxel、Cetuximab の併用療法を選択し 1 クール施行した。著明な腫瘍縮小効果を認めたため、機能を温存した根治的手術が可能と判断し下顎骨辺縁切除術を施行した。組織学的治療効果判定は Grade2 であった。いずれも治療中止に至る有害事象や infusion reaction は認めなかった。術後半年経過し、PS は術前より上昇し、再発転移なく良好である。

P-5-8

口腔癌に対する DOC,CDDP,PEP 動注・5-FU 静注化学療法
Intra-arterial chemotherapy with DOC, CDDP and PEP combined with intravenous chemotherapy with 5FU for oral cancer

○長谷川 博¹、金子 哲治¹、山崎 森生¹、菅野 千敬¹、遠藤 学²、門馬 勉²、鹿野 真人³
¹福島県立医科大学附属病院 歯科口腔外科、²大原綜合病院 歯科口腔外科、³大原綜合病院 頭頸部顔面外科

Hiroshi Hasegawa¹, Tetsuharu Kaneko¹, Morio Yamazaki¹, Chihiro Kanno¹, Manabu Endo², Tsutomu Monnma², Makoto Kano³
¹Department of Dentistry and Oral Surgery, Fukushima Medical University Hospital, Fukushima, Japan, ²Department of Dentistry and Oral Surgery, Ohara General Hospital, Fukushima, Japan, ³Department of Head and Neck, Facial Surgery, Ohara General Hospital, Fukushima, Japan

【緒言】口腔癌に対しセタキセル (DOC)、シスプラチン (CDDP)、ペパロマイシン (PEP)、5-FU による多剤併用動注化学療法をおこない、その有効性と安全性について検討した。【方法】2003 年 3 月から 2015 年 2 月まで、根治的治療目的に本療法を行った未治療の口腔扁平上皮癌症例 143 例を対象とした。年齢は 27 ~ 93 歳、平均 65 歳。部位は舌口腔底 69 例、頬粘膜 26 例、上顎歯肉 23 例、下顎歯肉 25 例。全例に浅側頭動脈から後頭動脈経路で動注用カテーテルを留置した。レジメンは、DOC 30-40mg、CDDP30-40mg、PEP10mg/body を動注で、5FU2500mg/body を静注で 10 日間投与か、2012 年以降は 5 日間投与に変更し、1 クールもしくは 2 クールを行なった。放射線治療は 39 例に併施した。手術は 135 例に、特に、CR 例では縮小手術を行った。【結果ならびに考察】原発巣に対する効果は CR 率 56%、PR 率 43%、pCR 率 41% であった。原発再発は 21 例 (15%) に認め、9 例が制御できなかった。5 年生存率は全体で 79%、Stage 別では、S2(59 例)84%、S3(35)83%、S4(49)69% であった。副作用は、脳血管障害はなく、grade2-3 の粘膜炎と脱毛が主であった。本療法の有効性と安全性は高く、高齢者などハイリスクの症例にも適応し得ると考えられた。

P-5-7

セツキシマブ併用化学療法施行患者に対し CV ポートを留置した症例の検討
Examination of the case that detained CV port for a cetuximab combination chemotherapy enforcement patient

○猪俣 徹^{1,2}、多田 雄一郎¹、増淵 達夫¹、伏見 千宙^{1,2}、松木 崇¹、菅野 千敬¹、三浦 弘規¹

¹国際医療福祉大学三田病院 頭頸部腫瘍センター、²千葉徳洲会病院 頭頸部外科センター

Toru Inomata^{1,2}, Yuichiro Tada¹, Tatsuo Masubuchi¹, Chihiro Fushimi^{1,2}, Tkashi Matsuki¹, Chihiro Kanno¹, Koki Miura¹
¹Department of Head and Neck Oncology and Surgery, International University of Health and Welfare Mita Hospital, ²Department of Head and Neck Surgery, Chiba Tokusuyuki Hospital

頭頸部癌において、局所進行・再発・転移症例に対しては、CDDP + 5-FU + セツキシマブもしくはセツキシマブ+パクリタキセルが治療オプションとして推奨されており、当科でも外来化学療法施行患者に対しセツキシマブ+パクリタキセルを施行している。基本的には投与開始から効果判定で PD になるまで投与を継続するが、さ瘡様皮疹が Grade3 以上になると末梢路の確保が困難になってくる。そこで当科ではセツキシマブ+パクリタキセル施行患者で、末梢確保困難症例に対し CV ポートを挿入し管理をおこなった。対象は、2015 年 4 月からとし、セツキシマブ+パクリタキセル施行中で、末梢路確保が困難と判断し、CV ポート挿入に対し同意が得られた患者とした。CV ポート挿入症例は全 11 例で、10 例は上腕留置、1 例は鎖骨上留置であった。しかし、挿入したポートを使用し数コース投与した直後、38℃以上の発熱をきたし、CV ポート感染と診断・抜去した症例は 4 例と多かった。抜去した 4 例ともさ瘡様皮疹は Grade3 以上であり、セツキシマブ使用患者の副作用であるさ瘡様皮疹が CV ポート感染に大きく関わるものと思われた。今後も症例を積み重ねた検討が必要である。

P-5-9

1 次治療後に再発およびルビエールリンパ節転移を認めた下顎歯肉癌に対してセツキシマブ併用化学療法を施行し著効した 1 例
Good prognosis case of mandible squamous carcinoma with recurrence and Rouviere lymph node metastasis after primary treatment using cetuximab+cisplatin+5-FU

○松岡 裕大、和田 剛信、北村 龍二
関西労災病院 歯科口腔外科

Yudai Matsuoka, Takenobu Wada, Ryuji Kitamura
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Kansai Rosai Hospital

今回我々は、1 次治療後に再発およびルビエールリンパ節転移を認めた下顎歯肉癌に対してセツキシマブ併用化学療法を 3 クール施行し著効した 1 例を経験したので報告する。症例は 60 歳代の男性で cT4aN2bM0 の診断下、右側下顎歯肉癌にて下顎区域切除術、右側全頸部郭清術、左側上頸部郭清術、金属プレートおよび腹直筋皮弁による再建術を施行した。術後病理組織検査結果にて被膜内浸潤ではあるが複数個の転移リンパ節を認めたため、シスプラチン (80 ミリグラム / 平方メートル / 3 週間) および原発巣切除断端陰性ではあったが原発巣を含む放射線照射 (60Gy/30fr) による化学放射線療法を施行した。以後経過観察を行い経過は良好であったが、1 次治療終了後約 1 年半で右側頰粘膜に再発および右側ルビエールリンパ節に転移を認めた。そこでセツキシマブ (初回投与量 400 ミリグラム / 平方メートル、2 回目以降投与量 250 ミリグラム / 平方メートル) + シスプラチン (80 ミリグラム / 平方メートル) + 5-FU (2000 ミリグラム / 平方メートル) を施行したところ、3 クール終了後の PET-CT による画像検査上は右側頰粘膜の再発および右側ルビエールリンパ節の転移は完全に消失した。現在も経過観察中であり同部に再発・転移等は認めていない。

ご案内
プログラム
特別講演
招聘講演
シンポジウム
ワークショップ
学術セミナー
アブスターンセミナー
インテグレーション
看護師・歯科衛生士
セッション
フェイスブック
インターネットホスター
一般演題
発表者別索引

P-5-10

外来通院下で Mohs ペーストを用いて chemosurgery を行った末期下顎歯肉癌の 1 例
A case of the terminal mandibular gingival cancer using Mohs paste for chemosurgery under ambulatory

○齊藤 昌樹¹、川口 拓郎¹、久馬 孝仁¹、長嶺 健二郎²、夫 才成²、澤木 佳弘¹

¹総合病院中津川市民病院 歯科口腔外科、

²中東遠総合医療センター 歯科口腔外科

¹Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Nakatsugawa Municipal General Hospital, ²Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Chutoen General Medical Center

【諸言】近年、根治治療が不可能な進行癌の皮膚転移症例や頭頸部癌進行症例において姑息的な腫瘍の減量や悪臭、出血、滲出液の抑制に Mohs ペーストが使用されている。今回われわれは、外来通院下で Mohs ペーストを用いて chemosurgery を行った末期下顎歯肉癌の 1 例を経験したので報告する。【症例の概要】患者：84 歳、女性。主訴：右下 8 周歯肉疼痛。既往歴：高血圧症、心房細動。現病歴：2009 年 9 月頃に右下 8 歯肉疼痛を自覚。2010 年 1 月当初初診。病理・画像診断にて右側下顎歯肉扁平上皮癌、T2N2bM0 の結果を得た。治療経過：外科療法は希望されず、化学放射線療法 (S-1:80mg/日) を 2 週投与、1 週休薬、放射線治療 :60Gy/30 回) を施行した。腫瘍は肉眼的に消失したが、2011 年 7 月 局所再発を認め、腫瘍は緩徐に増大し、2012 年 8 月には疼痛管理のためオキシドロンが開始となった。2012 年 10 月 右側下顎皮膚へ浸潤した腫瘍が有茎性に増大し、表面からは出血や滲出液を伴うようになった。Mohs ペーストによる chemosurgery を外来通院下にて行うことを計画し、治療を開始した。Mohs ペーストを塗布し、約 24 時間後に腫瘍部の固定化された部位を無麻酔下にて切除することを繰り返し行い腫瘍を減量した。出血・滲出液は制御され、ガーゼ交換も 1 回 / 日で済むようになった。chemosurgery を開始して 2 か月後、経口摂取困難となり、全身状態が悪化、衰弱し chemosurgery を行ってから約 3 か月後、自宅で永眠された。

P-5-11

当科における口腔癌に対する超選択的動注化学放射線療法による頸部リンパ節制御に関する検討
A clinical study of control of the cervical lymph node by the superselective intra-arterial infusion chemoradiotherapy for oral cancer

○丹下 和久¹、中島 克仁¹、脇田 壮¹、福田 幸太²

¹春日井市民病院 歯科口腔外科、²愛知学院大学歯学部 顎口腔外科学講座

Kazuhiisa Tange¹, Katsuhito Nakashima¹, Takeshi Wakita¹, Kota Fukuta²
¹Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Kasugai Municipal Hospital, ²Department of Oral and Maxillofacial Surgery, School of Dentistry, Aichi-Gakuin University

【緒言】当科では口腔癌に対して浅側頭動脈よりの逆行性超選択的動注化学療法を実施してきた。当科の動注化学放射線療法は血流改変術を併用することが多く、原発腫瘍のみならず、転移リンパ節にも効果的であることを報告してきた。今回われわれは、治療前後において頸部リンパ節転移について検討したので、概要を報告する。【対象】対象は当科において超選択的動注化学療法を施行した Stage3・4 症例の口腔癌で、最低 12 ヶ月以上の経過観察期間のある 61 症例である。性別は男性 31 例、女性 30 例で、年齢は 35 歳から 93 歳まで、平均 68.0 歳、中央値は 70 歳であった。部位別では舌癌 22 例、上顎歯肉癌 18 例、下顎歯肉癌 10 例、頬粘膜癌 8 例、口底癌 3 例であった。画像診断で治療開始前にリンパ節転移陽性と診断した症例は 40 例であった。【結果】治療開始前に転移リンパ節陽性と診断された 40 症中で、治療終了後に一端縮小したものの、同部の再発所見が認められた症例は 5 例あった。また治療開始前にはなかった部位に新たなリンパ節転移を認めた症例は、61 症例中 3 例あった。以上の 8 例においては動注化学放射線療法のみでのリンパ節の制御が不能であり、追加の頸部郭清術や放射線治療を実施したが、それ以外の症例は動注化学放射線療法のみで、頸部リンパ節の制御が可能であった。【結論】当科における口腔癌に対する超選択的動注化学療法は、頸部リンパ節の制御にも効果的であると考えられた。

P-6-1

口腔癌に対する強度変調放射線治療に関する臨床的検討 — 急性期有害事象と総治療期間について —
Clinical evaluation of intensity modulated radiation therapy of oral cancer -Acute adverse events and overall treatment time-

○工藤 隆治、玉谷 哲也、藤澤 健司、工藤 景子、高丸 菜都美、永井 宏和、宮本 洋二

徳島大学大学院医歯薬学研究所 口腔外科学分野

Takaharu Kudoh, Tetsuya Tamatani, Kenji Fujisawa, Keiko Kudoh, Natsumi Takamaru, Hirokazu Nagai, Youji Miyamoto
Department of Oral Surgery, Institute of Biomedical Sciences, Tokushima University Graduate School, Tokushima, Japan

【目的】強度変調放射線治療 (IMRT) は通常照射 (三次元原形照射) に比べて有害事象が少ないとされているが、口腔癌治療に対する報告は少ない。そこで、今回、口腔癌に対する IMRT と通常照射について、口内炎などの急性期有害事象と総治療期間について比較検討した。【対象と方法】2008 年 4 月から 2015 年 9 月までに、当科で施行した IMRT 8 例、通常照射 49 例の計 57 例を対象とした。線量分割は両法ともに 1 日 1 回 2 Gy とした。内訳は、IMRT 群では術後照射 7 例、根治的放射線治療 (手術拒否) 1 例、通常照射群では術後照射 34 例、根治的放射線治療 (手術拒否) 15 例であった。口内炎の程度は CTCAE v3.0 で評価した。総治療期間は最短で完遂終了する日数を基準として延長日数を評価した。【結果】口内炎は、IMRT 群では全例 Grade(G3)、通常照射群では G2 が 3 例、G3 が 46 例で、その程度に有意な差はなかった。G3 の口内炎の発現時期は、IMRT 群では 55 ± 14Gy、通常照射群では 51 ± 15Gy で、IMRT 群で発現が遅れる傾向にあったが有意差はなかった。総治療期間の延長は IMRT 群で 5 ± 4 日、通常照射群で 11 ± 9 日であり、IMRT 群で有意に短かった。【結論】口腔癌に対する IMRT は、通常照射と比較して、総治療期間の延長が有意に少なかった。これは、IMRT によって口内炎の発現が遅れる傾向にあったことが原因と考えられた。

P-6-2

口腔癌放射線外照射療法による有害事象の検討 — Face Scale を用いた急性期評価 —
Acute side effects induced by external beam radiation therapy for oral cancer -Face Scale evaluation-

○山口一竹澤 晴香^{1,2}、織田 隆昭²、諏江 美樹子²、亀田 綾子²、佐々木 善彦²、羽山 和秀²、土持 眞²

¹日本歯科大学 生命歯科学講座、²日本歯科大学新潟生命歯学部 歯科放射線学講座

Haruka Yamaguchi Takezawa^{1,2}, Takaaki Oda², Mikiko Sue², Ayako Kameta², Yoshihiko Sasaki², Kazuhide Hayama², Makoto Tsuchimochi²
¹Department of Life Science Dentistry, The Nippon Dental University, ²Department of Oral and Maxillofacial Radiology, The Nippon Dental University School of Life Dentistry at Niigata

【緒言】放射線治療スケジュールの遂行の障害になる一因として急性期障害がある。今回、口腔癌放射線外照射療法を受けた患者の急性期障害の様態を自覚症状を中心に検討した。【対象と方法】2010 年 7 月～2013 年 6 月までに日本歯科大学新潟病院歯科放射線科において放射線外照射療法 (ライナック、PRIMUS MID-Energy 4MeV, TOSHIBA) を受けた口腔扁平上皮癌 35 例で、男性 19 名、女性 16 名、平均年齢は 65.3 歳 (35 歳～82 歳) であった。原発部位は舌が 9 例、頬粘膜 8 例、上顎歯肉 5 例、下顎歯肉 7 例、口底 4 例、下口唇と多発がそれぞれ 1 例で、放射線量は 30 ～ 68Gy であった。Face Scale (Lorish ら、1986) を用いて、口腔粘膜疼痛、乾燥、味覚、咽頭痛、皮膚症状、放射線治療の辛さの 6 項目に関し、患者による副障害評価を継続的に行った。同時に米国 National Cancer Institute (NCI) の「Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v4.0」を 1 部改変し、術者による患者の副障害の評価も行った。【結果】口内炎の程度は一定のパターンを示すのに対し、患者の自覚的評価は患者個々で様々な度合いを示し、術者評価と患者の評価に違いが見られた。【結論】Face Scale は副障害の自覚的評価として簡便で有用であった。急性期障害の様態は他覚的所見と自覚的評価に乖離が見られた。治療スケジュールの遂行の妨げとなる因子は多様なので今後症例を追加し、これらとの関係を検討して安全な治療スケジュールの遂行に役立てたい。

P-6-3 腎細胞癌からの口腔内転移に対するサイバーナイフ治療
CyberKnife radiosurgery for oral cavity metastasis of renal cell carcinoma

○水松 真一郎
総合青山病院 サイバーナイフセンター

Shinichiro Mizumatsu
CyberKnife Center, Aoyama General Hospital

【目的】 腎細胞癌からの巨大な口腔内転移に対してサイバーナイフ (CK) による定位放射線治療を行った 1 例を報告する。**【方法】** 60 歳、男性。腎細胞癌にて両側腎摘出を実施。1 年後、左頬部腫脹にて受診。生検にて腎細胞癌の転移と判明。スーテント、トリーセルを使用した腫瘍増大は抑制できなかった。腫瘍は口腔内から頭蓋底にまで拡大し、口腔内出血を伴う状態となった。経口摂取も困難となり、緩和治療目的で CK 治療 (辺縁線量 35Gy, 5 分割) を実施した。腫瘍は全体で 400cc を超える巨大病変であり、口腔内膨隆部 (体積: 60.2cc) のみを対象とした。治療期間中に口腔内出血は減少し、舌の動きも改善した。口腔内腫瘍は縮小したが、左顎皮下転移が増大してきたため、1 ヶ月後、2 回目の CK 治療 (辺縁線量 35Gy, 5 分割) を行った。以後は著明な増大傾向を示さなかったが、7 ヶ月後、左軟口蓋部が急激に増大し、咽頭口部の狭窄による摂食障害、呼吸障害の危険性が高くなり、左眼窩周囲腫瘍による眼球突出も著明になってきたため、3 回目の CK 治療 (辺縁線量 30Gy, 5 分割) を実施した。治療期間中に口腔内病変は退縮し、眼球突出や眼周囲腫瘍は軽減した。**【結論】** 摘出困難な腎細胞癌原発口腔内転移に対する CK 治療は有用な緩和治療のひとつである。

P-6-4 舌癌に対する 3 次元画像誘導高線量率組織内照射時に有用な連結チューブ型多機能装置の開発
Development of tube-linked multifunctional device useful for three-dimensional image-based high-dose-rate interstitial brachytherapy for tongue cancer

○秋山 広徳、清水谷 公成
大阪歯科大学 歯科放射線学講座

Hironori Akiyama, Kimishige Shimizutani
Department of Oral Radiology

【背景】 舌癌に対する 3 次元画像誘導高線量率組織内照射時の留意事項に、アプリケータの平行性確保、舌浮腫による線量不足防止、顎骨線量の軽減がある。これらのための多機能装置の開発を行った。**【患者と方法】** 対象は 2011 年 6 月から 2012 年 10 月までに同治療を行った舌扁平上皮癌患者 8 例。T 分類は、T2: T3=5:3、年齢の中央値は 72 歳 (39-84 歳) であった。装置として、外径 5 mm、内径 2 mm のビニルチューブを 10-15 mm 長に切断、7-10 個を柵状に連結した物を作成した。アプリケータ刺入時に、装置を舌縁に接する様に配置した。刺入の際、装置のチューブをアプリケータの誘導路とすることで、平行性の確保を図った。また、装置により、舌の浮腫によるアプリケータ間からの膨隆を防止し線量不足回避を意図した。さらに装置に顎骨と舌を離す機能を持たせ、顎骨線量軽減の一助とした。刺入後に CT と MRI を撮影した。治療計画装置でアプリケータ、臨床標的体積 (CTV)、下顎骨の輪郭作成を行い、線量分布の最適化を行った。照射は、6 Gy/ fr. を 1 日 2 回、計 54 Gy 施行した。**【結果】** 計画用 CT にて、アプリケータの平行性が確保されていた。舌のアプリケータ間から膨隆は認めず、CTV を処方線量にてカバーする事ができた。下顎骨線量は処方線量以下に軽減されていた。局所再発および晩期有害反応は認めていない。**【結論】** 本装置は、舌癌に対する 3 次元画像誘導高線量率組織内照射時に有用であることが示唆された。

P-6-5 サイバーナイフを用いた進行性舌癌の治療経験
An experience of The Cyber Knife radio therapy for a tongue carcinoma

○北島 正一郎¹、安井 昭夫¹、丸尾 尚伸¹、水松 真一郎²
¹江南厚生病院 歯科口腔外科、²総合青山病院 サイバーナイフセンター

Shoichiro Kitajima¹, Akio Yasui¹, Hisanobu Maruo¹, Shinichiro Mizumatsu²
¹Department of Dentistry and Oral Surgery, Konan Kosei Hospital, ²Aoyama General Hospital CyberKnife Center

【緒言】 高度の閉塞性肺疾患 (COPD) を有する進行性舌癌の患者に対して、サイバーナイフ (自動追尾機能付き定位放射線照射装置) を用いた治療を経験したので報告する。**【症例】** 患者: 74 歳男性。初診: 2014 年 4 月。主訴: 舌の疼痛、摂食嚥下障害、構音障害。既往歴: 慢性閉塞性肺疾患。現症: 右側舌縁に 65 × 40 × 25mm 大、弾性硬の腫瘍が認められた。頸部リンパ節は両側に複数個の硬結を触知した。診断: 舌癌 T4aN2cM0, Stage IVA。処置および経過: 呼吸器内科に対診を行ったところ、III 期 COPD にて全身麻酔における手術および化学療法は不可との回答を得た。患者と家族に対して説明を行ったところ、サイバーナイフによる治療を選択された。治療は、総合青山病院サイバーナイフセンターに依頼した。腫瘍体積 92.838cc に対し、辺縁線量 28Gy、最大線量 56Gy、7 分割で照射を行った。治療 1 か月後には外向性腫瘍はほぼ消失した。初診より 5 か月後には、舌表面にわずかな粘膜炎を残すのみとなった。摂食嚥下回復し、疼痛コントロールは不要であった。2015 年 2 月、肺炎により永眠されるまで、局所制御は良好で患者の QOL は保たれた。**【結論】** 進行性舌癌に対して、手術および化学療法不可の患者におけるサイバーナイフ治療は、QOL の向上に寄与すると考えられた。

P-6-6 舌背に発生し組織内照射を行った類基底扁平上皮癌の 1 例
A case of basaloid squamous cell carcinoma in dorsum of the tongue treated with interstitial radiotherapy

○大鶴 洋¹、高久 勇一郎¹、田村 航¹、吉村 元²
¹国立病院機構東京医療センター 歯科口腔外科、²よしむら歯科・口腔外科

Hiroshi Otsuru¹, Yuichiro Takaku¹, Wataru Tamura¹, Gen Yoshimura²
¹National Hospital Organization Tokyo Medical Center, ²Yoshimura Dentistry and Oral Surgery

類基底扁平上皮癌は、扁平上皮癌の亜型の一つで組織学的に異型性の強い基底細胞様細胞の増殖を特徴とし、予後不良とされており、口腔領域での発生頻度は低い。今回、われわれは左側舌背の正中寄りに発生し、心疾患 (心室中隔欠損症、大動脈弁狭窄症) を合併し、治療方針に苦慮した類基底扁平上皮癌の 1 例を経験したのでその概要を報告する。患者は 72 歳、男性で 2009 年 9 月頃に左側舌背に腫瘍を自覚、12 月に当院を受診した。初診時、左側舌背に有痛性の潰瘍を認め、生検において類基底扁平上皮癌の診断を得た。TNM 分類では、T2N0M0 (Stage 2) であるが腫瘍は左側舌背を主座として正中付近に及んでおり、局所切除のみでは治療が困難と考えられ、さら心室中隔欠損症および大動脈弁狭窄症を合併していた。このため、2010 年 1 月にイリジウム針刺入による組織内照射を行った。原発巣腫瘍は制御されていたが、4 か月後に頸部リンパ節に後発転移が認められた。心疾患合併のため心臓手術の先行も検討したが、頸部リンパ節転移の治療を優先し、頸部郭清術を施行。再発および転移無く経過している。5 年 7 か月経過し、さらに心機能の低下が認められたため当院心臓血管外科において、手術を行い経過良好である。手術適応のある心疾患の合併している際には、どちらを先行するか判断が難しいところであるが、口腔癌の治療を優先し経過は良好であった。

P-6-7

口腔癌組織内照射後 10 年をこえて発症した舌癌 4 例

Tongue cancer developed more than 10 years after brachytherapy for oral squamous cell carcinoma: Four case reports

○土田 絵梨¹、石井 純一¹、八木原 一博¹、桂野 美貴¹、石川 文隆²、柳下 寿郎²、出雲 俊之³

¹埼玉県立がんセンター 口腔外科、²埼玉県立がんセンター 病理診断科、³東京医科歯科大学大学院 口腔病態診断学分野

Eri Tsuchida¹, Junichi Ishii¹, Kazuhiro Yagihara¹, Miki Katsurano¹, Ayataka Ishikawa², Hisao Yagishita², Toshiyuki Izumo³

¹Department of oral surgery, Saitama Cancer Center, Saitama, Japan, ²Department of Pathology, Saitama Cancer Center, ³Department of Diagnostic Oral Pathology, Tokyo Medical and Dental University, Tokyo, Japan

口腔扁平上皮癌の一次治療後、10 年以上経て同一部位や隣接部位に癌が発症する場合がある。これらは、再発あるいは二次癌の鑑別が難しいことが多く、特に放射線治療歴がある場合には放射線誘発癌、晩期再発癌との鑑別に苦慮する。

今回われわれは、組織内照射を行った口腔扁平上皮癌症例のうち、治療後 10 年以上経過して発症した舌癌 4 例を経験したのでその概要を報告する。

症例は男性 3 例、女性 1 例、年齢は 57～67 歳（平均 62 歳）、組織内照射から舌癌発症による治療開始までの期間は 11～18 年（平均 14.3 年）であった。一次治療初発部位は舌 2 例、口底 1 例、軟口蓋 1 例で、いずれも頸部リンパ節転移は認めなかった。二次癌の発症部位は、一次治療時舌癌 2 例は同側舌縁部、口底癌は同側舌下面、軟口蓋癌は同側舌後部であった。組織内照射の種類は、¹³⁷Cs 針 2 例、¹⁹²Ir-HDR 1 例、¹⁹⁸Au grain 1 例であった。二次癌の病理組織型は全例扁平上皮癌であったが、一次治療時とは異なる組織像を認めた症例が 2 例みられた。1 例は肉腫様変化を伴い、他の 1 例は低分化型を呈していた。治療法は 2 例が手術単独、2 例が術前化学療法＋手術を行った。経過は、3 例は現在に至るまで 2 年以上再発転移を認めないが、1 例は術後 3 か月で原病死した。

口腔癌治療後根治症例と判断された場合でも、特に組織内照射後の症例は長期にわたる経過観察の必要性が示唆された。

P-6-9

頭頸部癌における強度変調放射線治療 (IMRT) と従来型放射線治療との口腔内状況の比較検討

A Comparison study of Oral Conditions between Conventional Radiotherapy and Intensity Modulated Radiotherapy in Head and Neck Cancer Patients

○山内 千佳¹、高井 美玲²、堀井 幸一郎²、青木 尚史²、渋谷 恭之²

¹名古屋市立大学病院 歯科口腔外科、²名古屋市立大学大学院医学研究科 生体機能・構造医学専攻感覚器・形成医学講座口腔外科学分野

Chika Yamauchi¹, Mirei Takai², Kouichirou Horii², Naofumi Aoki², Yasuyuki Sibuya²
¹Department of Oral Surgery, Nagoya City University Hospital, Nagoya, Japan, ²Department of Oral Surgery, Nagoya City University Graduate School of Medical Sciences

【目的】口腔粘膜炎など有害事象は頭頸部癌に対する放射線治療や化学放射線治療で高頻度にみられ、その重症化は患者の QOL を著しく低下させて癌治療の継続性を困難にする。今回、頭頸部癌患者を従来型の放射線治療 (RT) と強度変調放射線治療 (IMRT) で比較し口腔内状況や疼痛管理などを検討したので報告する。【方法】2012 年 3 月～2015 年 8 月に当科で口腔衛生管理を施行した頭頸部癌患者 20 名を対象とした。RT 患者 10 名を A 群 (RT 単独 4 名、RT＋化学療法 6 名 / 男女比 = 7 : 3、平均年齢 63.9 歳)、IMRT 患者 10 名 (IMRT 単独 4 名、IMRT＋化学療法 6 名 / 男女比 = 9 : 1、平均年齢 65.6 歳) を B 群とし、病名、病期、併用化学療法の内容、喫煙・飲酒の有無、糖尿病・高血圧などの有無、口腔粘膜炎の診察所見・機能/症状 (CTCAE Ver.3) と発症時期、口腔カンジダ症や麻薬使用の有無とその期間を調べて比較検討した。【結果】A・B 群共に下咽頭癌が半数を、stage4 が 8 割を占めた。口腔粘膜炎は診察所見 Grade2 以上が A 群 5 名、B 群 9 名、機能/症状 Grade3 以上が A 群 1 名、B 群 4 名、口腔粘膜炎の発症時期は A 群で平均照射 9 回目、B 群 18 回目であった。口腔カンジダ症は A 群 6 名、B 群 5 名、麻薬使用は A 群 7 名、B 群 6 名で認めた。【結論】今回の症例において、IMRT では従来型の放射線治療と比較すると照射期間の中期以降に重度口腔粘膜炎を発症し経口摂取が困難になる傾向を認めた。

P-6-8

認知症を伴う超高齢患者上口唇癌に対するサイバーナイフ治療

CyberKnife radiosurgery for upper lip cancer in very elderly patient with dementia

○小崎 英雄¹、水松 真一郎²

¹総合青山病院 歯科口腔外科、²総合青山病院 サイバーナイフセンター

Kozaki Hideo¹, Shinichiro Mizumatsu²

¹General Aoyama Hospital Dentistry and Oral Surgery, Aichi, Japan, ²General Aoyama Hospital Cyber knife center, Aichi, Japan

【緒言】我々は強度の認知症を伴った超高齢患者上口唇癌に対してサイバーナイフ (CK) による緩和的放射線治療を行った 1 例を報告する。

【症例】90 歳、女性。長谷川式認知機能検査などは実施不可なレベルのアルツハイマー型認知症を有していた。左上口唇腫脹を主訴に平成 26 年 6 月当科初診。腫瘍摘出術を実施し、組織は高分化型扁平上皮癌であり、断端陰性であった。半年後、左上口唇から上顎に硬結を伴う角化病変が認められ、生検にて再発と診断された。年齢や認知症などから、広範囲となる摘出術や化学療法、標準的放射線治療を行うことは困難であると判断した。短期間で実施可能であり、口腔機能の温存も期待できる CK 治療を選択した。原発部位には計 3 回 (1 回目辺縁線量 10Gy → 2 ヶ月後、2 回目辺縁線量 18Gy → 2.5 ヶ月後、3 回目辺縁線量 15Gy)、頸部リンパ節転移 3 ヶ所 (辺縁線量 13-15Gy) に CK 治療をすべて単回照射で実施した。実施に際してはプロポフォールなどによる鎮静を行った。最終的には、初診より 1 年 2 ヶ月後、CK 治療からは 6 ヶ月後に肺転移により死亡した。死亡時まで介護施設で生活を行っており、経口摂取は維持され、オピオイドによる鎮痛は必要としなかった。【結語】短期間で終了し、早期治療効果が期待でき、有害事象が少なく、治療後の反応に応じて追加照射も可能な CK 治療は、緩和療法として有用である。

P-7-1

頭頸部悪性黒色腫に対する DAV 併用重粒子線治療

Carbon Ion Radiotherapy combined DAV therapy for Head and Neck Malignant Mucosal Melanoma

○武者 篤^{1,2}、横尾 聡¹

¹群馬大学大学院医学系研究科 顎口腔科学分野、²群馬大学 重粒子線医学センター

Atsushi Musha^{1,2}, Satoshi Yokoo¹

¹Department of Stomatology and Maxillofacial Surgery, Gunma University Graduate School of Medicine, Gunma, Japan, ²Gunma University Heavy Ion Medical Center, Gunma, Japan

【緒言】頭頸部癌治療は QOL に関する器官に増殖・浸潤する腫瘍であるため、手術療法に加え、扁平上皮癌の場合には放射線療法ならびに化学放射線療法が重要な役割を担っている。しかし、頭頸部領域の悪性黒色腫に対しては、通常の X 線による放射線感受性は低く、根治性が低いとされている。したがって治療の第一選択は手術療法とされてきた。一方、放射線医学総合研究所より重粒子線治療単独療法を受けた頭頸部領域の悪性黒色腫の治療成績が報告され、外科療法や放射線療法、化学放射線療法など併用による治療と同等のものとなった。その後、重粒子線治療単独ではなく、治療後の遠隔転移の有無が治療成績に大きく影響することから、DAV 療法 (DTIC + ACNU + VCR) 併用にて重粒子線治療が行われ、治療成績が向上している。群馬大学でも 2012 年 4 月から DAV 療法併用重粒子線治療を開始し、2014 年 12 月までに 15 例の頭頸部悪性黒色腫の治療が終了している。本報告では頭頸部悪性黒色腫の重粒子線治療について、その概要を報告し、口腔粘膜悪性黒色腫症例を供覧する。【症例の概要】症例:66 歳男性。右上顎肉腫悪性黒色腫、T4aN0M0。重粒子線治療は 57.6GyE/16 回にて行い、併用療法として DAV 療法を施行した。治療後 30 か月経過しているが局所効果は良好である。【結語】悪性黒色腫は遠隔転移の制御が課題であるが、重粒子線治療により良好な局所の治療効果を期待できる。

P-7-2 下顎歯肉癌頸部郭清後の後頸部再発に対して超選択的動注化学放射線療法を行った1例
A case report of mandibular gingival cancer : Superselective intra-arterial chemotherapy concurrent with radiotherapy for neck recurrence after neck dissection

○上田 貴史¹、澤田 恵里¹、徳宮 元富¹、外川 健史²、
密田 正喜仁²、白砂 兼光¹、吉岡 秀郎¹
¹大阪労災病院 歯科口腔外科、²大阪大学大学院歯学研究科 口腔癌
病因病態制御学講座 (口腔外科学第一教室)

Ueda Takashi¹, Eri Sawada¹, Mototomi Tokumiyu¹, Takeshi Togawa², Makihito Mitsuda²,
Kanemitsu Shirasuna¹, Hideo Yoshioka¹
¹Department of Dentistry and Oral&Maxillofacial Surgery, Osaka Rosai
Hospital, ²The First Department of oral and Maxillofacial Surgery, Osaka
University, Graduate School of Dentistry

口腔扁平上皮癌において頸部リンパ節転移を制御することは重要な予後因子のひとつである。しかし、頸部郭清後の郭清範囲に再発が生じると解剖学的に外科的切除が困難なことが多く、姑息的治療を余儀なくされることが多い。今回われわれは頸部郭清後の後頸部リンパ節に再発を認め、超選択的動注化学放射線療法を行った1例を経験したのでその概要を報告する。症例は76歳男性で左側下顎歯肉の疼痛を主訴に2014年4月に当科を受診した。肺結核の疑いがあり他院呼吸器内科での精査後、下顎歯肉癌(cT2N1M0)の診断で2014年7月に左側保存的頸部郭清術、下顎骨区域切除術、腹直筋皮弁での再建を行った。病理診断では切除断端は陰性で上内深頸リンパ節に節内病変のリンパ節転移を1個認めた。2015年2月に肺結核増悪の疑いがあり、再度呼吸器内科で精査中に左側の後頸部リンパ節の腫脹を認めた。CTおよび細胞診で単発のリンパ節転移(rTON3M0)と診断した。左上肢の知覚異常と疼痛を認め腕神経叢浸潤も疑われたため外科的切除は困難と考え、鎖骨下動脈経由の超選択的動注化学放射線療法を行った。放射線治療は外照射3Gy/日を15日間、動注化学療法はDay1、Day7、Day14にCDDP50mg/m²を投与した。治療後は頸部リンパ節転移の縮小を認め、左上肢の疼痛、知覚異常も改善した。頸部郭清後の頸部再発に対しての動注化学放射線療法は、発生部位や個数によっては有用な治療の選択肢となると考えられた。

P-7-4 進行性舌癌に対する超選択的動注化学放射線療法1例—PUカテーテルの留置法について—
A case of superselective intra-arterial infusion chemoradiotherapy for advanced tongue cancer - Method of simultaneous catheterization from the superficial temporal artery -

○安井 昭夫、北島 正一朗、丸尾 尚伸
江南厚生病院歯科 口腔外科

Akio Yasui, Shoichiro Kitajima, Hisanobu Maruo
Department of Dentistry and Oral Surgery, Konan Kosei Hospital, Aichi, Japan

【目的】進行性舌癌に対し、浅側頭動脈からPUカテーテルを舌動脈に留置して動注化学放射線療法を行い、原発巣切除を回避した症例を経験した。屈曲や彎曲の強い舌動脈へのPUカテーテル留置手技を含めて、その治療経緯の概要を報告する。【症例】患者：60才代男性、初診：2012年9月、主訴：左舌縁部の腫瘍、現病歴：2012年3月頃より、左舌縁部に腫瘍を自覚するも放置していた。その後、同部の腫瘍が増大するため、近在の歯科医院を受診したところ、精査および治療を勧められて2012年9月、紹介により来科。病理組織学的診断：高分化型扁平上皮癌。左側舌癌(T3N0M0)の臨床診断にて左舌動脈にアンスロンPUカテーテルを留置し、動注化学療法DOC60mg/m²(DOC:15mg/m²/1回/week)、CDDP125mg/m²(CDDP:5mg/m²/day×5回/week)および放射線治療50Gy(1回2Gy×5day/week)施行した。治療終了後の生検にて腫瘍細胞を認めず、原発巣切除の回避により口腔機能が温存され、治療終了3年経過したが腫瘍再発なく予後良好である。【結語】腫瘍栄養動脈の解剖学的把握と屈曲や彎曲の強い舌動脈へのPUカテーテル留置手技は、治療効果に大きく反映するため極めて重要であると思われる。

P-7-3 大量骨融解を示した下顎骨未分化癌の1例
Carcinoma in vanishing mandible

○原田 真知子、篠崎 勝美、緒方 絹子、田上 隆一郎、
武富 孝治、岩本 修、楠川 仁悟
久留米大学医学部 歯科口腔医療センター

Machiko Harada, Katsumi Shinozaki, Kinuko Ogata, Ryuichiro Tanoue, Takaharu
Takekomi, Osamu Iwamoto, Jingo Kuskukawa
Dental and Oral Medical Center, Kurume University School of Medicine, Kurume,
Japan

【緒言】顎口腔領域における進行性の骨融解を示す原因不明の疾患として大量骨融解症(Gorham病)の報告がある。今回われわれは、下顎骨の進行性の骨融解をきたし、数回にわたる病理組織診断にて未分化癌の診断を得た一例を経験したのでその概要を報告する。【症例】61歳女性 主訴：右下顎部の疼痛 現病歴：2014年秋頃から右下顎の鈍痛と開口障害を自覚し、近歯科を受診し7ヶ月を抜歯されたが、その後も疼痛持続したため当センターを紹介により受診した。【現症】顔貌左右対称、右下顎角部および右咬筋部に圧痛を認め、開口時に下顎は右側に10mm偏位した。右おとがい部に知覚鈍麻は認めなかった。口腔内所見では、7ヶ月抜歯窩の治療は良好で腫瘍形成や炎症所見は認めなかった。画像所見では、右下顎体部から下顎枝にかけてびまん性の溶骨を認めた。【処置および経過】下顎骨の生検を二度にわたって施行した。fibro-osseous lesionで明らかな異型細胞や腫瘍性変化は認めず、診断の確定に至らなかった。その間も下顎骨の骨吸収が進行し、右下顎骨は下顎頭までほぼ消失した。三度生検を施行しMIB-1陽性の腫瘍細胞が散在性に認められ未分化癌の診断を得た。放射線照射総量61Gyとデノスマブの投与を行い、骨融解は抑止され骨形成を認めた。【結語】大量骨融解を示し診断に苦慮した下顎骨未分化癌の一例についてその概要を報告する。

P-7-5 口腔癌に対する超選択的動注化学放射線療法による治療経験
Therapeutic experience of a superselective intra-arterial chemoradiotherapy for oral cancer

○武田 幸彦^{1,3}、岡本 祐一^{1,2}、村山 和義¹、永沼 佳納²、上田 潤^{2,4}、
佐藤 英明²、二宮 一智²、田中 彰³、藤内 祝⁴、又賀 泉⁵
¹新潟県立中央病院 歯科口腔外科、²日本歯科大学新潟病院内科口腔外科、
³日本歯科大学新潟生命歯学部 口腔外科学講座、⁴横浜市立大学大学院
医学研究科 顎顔面口腔機能制御学、⁵日本歯科大学生命歯学部 口腔
外科学講座

Yukihiko Takeda^{1,3}, Yuichi Okamoto^{1,2}, Kazuyoshi Muraama¹, Kana Naganuma²,
Jun Ueda^{2,4}, Hideaki Sato², Kazunori Ninomiya², Akira Tanaka³, Iwai Tonai⁴,
Izumi Mataga⁵
¹Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Niigata Prefectural Central Hospital,
Joetsu, Japan, ²Department of Oral and Maxillofacial Surgery, The Nippon Dental
University Niigata Hospital, Niigata, Japan, ³Department of Oral and Maxillofacial
Surgery, The Nippon Dental University School of Life Dentistry at Niigata, Japan,
⁴Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Yokohama City University Graduate
School of Medicine, Yokohama, Japan, ⁵Department of Oral and Maxillofacial
Surgery, The Nippon Dental University School of Life Dentistry, Japan

【緒言】進行口腔癌治療については近年浅側頭動脈などよりの逆行性超選択的動注化学療法と放射線療法との連日同時併用療法の有用性が注目されている。今回われわれは逆行性超選択的動注化学療法により腫瘍組織への高濃度の抗癌剤投与を連日で行い、放射線治療として多分割照射の一つである加速過分割照射もしくはIMRT(強度変調放射線治療)を併用することにより良好な治療効果が得られたので報告する。【症例、方法】症例は2012年1月から2015年6月の間に当院を受診し口腔癌と診断された症例のうちlate T2以上もしくは深部への腫瘍浸潤が認められた21症例である。症例の年齢は42~90歳で平均68.3歳、男性18例で女性は3例、部位別では舌14例、上顎歯肉4例、口蓋、頬粘膜、口底がそれぞれ1例、stageはIIが10例、IIIが4例、IVaが7例であった。超選択的動注化学療法は腫瘍栄養動脈にカテーテルを1~3本留置、抗癌剤にはDOCとCDDPを使用して連日同時に放射線治療を行った。【結果】21例中20例がCR、1例はPR(手術施行)であった。治療後3例について頸部への転移が認められたが、局所再発症例は現在まで認められていない。有害事象としては口内炎等の粘膜障害が全例に認められた。超選択的動注化学放射線療法は進行口腔癌の臓器温存や手術拒否例に対して有効な治療手段となりうるものと考えられた。

P-7-6 動注化学放射線療法により腫瘍が消失した口腔扁平上皮癌の検討
Patient characteristics of complete response by concomitant intra-arterial chemotherapy and radiotherapy for oral squamous cell carcinoma

○金子 剛¹、小林 淳一¹、宮崎 晃亘¹、佐々木 敬則¹、中垣 貴文¹、宮本 昇¹、仲盛 健治²、平塚 博義¹
¹札幌医科大学医学部 口腔外科学講座、²那覇市立病院 歯科口腔外科
Takeshi Kaneko¹, Jun-ichi Kobayashi¹, Akihiro Miyazaki¹, Takanori Sasaki¹, Takafumi Nakagaki¹, Sho Miyamoto¹, Kenji Nakamori², Hiroyoshi Hiratsuka¹
¹Department of Oral Surgery, Sapporo Medical University School of Medicine, ²Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Naha City Hospital

動注化学放射線併用療法による口腔癌制御率の高さは臨床医にとって大きな魅力である。そこで、腫瘍消失に係る臨床要因を明らかにすべく検討を行った。2005年12月から2012年12月までに根治療法として動注化学放射線併用療法を完遂できた口腔癌一次症例は40例であった。40例の性別は男性23例、女性17例、初診時年齢は34～91歳、平均65歳で、観察期間は12～116か月である。40例のT分類別内訳はT1:1例、T2:17例、T3:5例、T4:17例、臨床病期別ではstage II:3例、stage III:9例、stage IV:28例で、40例中3例は浅頭動脈経路の逆行性、37例は大腿動脈経路の順行性カテーテル挿入による動注であった。全症例の治療経過と転帰は局所再発11例、頸部再発3例、遠隔再発1例で局所非制御4例、頸部非制御1例、遠隔非制御2例、他病死2例、全生存率は78.9%であった。40例のうちCRと評価され再発なく経過している手術回避例は10例、手術により腫瘍の消失が確定診断されたpCRは7例であった。CR、pCRの17例をA群とし、他の23例をB群として各臨床所見の比較検討を行った。 χ^2 検定のp値はT分類:0.46、N評価:0.38、臨床病期:0.65、発生部位:0.01であった。A群とB群を比較した以上の検討から、上顎歯肉癌と口底癌は動注照射の治療効果が高いのに対し下顎歯肉癌や頬粘膜癌の治療効果は低く、舌はボーダーラインの結果が得られた。各々の全生存率は71.4%、100.0%、68.6%、57.1%、93.8%であった。

P-7-8 切除不能口腔癌に対するセツキシマブ併用療法の効果と有害事象の検討
Investigation of the effect and adverse events of cetuximab combination therapy in patients with unresectable oral cancer

○内田 大亮、志村 美智子、木内 誠、和久井 崇大、泉 さや香、栗林 伸行、齋藤 正浩、川又 均
獨協医科大学医学部 口腔外科学講座
Daisuke Uchida, Michiko Shimura, Makoto Kinouchi, Takahiro Wakui, Sayaka Izumi, Nobuyuki Kuribayashi, Masahiro Saito, Hitoshi Kawamata
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Dokkyo University School of Medicine, Tochigi, Japan

【緒言】ヒト上皮成長因子受容体に対する分子標的薬であるセツキシマブ(Cmab)は、近年、外科療法が適応でない局所進行・再発頭頸部癌の治療成績向上のために保険適応となったが、本邦での使用実績は十分でない。今回われわれは、Cmab併用療法を施行した切除不能口腔癌6症例について、その効果と有害事象について検討を行った。【対象と方法】対象は、2013年2月から2015年7月の間にCmab併用療法を施行した切除不能口腔癌6症例とした。切除不能の内訳は、局所あるいは頸部再発3例、遠隔転移1例、断端陽性1例、手術拒否1例であった。併用療法の内訳は、放射線療法単独2例、放射線化学療法2例、化学療法単独2例であり、Cmabを3週投与した期間を1コースと定義した。【結果】Cmab併用療法を1コース以上施行できた症例は6症例中4例であり、脱落した2例の内訳は、infusion reaction(IR)1例と遠隔転移死1例であった。これら4例の有害事象の内訳は、ざ瘡様皮疹と爪囲炎を各3例、間質性肺炎(IP)、低Mg血症、骨髄抑制を各1例認めた。一方、1コース以上の治療を完遂でき、標的病変の治療効果判定が可能であった3例では、いずれもNC以上の治療効果が得られた。【結論】6症例中2例において、IRやIPなどのCmab併用療法との関連が疑われた重篤な有害事象を認めたため、適応に関しては慎重に考慮する必要がある。しかしながら、Cmab併用量の奏効率は高く、有用な治療法であることが示唆された。

P-7-7 当科における口腔癌に対する放射線併用超選択的動注化学療法の臨床的検討
The clinical study of superselective arterial infusion chemotherapy combined with irradiation

○佐藤 栄晃、竹川 政範、藤井 ふみ、岡 久美子、柴山 尚大、吉田 将亜、松田 光悦
旭川医科大学医学部 歯科口腔外科学講座
Hideaki Satou, Masanori Takekawa, Fumi Fujii, Kumiko Oka, Naohiro Sibayama, Masatsugu Yoshida, Mitsuyoshi Matsuda
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Asahikawa Medical University, Asahikawa, Japan

【目的】当科では進行した口腔扁平上皮癌に対して、原発部位の機能温存と形態維持を目的として動注化学療法と放射線照射併用療法を行ってきた。今回、本療法の治療効果、有害事象等について検討した。【対象および方法】対象は2007年1月から2015年3月まで、本療法を行った口腔扁平上皮癌症例11例である。年齢は53歳から84歳まで、平均年齢72.6歳で、男女比は男性5例、女性6例であった。T分類はT2が1例で、その他は全てT4であった。N分類はN0が3例、N1が1例、N2bが5例、N2cが2例であった。Stage分類では全例がStage IVであった。治療は、Seldinger法でcisplatin 100mg/m² × 6週間(計600mg/m²)を用いて超選択的動注化学療法を行い、同時に放射線治療を単純分割照射 2.0Gy/日で計66Gy行った。そのうち、3例は治療中に誤嚥性肺炎、脳梗塞を発生したため治療を完遂できなかった。【結果】原発腫瘍の臨床的治療効果は11例中5例がCR(45.5%)、4例がPR(36.4%)、2例がSD(18.1%)であった。転移リンパ節を認めた8例中5例(62.5%)で、転移リンパ節の消失を認めた。有害事象は11例中6例(54.5%)でgrade3の口内炎を認めた。【結論】本療法は、抗腫瘍効果が高く、患者のQOLを保つ有用な治療であると考えられた。

P-7-9 Weekly Docetaxel 静注併用放射線療法を施行した高齢者頭頸部癌 10 症例の検討
10 cases of advanced head and neck cancer in elderly patients treated by intravenous infusion chemotherapy with weekly docetaxel and concurrent radiotherapy

○久保田 耕世、中川 祥、今 敬生、伊藤 良平、小林 恒
弘前大学大学院医学研究科医科学専攻 歯科口腔外科学講座
Kosei Kubota, Hiroshi Nakagawa, Takao Kon, Ryohei Ito, Wataru Kobayashi
Department of Dentistry and Oral Surgery, Hirosaki University Graduate School of Medicine, Hirosaki, Japan

【目的】近年、高齢化に伴い全身疾患、QOLを考慮すると積極的な治療が困難であり治療に苦慮することも多い。今回われわれは、手術困難な高齢者進行頭頸部癌に対しWeekly DOC 静注併用放射線療法を施行した10症例を検討したので、その概要を報告する。【方法】対象は10例(男性6例、女性4例。内訳は舌癌が3例、頬粘膜癌、上顎歯肉癌が各2例、下顎歯肉癌、口底癌、顎下腺癌が各1例)、平均年齢は82.9歳(65-92歳)であった。入院下にTotal66Gyの放射線照射施行し、照射に合わせて週1回のDOC(10mg/m²)静注化学療法を施行した。化学療法は3回施行が1例、5回施行が3例、6回施行が3例、7回施行が1例、8回施行が2例であった。【結果】治療効果判定はCRが3例、PRが4例、SDが2例、PDが1例であった。Grade3以上の有害事象として口腔粘膜炎が6例、放射線性皮膚炎が2例認められた。全例治療の完遂が可能であった。【結論】本療法は有害事象も少なく、治療の完遂も可能であることから、全身状態等から手術が困難な高齢者進行頭頸部癌に対しても有用な治療法のひとつであると考えられた。

P-7-10

上顎洞原発腺様嚢胞癌進行例にセツキシマブ併用選択動注化学放射線療法が著効した1例
 A case of advanced Adenoid cystic carcinoma primary in a maxillary sinus that was treated effectively with cetuximab combination selective arterial injection chemoradiotherapy

○須澤 佳香、西山 今日子、若林 健、竹下 彰範、楠山 友紀子、今井 智章、加藤 逸郎、中澤 光博
 大阪大学大学院歯学研究科 口腔外科学第二教室

Yoshika Suzawa, Kyoko Nishiyama, Ken Wakabayashi, Akinori Takeshita, Yukiko Kusuyama, Tomoaki Imai, Itsuro Kato, Mitsuhiro Nakazawa
 Department of Oral and Maxillofacial Surgery 2, Graduate School of Dentistry Osaka University, Osaka, Japan

腺様嚢胞癌 (Adenoid cystic carcinoma 以下 ACC) は、細胞異型は高くないが周囲組織への浸潤傾向が強いため、再発を繰り返し、遠隔転移しやすい予後不良な唾液腺腫瘍である。また化学療法や放射線療法に対する反応が不良で、治療は手術が中心となる。今回我々は、広範な周囲組織浸潤を伴った上顎洞原発の ACC に対して動注を含む化学放射線療法を行い、著効した1例を経験したのでその概要を報告する。症例は62歳男性、左頬部の違和感を主訴に来院した。左側上顎前歯部から大白歯部頬側歯肉に弾性硬の腫瘍を触知し、小白歯には動揺を認めた。画像上、左側上顎洞を中心に54mm×51mm大、内部に壊死領域を伴う病変を認めた。上方は眼窩内に進展、下方は上顎槽骨頂部まで破壊、内側は鼻腔に進展し下鼻甲介を圧排、外側は咀嚼筋隙、後方は翼突下顎隙に達し、広範囲に浸潤していた。臨床診断は上顎洞癌 T4aN0M0、病理組織診断は ACC (Solid type) であった。手術は眼球を含めた切除となる上に完全切除が困難であると判断し、化学放射線療法を選択した。セツキシマブの全身投与にシスプラチン・ドセタキセルを用いた選択的動注化学療法と放射線治療 (総線量 62Gy) を併用したところ、腫瘍は著明な縮小を示し、採取した検体の病理組織所見より、治療効果判定は著効、Grade 4 との結果を得た。本症例は ACC の他の type よりも早期に再発・転移をきたすことが多いため、今後も慎重な経過観察を要すると考える。

P-7-12

当科における術後化学放射線療法の有害事象に関する臨床的検討
 Evaluation of the adverse event in CCRT after surgery

○河野 俊広、仲宗根 敏幸、又吉 亮、牧志 祥子、後藤 尊広、喜名 振一郎、片岡 恵一、丸山 哲昇、西原 一秀、新崎 章
 琉球大学 顎顔面口腔機能再建学講座

Toshihiro Kawano, Toshiyuki Nakasone, Akira Matayoshi, Shouko Makishi, Takahiro Gotou, Shinichiro Kina, Keiichi Kataoka, Tesshou Maruyama, Kazuhide Nishihara, Akira Arasaki
 Department Oral and Maxillofacial functional rehabilitation graduate school of medicine, University of the Ryukyus, Okinawa, Japan

【目的】NCCN ガイドラインに準じた標準治療は頭頸部癌に対して外科切除、その後の化学放射線同時併用療法 (以下、CCRT) を勧めており、当科では2014年4月より採用している。しかし、従前の補助療法のレジメンと比較するとはるかに高用量の薬剤を投与するために治療中、後の有害事象発生および完遂率に不安が残る。そこで当科においてその発生頻度と程度について調査し、その対応策を検討した。【対象と方法】2014年4月から2015年7月までの期間に当科で外科切除 (原発巣切除、頸部郭清術) をおこなった62名のうち、術後再発およびNCCNガイドラインに準じて術後再発高リスク群例に対して標準治療としてのCCRTを施行または試みた (シスプラチン 100mg/m² を3週ごとに3クール、同時に放射線 66Gy 照射) 30例を対象とした (カルボプラチン IVR、セツキシマブ静注も含む)。病期分類、合併基礎疾患、腎機能数値、好中球減少、治療成績、そして治療中治療後の有害事象についてCTCAEによるgrade評価をおこなった。【結果】grade2以上の白血球減少と皮膚炎をほぼ全例に認め、予定どおりの完遂は18名であった。またセツキシマブ投与患者12名への重篤なインフュージョンリアクションは認められなかった。【まとめ】実際にはレジメンどおりの投与量完遂には困難な場合があり、薬剤量の減量や変更が適当なケースが多いことが示唆された。

P-7-11

進行舌癌に対して超選択的動注化学放射線療法を施行した症例についての検討—カテーテルを3本留置した症例について—
 Clinical study of advanced tongue cancer treated with superselective intra-arterial infusion chemotherapy combined with radiation therapy -Method of the case that detained three catheters-

○武田 彦彦^{1,3}、岡本 祐一^{1,2}、村山 和義¹、永沼 佳納²、上田 潤^{2,4}、佐藤 英明²、二宮 一智²、田中 彰³、藤内 祝⁴、又賀 泉⁵
¹新潟県立中央病院 歯科口腔外科、²日本歯科大学新潟病院 口腔外科、³日本歯科大学新潟生命歯学部 口腔外科学講座、⁴横浜市立大学大学院医学研究科 顎顔面口腔機能制御学、⁵日本歯科大学生命歯学部 口腔外科学講座

Yukihiko Takeda^{1,3}, Yuichi Okamoto^{1,2}, Kazuyoshi Muraama¹, Kana Naganuma², Jun Ueda^{2,4}, Hideaki Sato², Kazunori Ninomiya², Akira Tanaka³, Iwai Tonai¹, Izumi Mataga⁵
¹Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Niigata Prefectural Central Hospital, Joetsu, Japan, ²Department of Oral and Maxillofacial Surgery, The Nippon Dental University Niigata Hospital, Niigata, Japan, ³Department of Oral and Maxillofacial Surgery, The Nippon Dental University School of Life Dentistry at Niigata, Japan, ⁴Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Yokohama City University Graduate School of Medicine, Yokohama, Japan, ⁵Department of Oral and Maxillofacial Surgery, The Nippon Dental University School of Life Dentistry, Japan

【緒言】進行した口腔癌に対しての浅側頭動脈よりの逆行性超選択的動注化学療法と放射線療法との連日同時併用治療は治療効果が高く有効な治療方法として注目されている。進行した口腔癌では複数の栄養血管に支配されていることもあり、この場合複数のカテーテルの留置が必要となる。今回正中を超える進行舌癌で3本のカテーテルを留置し治療を行った症例について検討を行った。【症例、方法】対象症例は4症例でいずれも舌扁平上皮癌 T4 症例であり、1例にはリンパ節転移が認められた。治療方針として超選択的動注化学療法による化学放射線療法を選択し、カテーテルは原発側の舌動脈を中心に同側の顔面動脈および反対側の舌動脈の3か所に留置した。カテーテルは1例については両側浅側頭動脈と後頭動脈からアプローチしたが、他の3例については両側浅側頭動脈からのアプローチとして原発側の浅側頭動脈に2本のカテーテルを留置した。治療にはDOCとCDDPを用いて放射線治療 (加速多分割照射) を併用した。【結果】今回は1側に2本のカテーテル留置を行ったので、その方法について検討した。1側の動脈に2本のカテーテルを留置する方法では刺入部位が2か所となることから、手術時間が短くなり、手術侵襲が軽減されるとともに刺入部位の管理が比較的容易となる。この方法は血管の形態、血管径および状態により適応が困難となる場合もあるが適応があれば有効な方法であると考えられた。

P-8-1

口腔癌細胞株における cetuximab を介した抗体依存性細胞障害 (ADCC) 活性と細胞表面 EGFR 発現との関連
 Relationship between the expression level of EGFR in oral cancer cell lines and cetuximab-mediated ADCC activity

○中村 泰士^{1,2}、玉置 盛浩^{1,2}、吉岡 元^{1,2}、中山 洋平¹、柳生 貴裕¹、山川 延宏¹、桐田 忠昭¹
¹奈良県立医科大学 口腔外科、²社会医療法人高清会高井病院 口腔外科

Hiroshi Nakamura^{1,2}, Shigehiro Tamaki^{1,2}, Hazime Yoshioka^{1,2}, Youhei Nakayama¹, Takahiro Yagyu¹, Nobuhiro Yamakawa¹, Tadaaki Kirita¹
¹Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Nara Medical University, Nara, Japan, ²Department of Oral Surgery, Takai Hospital, Tenri, Japan

【緒言】上皮成長因子受容体 (EGFR) は口腔癌で過剰発現していることが報告されている。cetuximab は、抗体依存性細胞障害 (ADCC) 活性を有することが特徴であるが、その抗腫瘍効果において免疫学的作用機序からの検討は十分になされていない。【目的】口腔癌細胞株の EGFR 発現量と cetuximab を介した ADCC 活性との関連について明らかにすることを目的とした。【方法】6種類の口腔癌細胞株 (Ca9-22, SAS, SKN-3, HSC-4, OSC-19, Ho-1-u-1) を対象とした。EGFR 発現量を QIFKIT (Dako 社) を使用して定量的フローサイトメトリーにて測定した。ADCC 活性は、4時間 Calcein-release 法で評価した。エフェクター細胞には、末梢血単核球 (PBMC) から組替えタンパク質であるレトロネクチン、IL-2、抗 CD3 抗体を用いて3週間培養した活性化NK細胞を使用した。エフェクター細胞: ターゲット細胞 (E:T) 比は 1.5:1、3:1、6:1 に、暴露する cetuximab の濃度は 10 μg/ml に設定し、ADCC 活性と EGFR 発現量との関係を統計学的に検討した。【結果】すべての口腔癌細胞株において EGFR の発現を認めた。cetuximab 単独では直接的細胞増殖抑制効果はほとんど認められなかったが、6種すべての口腔癌細胞株で E:T 比=6 のときに ADCC 活性は最大値を示し、EGFR の発現量と ADCC 活性は有意に強い相関を認めた (R=0.86、P=0.02)。【結語】cetuximab による ADCC 活性は、細胞表面の EGFR 発現量と相関する可能性が示唆された。

P-8-2

ヒト口腔扁平上皮癌細胞に対する PI3K/mTOR 阻害剤 BEZ235 の増殖抑制効果
The growth inhibitory effect of a dual PI3K/mTOR inhibitor BEZ235 in human oral squamous cell carcinoma cells

○徳善 紀彦、中城 公一、岩本 和樹、秋山 仁志、浜川 裕之
愛媛大学大学院医学系研究科 口腔顎顔面外科学講座

Norihiko Tokuzen, Koh-ichi Nakashiro, Kazuki Iwamoto, Hitoshi Akiyama, Hiroyuki Hamakawa
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Ehime University Graduate School of Medicine

PI3K/Akt/mTOR 経路は癌細胞の増殖および生存に重要な機能を担っている。口腔扁平上皮癌においても、PIK3CA の活性化型変異や Akt1 の過剰発現など同経路の活性化が認められている。今回、われわれは PI3K/mTOR 阻害剤である BEZ235 (Dactolisib) のヒト口腔扁平上皮癌細胞に対する増殖抑制効果について検討を行った。初めに、次世代シーケンサーを用いて口腔扁平上皮癌細胞株 (GFP-SAS, HSC2, HSC3, Ca9-22) および当科で樹立した口腔扁平上皮癌細胞株 (KT-T, KT-N, KT-M) における腫瘍遺伝子変異解析を行った。その結果、HSC2 を除く 6 株の口腔扁平上皮癌細胞に TP53 の変異を認めた。また、HSC2, KT-T, KT-N, KT-M 細胞には PIK3CA に変異を認め、さらに KT-N, KT-M 細胞には HRAS の変異を認めた。それぞれの細胞を BEZ235 (0-1000 nM) で 72 時間処理し、WST-8 assay にて細胞数を評価した。その結果、すべての細胞株において BEZ235 の濃度依存的に著明な細胞増殖抑制効果を確認した。しかし、PIK3CA 変異の有無と BEZ235 の効果に明らかな関連は認められなかった。以上より、BEZ235 などによる選択的な PI3K/mTOR 経路の阻害が口腔扁平上皮癌治療に有用となりうることを示唆された。

P-8-4

セツキシマブ耐性口腔扁平上皮癌培養細胞株の作成と耐性機構の解析
Establishment and analysis of the resistance mechanism of the Cetuximab-resistant oral squamous cell carcinoma cell line

○荒木 華子、野口 一馬、高岡 一樹、岸本 裕充
兵庫医科大学 歯科口腔外科学講座

Hanako Araki, Kazuma Noguchi, Kazuki Takaoka, Hiromitsu Kishimoto
Hyogo College of Medicine, Oral and Maxillofacial Surgery

【目的】 抗 EGFR 抗体のセツキシマブ (Cmab) は頭頸部癌に対する分子標的薬として使用されているが、薬剤耐性が問題となっている。われわれは、口腔扁平上皮癌細胞株に対し Cmab 耐性細胞の耐性獲得メカニズムを解析している。**【方法】** 口腔扁平上皮癌細胞株 SCCKN に対し、Cmab を dose escalation method を用いて耐性細胞を作成した。同時に親株を TruSeq Amplicon-Cancer Panel を用いた次世代シーケンサー (NGS) で、遺伝子変異を解析した。さらに Cmab 耐性細胞における EGFR-Ras-Raf-MEK-ERK 経路や、PI3K-AKT-mTOR 経路のタンパク発現を Western Blot 法を用いて検討した。**【結果】** SCCKN は Cmab に対して早期に耐性を獲得し、400 μ g/ml の Cmab 存在下で継続的に培養が可能となった。NGS を用いたがん遺伝子の解析では、SCCKN は PIK3CA に変異があることが確認された。**【考察】** Cmab 耐性はリガンドの過剰発現や EGFR/Ras の変異などが報告されているが、さらに下流の PIK3CA に変異があれば容易に耐性が成立することが予想される。分子標的薬はシグナル全体を抑制する必要があり、従来の癌化学療法における獲得耐性がポイントであったのに対し intrinsic resistance も問題となり得ることが示された。

P-8-3

CD-DST 法を用いたセツキシマブ上乗せ効果に関する基礎的検討
Basic study of cetuximab plus effect using a CD-DST method

○佐久間 要¹、田村 隆希²、田中 彰^{2,3}

¹日本歯科大学新潟病院 口腔外科、²日本歯科大学新潟生命歯学部 口腔外科学講座、³日本歯科大学新潟生命歯学部 先端研究センター 再生医療学

Kaname Sakuma¹, Ryuki Tamura², Akira Tanaka^{2,3}
¹Oral & Maxillofacial Surgery Niigata Hospital, The Nippon Dental University, ²Department of Oral & Maxillofacial Surgery, The Nippon Dental University, School of Dentistry at Niigata, ³Division of Cell Regeneration and Transplantation, Advanced Research Center, School of Life Dentistry at Niigata, The Nippon Dental University

【緒言】 CD-DST 法は、コラーゲン・ゲル 3 次元培養に画像比色定量法を組み合わせた抗腫瘍剤感受性試験であり、生体内を再現し、生理的条件下で長期培養が可能である。近年、再発・転移性頭頸部癌のセカンド・ライン治療でセツキシマブが白金製剤等の抗腫瘍剤と併用して用いられている。しかし、上乗せ効果のメカニズムに関しては解明されていない。今回、CD-DST 法におけるセツキシマブ至適濃度の設定ならびに上乗せ効果の基礎的検討を行った。**【材料および方法】** 材料はヒト口腔由来扁平上皮癌株 13 株を用いた。RT-PCR 法で EGFR 発現および関連遺伝子の確認を行った。セツキシマブの至適濃度設定は、段階的に濃度を振り分け CD-DST 法を施行し、臨床奏効率と累積 in vitro 有効率曲線から算出した。また、5 株でヌードマウス法を施行し、CD-DST 法における臨床効果予測の検証を行った。さらに、セツキシマブ接触前後の CDDP 耐性遺伝子および、5-FU の代謝・標的関連遺伝子の変化を CD-DST 法の 3 次元培養を応用して継続的に確認を行った。**【結果】** セツキシマブ至適濃度は 250 μ g/ml と算出し、ヌードマウス法と CD-DST 法の効果判定は一致しており評価可能と考えられた。また、セツキシマブ接触前後の遺伝子変化に関しては 5-FU の代謝・標的関連遺伝子で変化を認めた。**【考察】** CD-DST 法はセツキシマブの効果予測に有用であることが示唆された。また代謝・標的関連遺伝子変化による 5-FU 効果増強の可能性が示唆された。

P-8-5

再発・転移口腔癌におけるセツキシマブ + パクリタキセル併用療法の治療戦略
Treatment strategy of the combination of cetuximab and weekly paclitaxel in patients with recurrent and/or metastatic squamous cell carcinoma of oral cavity

○堀江 彰久、大橋 瑞己、増田 千恵子
関東労災病院 歯科口腔外科

Akihisa Horie, Mizuki Oohashi, Chieko Masuda
Dentistry and Oral Surgery Kanto Rosai Hospital

【はじめに】 当科では再発・転移口腔癌の治療の選択肢として、プラチナ製剤不応・不適なケースや外来通院加療を希望するケースさらに緩和治療としてセツキシマブ + パクリタキセルの併用療法を行っている。今回われわれは、セツキシマブ + パクリタキセル併用療法における抗腫瘍効果、有害事象について検討を行った。さらに緩和治療目的として使用した症例についても検討したので報告する。**【対象と方法】** 対象は 2014 年 10 月から 2015 年 10 月までにセツキシマブ + パクリタキセル併用化学療法を施行した 11 例。男性 8 例、女性 3 例。年齢は 35 歳から 89 歳。原発巣は、舌癌 5 例、頬粘膜癌 2 例、口底癌 1 例、上顎歯肉癌 2 例、口唇癌 1 例で口唇癌は紡錘細胞癌で他は扁平上皮癌であった。両薬剤とも週 1 回投与とし、セツキシマブは初回投与量 400 mg/m²、2 回目以降 250 mg/m²、パクリタキセルは 80 mg/m² を点滴静注投与した。**【結果】** 抗腫瘍効果は CR4 例、PR4 例、PD3 例であった。有害事象としては重度の Infusion reaction なし、Grade1、2 のざ瘡様皮疹 10 例、Grade2 の爪囲炎 2 例、セツキシマブ投与に起因すると思われた重篤な薬剤性間質肺炎が 1 例に認められた。重篤な血液毒性は全例みられなかった。**【考察】** セツキシマブ + パクリタキセル併用療法は再発転移症例に対し有用な治療で緩和治療としても期待できる治療と考えられた。

P-8-6

機能温存を考慮した局所進行口腔癌に対する分子標的薬併用 IMRT 療法の有効性
The effectiveness of the molecular target medicine combination IMRT therapy for local advanced oral cancer in consideration of the function preservation

○佐野 次夫¹、木島 毅¹、秋本 琢磨¹、久保寺 翔¹、萩野 貴磨¹、須藤 弘喜¹、鈴木 総史²、佐藤 泰則³、高久 暉¹
¹東京西徳洲会病院 口腔外科、²昭和大学 口腔リハビリテーション科、³医療法人徳真会

Tsuguo Sano¹, Takeshi Kijima¹, Takuma Akimoto¹, Sho Kubodera¹, Takama Hagino¹, Koki Sudo¹, Soshi Suzuki², Yasunori Sato³, Susumu Takaku¹
¹Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Tokyo Nishi Tokushukai Hospital, ²Department of Oral Rehabilitation, School of Dentistry, Showa University, ³Medical Corporation, Tokushinkai

【目的】口腔癌の治療に用いられる強度変調放射線治療（以下 IMRT）は、放射線治療に起因する有害事象の制御がはかられ放射線予定線量が完遂でき、治療成績向上が期待できるとされている。今回われわれは、局所進行口腔扁平上皮癌症例に対して初期治療として Cetuximab + 放射線療法 (Bio-radiation) BRT をおこない形態ならびに機能温存できた症例を経験したので、その概要に若干の考察を加えて報告する。【方法】2015 年 1 月から 2015 年 9 月の間で加療した局所進行口腔扁平上皮癌で初期治療 BRT をおこなった 10 例を対象。症例は、女性 4 例、男性 6 例、治療開始時年齢 61 歳から 92 歳。加療前 stage 分類では、stage3 4 例、stage4 6 例。全例とも病理組織学的には扁平上皮癌。結果】Cetuximab を weekly で使用した BRT を予定線量まで完遂できた。有害事象は CTCAEv4.0 で評価した。観察期間は 3 ヶ月から 9 ヶ月（中央値 6 ヶ月）。1 次効果は CR7 例、PR3 例であった。最終確認時、無病生存が 8 例、原病死 1 例、治療関連死 1 例。Grade2 の口腔粘膜炎が 6 例、grade2 のざ瘡様皮疹が 3 例発現。【結語】口腔癌の治療では咀嚼、嚥下、構音機能温存、さらに整容面から生体において最も臓器形態温存がのぞまれる。そのため近年では局所進行口腔扁平上皮癌に対して化学療法と放射線療法を同時におこなう化学放射線療法 (CCRT) を施行し、完全寛解がえられた場合は手術を回避し、効果得られなかった場合のみ救済手術をおこなう治療体系がとられるようになってきている。そのなかで上乘せ効果として使用される化学療法としてもちいられるものは 1st line としてプラチナ製剤 (CDDP) が広く認知されている。しかしながら高齢、腎機能障害、肝機能障害などの合併症を有した症例に対しては使用することができない。今回 CDDP のかわりに Cetuximab を使用し BRT をおこなったところ 1 次評価ではあるが、きわめて有効な結果をえた。これは IMRT による有害事象が低減されることによる放射線照射完遂率が向上し、そのため確実な局所腫瘍制御が図られるとともに、Cetuximab の放射線に乗せ効果が認められたからだと考えることができた。Infusion reaction への確実な初期対応、口腔内金属除去による口腔粘膜炎の軽減対策、さらにざ瘡様皮疹に皮膚科介入による積極的対応などの支持療法を確実にこなすことができれば、BRT は局所進行口腔扁平上皮癌の標準治療の一つとして提示可能ではないかと考えることができた。

P-8-8

Cetuximab 導入による化学療法適用症例の拡大—高齢者、唾液腺癌、リンパ節転移—
Chemotherapy including cetuximab for elder patients, salivary cancer and regional lymph node metastases

○竹下 彰範、中澤 光博、楠山 友紀子、若林 健、今井 智章、加藤 逸郎、須澤 佳香、西山 今日子
大阪大学大学院歯学研究所 口腔外科学第 2 教室

Mitsuhiro Nakazawa, Akinori Takeshita, Yukiko Kusuyama, Ken Wakabayashi, Tomoaki Imai, Itsuro Kato, Yoshika Suzawa, Kyoko Nishiyama
Osaka University Graduate School of Dentistry Oral & Maxillofacial Surgery 2

分子標的薬は、従来の抗がん剤と比べて、作用機序や有害事象のパターンがまったく異なることから、これを適切に利用することにより、適用症例の拡大や奏効率の改善など、高い有益性が期待される。特に従来の抗がん剤では対応が困難であった症例に化学療法の効果が期待できるようになったことは重要である。当科では cetuximab を単独または他剤との併用にて、これまでは化学療法による対応が十分にできなかった高齢者（主に姑息療法）、唾液腺癌およびリンパ節転移のある症例に用いている。高齢者の姑息的治療には S-1 を用いているが、有効でない症例に cetuximab を使用し、良好な効果を得ている。また、唾液腺癌は一般的に抗がん剤に反応しにくい、cetuximab を加えることにより、反応性が高まる症例がある。最も頻用しているのは頸部リンパ節転移（再発）症例である。paclitaxel との併用により、これまでのほとんどの症例に著明な縮小効果が得られている。しかし、有害事象を含めた投与継続性の問題や投与終了をどのように判断するかなど、問題も多い。本発表では、症例を呈示するとともに、そのような問題についても言及する。現在、分子標的薬は活発に開発が進んでおり、口腔領域でも新薬の登場が期待できる。従来の抗がん剤との併用により、さらに口腔癌治療に占める役割は大きくなると思われる。

P-8-7

高齢者口腔癌治療における分子標的薬の位置づけ
Positioning of molecular target drug cetuximab in the treatment of oral cancer in the elderly

○吉川 博政、木村 祥一郎、志渡澤 和奈、大関 悟
国立病院機構九州医療センター 歯科口腔外科 / 口腔腫瘍・口腔ケアセンター

Hiromasa Yoshikawa, Schoichiro Kimura, Yawana Shitozawa, Satoru Ozeki
National Hospital Organization, Kyushu Medical Center, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Oral Oncology and Oral Care Center

九州医療センターでは口腔がん患者は歯科口腔外科、放射線科、腫瘍内科に看護師など他職種を加えた口腔腫瘍カンファレンスにて治療方針を決定している。当科では 2103 年から分子標的薬（セツキシマブ）の使用を開始したが、化学療法併用の場合は腫瘍内科にて、放射線併用の場合は、分子標的薬は腫瘍内科の管理下に外来化学療法センターで行い、放射線治療は口腔外科に入院し治療を行っている。適応は、手術困難再発症例、および一次治療症例としては 75 歳以上の後期高齢者、特に 80 歳以上で各種合併症を有し、手術のリスクが高く、抗癌剤治療の使用が困難な進行症例としている。80 歳以上の高齢者は全身予備能の低下、併存疾患、余命、患者の社会的背景などから治療方針の決定に苦慮することが多い。今回我々はこれらの口腔癌患者治療におけるセツキシマブの適応、治療効果、有害事象などを検討した。対象は 2013 年 1 月から 2015 年 8 月までに当科でセツキシマブを用いて治療を行った口腔癌患者 14 症例のうち一次治療症例としてセツキシマブ併用放射線治療を行った 80 歳以上の 7 例である。平均年齢は 87.4 歳であった。原発巣の部位は下顎歯肉 3 例、上顎歯肉 3 例、口腔多発（舌、口底）1 例である。Stage2,3,4 はそれぞれ 1 例、3 例、3 例である。治療が完遂できた症例は 3 例であった。これまでのところ無病生存 3 例、担癌生存 2 例、原発巣死 1 例、他病死 1 例である。

P-8-9

Cetuximab 併用放射線療法にて間質性肺炎を併発した 2 症例
Two cases of interstitial pneumonia during treatment of radiotherapy plus cetuximab

○大竹 史浩、谷尾 和彦、永川 賢治
鳥取赤十字病院 歯科口腔外科
Fumihiro Otake, Kazuhiko Tanio, Kenzi Egawa
Department of Dentistry and Oral Surgery, Tottori Red Cross Hospital

【緒言】間質性肺炎は Cetuximab (Cmab) の重篤な有害事象のひとつである。当科で Cmab 併用放射線療法 (BRT) にて間質性肺炎を併発した 2 例を経験したので報告する。【症例 1】69 歳男性、既往歴は胃・食道癌。喫煙歴あり。下顎歯肉癌 cT4aN2cM0。腫瘍切除術、両側頸部郭清術施行。術後 4 か月目に原発巣と両側頸部に腫瘍再発を認め BRT を開始。予定照射線量 66Gy を完遂し、画像上腫瘍は消失した。Cmab 9 回投与後に発熱と急性呼吸不全が出現し、胸部 CT で両肺野にすりガラス陰影を認めた。呼吸器内科で間質性肺炎の診断下にステロイドパルス療法を行うも改善は認めず、閉塞性腸炎を重複併し敗血症と呼吸不全で永眠した。【症例 2】83 歳女性、既往歴は乳癌。喫煙歴なし。舌癌 cT4aN1M0。TPF による導入化学療法を施行。治療効果判定 PR。根治療法として BRT を開始。Cmab 6 回投与後 (RT50Gy 終了時) に発熱し、胸部 CT にてすりガラス陰影と、間質性肺炎マーカーの上昇を認め BRT を中断した。間質性肺炎の診断下にステロイドパルス療法を行い軽快した。BRT 中断より 3 週間後に放射線療法を再開したが、肺転移による癌性胸膜炎を併発し悪液質のため原腫瘍死した。【考察】BRT の間質性肺炎の頻度は Bonner 試験では 0.5% とされている。その危険因子として喫煙歴、年齢、既存の肺疾患や抗癌剤による多剤併用療法などがあげられる。頭頸部扁平上皮癌患者では危険因子に該当する症例が多く Cmab の慎重な適応が求められる。

P-8-10

Cetuximab に耐性を示す口腔扁平上皮癌細胞の EGFR 非感受性と幹細胞様の性質について
Cetuximab-resistant oral squamous cell carcinoma cells exhibit EGFR insensitivity and stem cell-like potency

○安井 大樹^{1,3}、大西 祐一²、渡辺 昌広²、覚道 健治²
¹大阪歯科大学大学院歯学研究科 口腔外科学第二専攻、²大阪歯科大学 口腔外科学第二講座、³大阪大学微生物病研究所 細胞機能分野

Hiroki Yasui^{1,3}, Yuichi Ohnishi², Masahiro Watanabe², Kenji Kakudo²
¹Graduate School of Dentistry Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Osaka Dental University, Osaka, Japan, ²Second Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Osaka Dental University, ³Department of Cell Biology, Research Institute for Microbial Diseases, Osaka University

【目的】cetuximab に耐性を示す口腔扁平上皮癌 (OSCC) の存在が知られているが詳細は不明である。今回我々は、cetuximab 耐性の OSCC の特性を検討した。【材料および方法】ヒト OSCC 細胞株 HSC3, HSC4, SAS を用いて、MTT assay にて阻害剤の細胞増殖に対する影響を比較した。Western blotting と免疫蛍光染色にて EGFR の発現とその局在を調べた。sphere 形成にて幹細胞様の性質を、floating aggregation 培養にて、anchorage-independent growth を調べた。【結果】cetuximab により HSC3 と HSC4 の増殖は抑制されたが、SAS は影響を受けなかった。AG1478 は HSC3, HSC4 の増殖を強く抑制したが、SAS に関しては中程度だった。いずれの細胞株も細胞表面に EGFR を発現し、リン酸化されていた。SAS は無血清 monolayer 培養で増殖し、floating 培養で sphere を形成した。HSC3, HSC4 は無血清 monolayer 培養で増殖できず、sphere 形成もしなかった。SAS の sphere は増殖に血清が必要で、AG1478 と cetuximab にて増殖が抑制された。【結論】cetuximab 耐性の SAS は、EGFR 非依存的な増殖に関与するだけでなく、幹細胞様の性質を示した。しかし、SAS の増殖は aggregation 培養で EGFR 依存的であり、aggregate した SAS は cetuximab 感受性を示した。これは、cetuximab 感受性が cell-type 依存的だけではなく増殖の微小環境にも影響していることを示唆している。

P-8-12

セツキシマブ・パクリタキセル併用化学療法を施行した口腔癌術後再発の 3 例
Combination of Cetuximab and weekly paclitaxel chemotherapy recurrent or metastatic squamous cell carcinoma of oral cavity

○竹下 裕子、緒方 絹子、原田 真知子、武富 孝治、岩本 修、楠川 仁悟
久留米大学医学部 歯科口腔医療センター

Yuko Takeshita, Kinuko Ogata, Machiko Harada, takaharu Taketomi, Osamu Iwamoto, Jingo Kusukawa
Dental and Oral Medical Center, Kurume University school of Medicine

口腔癌治療後の切除不能や手術拒否例あるいは、全身疾患を有する者、高齢者であった場合は TPF などの化学療法が困難な場合が少なくない。今回、われわれは前述の症例に対し、セツキシマブ・パクリタキセル併用化学療法を施行した症例を経験したので報告する。症例 1 67 歳・女性。2014 年 6 月に左下顎肉腫 SCC(T3N2bM0) にて右下顎骨辺縁切除術、右全頸部郭清術施行。同年 7 月に左顎下部に転移し、左全頸部郭清術、術後放射線治療施行した。翌年 1 月に左副神経領域、左腋窩リンパ節転移あり S-1 併用放射線治療施行するも著効せず、セツキシマブ・パクリタキセル併用化学療法を行った。5 回目投与翌日に、吐血し内視鏡検査にて十二指腸潰瘍を認め、化学療法はいったん中止とした。症例 2 58 歳・男性。2014 年 4 月に左舌 SCC(T3N2bM0) にて左舌部分切除術・左全頸部郭清術、術後放射線照射施行。翌年 8 月左舌切除部後方に再発を認めた。慢性腎臓病 (Grade 5) の既往もあり、セツキシマブ・パクリタキセル併用化学療法を開始した。Grade 1 の爪囲炎は認めるが、その他重篤な有害事象はなく 1 ケール終了した。症例 3 58 歳・男性。2014 年 9 月より左下顎肉腫 SCC(T4aN2cM0) にて TPF2 ケール施行。その後、放射線化学療法を施行したが、腎機能低下を認めた。退院後は、S-1 内服による外来化学療法を継続していたが、翌年 1 月に肺転移を認めため、セツキシマブ・パクリタキセル併用化学療法を開始した。

P-8-11

当分野における分子標的薬治療例の検討
Treatment with molecularly-targeted drug at our department

○島本 裕彰、及川 悠、松川 祥、平井 秀明、望月 裕美、富岡 寛文、生田 稔、原田 浩之
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 顎口腔外科学分野

Hiroaki Shimamoto, Yu Oikawa, Syo Matsukawa, Hideaki Hirai, Yumi Mochiduki, Hirofumi Tomioka, Minoru Ikuta, Hiroyuki Harada
Oral and Maxillofacial Surgery, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo Medical and Dental University

当分野では局所再発手術不能例および遠隔転移例に対し、セツキシマブ投与を行っている。今回、当分野でセツキシマブ投与を行った症例について臨床的に検討した。セツキシマブを投与した症例は 9 例で、男性：4 例、女性：5 例、セツキシマブ初回投与時の平均年齢は 63.3 歳であった。原疾患は、舌癌：5 例、下顎肉腫：1 例、頬粘膜癌：1 例、口蓋癌：1 例、下顎肉腫：1 例で、病理組織学的診断は、扁平上皮癌：7 例、基底細胞腺癌：1 例、低悪性型筋線維芽細胞肉腫：1 例であった。併用した治療法は放射線療法：5 例、化学療法：3 例で、セツキシマブ単剤投与は 1 例であった。放射線療法併用例では、放射線療法終了後もセツキシマブを単剤で投与した。併用した抗癌剤はシスプラチン：2 例、パクリタキセル：1 例であった。Grade 1 の infusion reaction を 1 例に認めた。セツキシマブの投与を終了した理由は、病勢の進行：6 例、間質性肺炎：1 例、皮膚障害：1 例で、投与終了時の治療効果は PD：6 例、PR：1 例、CR：1 例であった。皮膚障害にて投与を終了した症例では、投与終了後、病勢が進行し、原病死亡した。予後は無病生存：1 例、担癌生存：1 例、原病死：7 例であった。1 年生存率は 29.6%、2 年生存率は 0% で、予後不良症例でのセツキシマブ投与後の平均生存期間は 187.4 日であった。セツキシマブ投与終了の時期および投与終了後の治療についての検討が必要と考えられた。

P-8-13

ニボルマブが有効であった口蓋悪性黒色腫頭部再発の一例
A case of recurrent palate malignant melanoma treated with Nivolumab

○山本 憲幸¹、西川 雅也¹、市村 典久¹、山口 聡¹、若山 博隆¹、石川 純¹、古江 浩樹²、日比 英晴¹
¹名古屋大学大学院医学系研究科 頭頸部・感覚器外科学講座頭頸部外科学、²小牧市民病院 歯科口腔外科

Noriyuki Yamamoto¹, Masaya Nishikawa¹, Norihisa Ichimura¹, Satoshi Yamaguchi¹, Hirofumi Wakayama¹, Jun Ishikawa¹, Hiroki Furue², Hideharu Hibi¹
¹Department of Oral & Maxillofacial Surgery, Nagoya University Graduate School of Medicine, ²Department of Dental, Oral & Maxillofacial Surgery, Komaki City Hospital

【緒言】免疫チェックポイント阻害薬であるニボルマブは、PD-1 と PD-1 リガンドとの結合を阻害し、抗原特異的な T 細胞の増殖、活性化およびがん細胞に対する細胞傷害活性を増強することで抗腫瘍効果を示すと考えられている。今回、口蓋悪性黒色腫頭部再発例に対してニボルマブを使用したことでその概要を報告する。【症例】67 歳。男性。既往歴：心筋梗塞、胃潰瘍。現病歴：2013 年 1 月近歯科受診時に口蓋の黒色病変を指摘され当科紹介受診。【処置及び経過】同年 2 月全身麻酔下にて上顎部分切除術施行。10 月右頸部リンパ節転移認め右頸部郭清術施行。12 月より DAV-Feron 療法施行。2014 年 1 月肺炎による発熱にて緊急入院。ダカルバジンによる薬剤性の間質性肺炎が考えられ Feron 療法のみを継続。2014 年 7 月左頸部リンパ節転移認め、8 月に左頸部郭清術施行。2015 年 3 月左後頭部、耳下腺、左舌骨に再発認め、ニボルマブ投与を 10 コース行った。現在も加療中である。【結果】3 コース終了時の CT では腫瘍の増大を認めた。6 コース終了時の CT では明らかな腫瘍サイズの変化は認めなかった。これまで重篤な有害事象は認めなかった。【考察】臨床効果の特徴として、抗腫瘍効果の発現までに数ヶ月の時間を要することが指摘されており本症例においても同様の結果であった。また、免疫介在性の有害事象が報告されており慎重な経過観察が必要である。

P-9-1 pN0, pN1 かつ被膜外浸潤陰性の舌扁平上皮癌症例の臨床的検討
Clinical study of pN0 and pN1 without extracapsular spread in squamous cell carcinoma of the tongue

○佐々木 剛史¹、青木 隆幸¹、大鶴 光信¹、新井 俊弘²、鈴木 崇嗣¹、吉田 佳史¹、関根 理予¹、逢坂 竜太¹、金丸 健太¹、秋庭 健志^{1,3}、太田 嘉英¹、金子 明寛¹
¹東海大学医学部 外科学系口腔外科、²静岡医療センター 歯科口腔外科、³東海大学医学部専門診療学系 放射線治療科学

Masashi Sasaki¹, Takayuki Aoki¹, Mitsunobu Otsuru¹, Toshihiro Arai², Takatsugu Suzuki¹, Yoshifumi Yoshida¹, Riyo Sekine¹, Ryuta Ousaka¹, Kenta Kanamaru¹, Takeshi Akiba^{1,3}, Yoshihide Ota¹, Akihiro Kaneko¹
¹Department of oral and maxillofacial surgery, Tokai University School of Medicine, Kanagawa, Japan, ²Department of oral and maxillofacial surgery, National Hospital Organization Shizuoka Medical Center, Shizuoka, Japan, ³Department of therapeutic radiology, Tokai University School of Medicine, Kanagawa, Japan

【背景】口腔癌術後再発高リスク因子として、多発頸部リンパ節転移やリンパ節転移被膜外浸潤が指摘されている。一方、頸部郭清を施行した結果、頸部リンパ節に転移を認めない症例 (pN0) や、単発の頸部リンパ節転移でかつ被膜外浸潤を認めない症例 (pN1 かつ ECS (-)) は予後良好とされる。しかし、これらの予後良好とされる症例でも、少数例ではあるが不幸な転移をとる症例もある。今回これら予後良好とされる pN0 あるいは pN1 かつ ECS (-) の舌扁平上皮癌症例を臨床的に検討した。【対象】2005 年 1 月～2012 年 1 月の 7 年間に当科にて手術療法を主体とした治療を行い、3 年以上経過観察が可能であった舌扁平上皮癌のうち頸部郭清を施行し、pN0 あるいは pN1 かつ ECS (-) であった 35 症例とした。なお今回の検討では口腔多発癌症例は除外した。【結果】T1:1 例、T2:20 例、T3:6 例、T4a:7 例、T4b:1 例であった。pN0:21 例、pN1 かつ ECS (-):14 例であった。5 年生存率は 85.7% であり、5 例で予後不良であった。原発巣は全例で制御されていた。頸部非制御が 3 例で、そのうち 2 例で舌骨傍領域での頸部再発巣の非制御であった。残りの 2 例は他病死であった。【結論】舌骨傍領域は通常の頸部郭清術では郭清エリア外の部位であるが、舌癌症例で頸部郭清術を施行する場合はこの部位の郭清も行うべきと思われる。

P-9-3 当科における上顎歯肉がん・硬口蓋がん症例の臨床的検討
A clinical study of upper gingival and hard palate cancer in the Department of Dentistry and Oral Surgery, Nikko Memorial Hospital

○榎原 典幸¹、水野 貴行¹、高野 昌士²、加藤 卓己¹、坂田 健一郎¹、日笠 紘志¹、箕輪 和行³
¹日鋼記念病院 歯科口腔外科、²北斗病院 歯科口腔外科、³北海道大学大学院歯学研究科 口腔病態学講座 歯科放射線学教室

Noriyuki Sakakibara¹, Takayuki Mizuno¹, Masashi Takano², Takumi Kato¹, Ken-ichiro Sakata¹, Hiroshi Hikasa¹, Kazuyuki Minowa³
¹Department of Dentistry and Oral Surgery, Nikko Memorial Hospital, Muroran, Japan, ²Department of Oral Surgery, Hokuto Hospital, ³Dental Radiology, Department of Oral Pathobiological Science, Graduate School of Dental Medicine, Hokkaido University

【対象】2005～2014 年に当科で根治療法を行った 16 例 (男性 8 例、女性 8 例)。年齢 46～90 歳 (中央値 71.5 歳) で、上顎歯肉 11 例、硬口蓋 5 例。病理組織型は、扁平上皮癌 15 例 (うち 1 例は疣贅癌)、粘表皮癌 1 例で、病期分類は Stage 1:2 例、Stage 2:2 例、Stage 4A:5 例、Stage 4B:7 例であった。pN (+) は 4 例で、うち 1 例は後発転移症例であった。【治療】全例に手術を実施。Stage 4 に対しては、12 例中 11 例に術前照射を行い、うち 10 例には何らかの化学療法を併用し、10 例には頸部郭清および遊離皮弁による再建を行った。原発の安全域のため 2 例は術後照射を行い、術後補助化学療法は 16 例中 8 例に実施、うち 7 例は Stage 4 症例であった。【結果】観察期間は 1 年 1 か月～9 年 10 か月 (中央値 4 年 2 か月)。再発・転移のない無病生存は 13 例、対側の頸部後発転移と同時肺転移による原発病死が 1 例、他病死が 2 例。局所再発はなかった。【成績】5 年生存率 (DSS) は、上顎歯肉:90.9%、硬口蓋:100%で、全体で 93.8%。Stage 1:100%、Stage 2:100%、Stage 4A:100%、Stage 4B:85.7%であった。全経過中の pN 別 5 年累積生存率は pN (-) 12 例:100%、pN (+) 4 例:75%で、他施設の報告同様、病理組織学的頸部転移陽性が予後に影響を与えていた。

P-9-2 当科における口腔擦過細胞診の有用性に関する検討
Study on the utility of oral exfoliative cytology in our department

○高森 翔子、渋谷 亜佑美、村上 拓也、越沼 伸也、肥後 智樹、山本 学
滋賀医科大学医学部附属病院 歯科口腔外科学講座

Shoko Takamori, Ayumi Shibutani, Takuya Murakami, Shinya Koshinuma, Tomoki Higo, Gaku Yamamoto
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Shiga University of Medical Science Hospital

口腔擦過細胞診は、細胞所見から収集できる情報が多く、侵襲が極めて少なく安全であるため、臨床でよく施行される検査である。しかし、その有用性についての報告は少ない。今回我々は、2009 年 4 月から 2015 年 3 月の 6 年間、当科で悪性所見を疑い、口腔擦過細胞診を行った 264 例について、臨床統計学的検討を行ったので報告する。採取部位は舌が 146 例 (55%) と最も多く、次いで歯肉 74 例 (28%)、頬粘膜 32 例 (12%)、口唇 9 例 (3%)、口底 3 例 (1%) であった。Papanicolaou の Class 分類において、Class 2 151 例 (57.6%)、次いで Class 3 82 例 (31.3%)、Class 1 21 例 (8.0%)、Class 5 7 例 (2.7%)、Class 4 1 例 (0.4%) であった。Class 2 と診断された 151 例中、視診上悪性が疑われた 43 例 (28.5%) に生検を行った結果、悪性と診断されたのは 9 例 (6.0%)、Class 3 と診断された 82 例中、視診上悪性が疑われた 44 例 (53.7%) に生検を行った結果、悪性と診断されたのは 19 例 (23.2%) であった。細胞診において Class 2、3 であっても、生検にて悪性所見を認める症例もあることから、定期観察に加え病状に変化がなければ、生検を積極的に行うべきと示唆された。口腔擦過細胞診を積極的に行うことにより、口腔がんの早期発見による早期治療開始につながると考えられた。

P-9-4 口腔扁平上皮癌患者の遠位レベル (Level 4,5) への頸部リンパ節転移が予後に与える影響
The outcome and the risk factor of oral squamous cell carcinoma patients with level 4/5 lymph node metastases

○定兼 啓倫¹、長谷川 巧実¹、渋谷 恭之^{1,2}、米澤 奈津季¹、武田 大介¹、高橋 佑輔¹、笈 康正¹、明石 昌也¹、南川 勉¹、古森 孝英¹

¹神戸大学大学院医学研究科 外科系講座 口腔外科学分野、²名古屋市立大学大学院医学研究科 口腔外科学

Hiromichi Sadakane¹, Takumi Hasegawa¹, Yasuyuki Shibuya^{1,2}, Natsuki Yonezawa¹, Daisuke Takeda¹, Yusuke Takahashi¹, Yasumasa Kakei¹, Masaya Akashi¹, Tsutomu Minamikawa¹, Takahide Komori¹
¹Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Kobe University Graduate School of Medicine, ²Department of Maxillofacial Surgery, Nagoya City University Graduate School of Medical Sciences

【緒言】口腔扁平上皮癌の治療に際し、頸部リンパ節転移の有無やその転移部位は術後の治療方針決定や予後の評価に重要な因子といえる。今回我々は、口腔扁平上皮癌患者において Level IV あるいは V への頸部リンパ節転移の有無が予後に与える影響について分析し、比較検討を行った。【対象と方法】1999 年 8 月から 2014 年 10 月に当科で口腔扁平上皮癌に対し頸部郭清を含めた外科的治療を行った患者 291 名を対象とした。内訳は男性 178 例、女性 113 例で、年齢は 23～96 (中央値 66) 歳であった。分析項目は、年齢、性別、TNM 分類、stage、分化度、転移リンパ節の総数、遠位レベルの転移リンパ節数、節外浸潤の有無、断端陽性の有無、原発巣最終制御、頸部再発および遠隔転移の有無、術後治療の有無 (化学療法、放射線療法)、予後とした。【結果】全症例中、23 例 (7.9%) に遠位レベルへの頸部リンパ節転移を認めた。舌原発例、中～低分化型、多発転移、切除断端陽性例において、有意に遠位レベル転移を認めた (P < 0.05)。また、遠位レベル転移を認めた症例は、局所再発、頸部再発、遠隔転移を有意に多く認め、生存期間が短縮していた。【結論】病理組織学的所見と遠位レベル転移の発生率、予後は有意な関連が認められ、術後補助療法の検討やより注意深い経過観察が必要と考えられた。

P-9-5

長野県 6 病院における顎口腔領域悪性腫瘍一次症例の臨床統計学的検討

Clinical statistical studies of primary malignant tumors in the oral and maxillofacial regions, 6 hospitals in Nagano prefecture

○酒井 洋徳¹、峯村 俊一²、中島 哲³、山崎 正⁴、奥山 英樹⁵、西沢 理史⁶、野池 淳一¹、横井 啓¹、栗田 浩⁷

¹長野市民病院 歯科口腔外科、²飯田市立病院 歯科口腔外科、³北アルプス医療センターあづみ病院 歯科口腔外科、⁴小諸厚生病院 歯科口腔外科、⁵佐久市立国保浅間総合病院 歯科口腔外科、⁶信州上田医療センター 歯科口腔外科、⁷信州大学医学部 歯科口腔外科学講座

Hironori Sakai¹, Toshikazu Minemura², Satoshi Nakajima³, Tadashi Yamazaki⁴, Hideki Okuyama⁵, Rishino Nishizawa⁶, Jun-ichi Noike¹, Kei Yokoi¹, Hiroshi Kurita⁷

¹Department of oral and maxillofacial surgery, Nagano municipal hospital, ²Department of oral and maxillofacial surgery, Iida municipal hospital, ³Department of oral and maxillofacial surgery, North Alps Medical Center Azumi Hospital, ⁴Department of oral and maxillofacial surgery, Komoro Kosei hospital, ⁵Department of oral and maxillofacial surgery, Asama hospital, ⁶Department of oral and maxillofacial surgery, Shinshu ueda medical center, ⁷Department of Dentistry and oral surgery, Shinshu University School of Medicine

扁平上皮癌症例での発生部位は舌 88 例(40.4%)下顎歯肉 50 例(22.9%)、上顎歯肉 33 例(15.1%)でありこの 3 部位で 75%以上を占めていた。そのうち T2 が 89 例(40.8%)、次いで T1 が 59 例(27.1%)、T4 が 47 例(21.6%)、T3 が 23 例(10.6%)であった。病期分類は stageII が 74 例(33.9%)、stageIV が 57 例(26.1%)、stageI が 56 例(25.7%)、stageIII が 31 例(14.2%)であった。治療法に関しては、197 例(90.1%)に手術を中心とした治療法が選択され、手術・放射線・化学療法の三者併用による集学的治療を施行した症例は 25 例(11.5%)であった。2 年累積年生存率は stageI が 94.0%、stageII が 84.0%、stageIII が 87.7%、stageIV が 51.1%であった。上記結果に基づいた臨床統計学的検討の詳細を報告予定である。

P-9-7

当科において根治手術を行った上顎歯肉扁平上皮癌症例の検討

Clinical study of upper gingival squamous cell carcinoma that underwent radical surgery in Oita university

○山本 哲彰、高橋 喜浩、河野 辰行、阿部 史佳、田嶋 理江、板井 健、河野 憲司

大分大学医学部 歯科口腔外科学講座

Noriaki Yamamoto, Yoshihiro Takahashi, Tatsuyuki Kono, Ayaka Abe, Rie Tashima, Takeshi Imai, Kenji Kawano
Department of Dentistry and Oral-Maxillo-Facial Surgery, Faculty of Medicine, Oita University, Oita, Japan

【目的】当科において根治手術を行った上顎歯肉癌の治療成績について検討を行い、予後危険因子を検討することを目的とした。【対象】2000 年から 2015 年までの 15 年間に大分大学医学部歯科口腔外科を受診し、根治的治療を行った上顎歯肉扁平上皮癌一次症例 43 例(男性:22 例、女性:21 例、初診時年齢 47-91 歳、平均年齢 73 歳)とした。【結果】T 分類は T1:7 例、T2:19 例、T3:2 例、T4a:7 例、T4b:8 例であり、N 分類は N0:35 例、N1:3 例、N2b:5 例であった。臨床病期は Stage I-II:24 例、Stage III-IV:19 例であった。部位は前方型:4 例、臼歯部型:30 例、後方進展型:9 例であり、組織学的所見は高分化型:33 例、中分化型:9 例、低分化型:1 例であった。治療法は、外科療法単独:38 例、術前化学放射線療法+外科療法:2 例、術前放射線療法+外科療法:3 例、また術後放射線化学療法を追加した症例は 3 例であった。原発再発は 6 例に認められた。初回治療時の頸部郭清術は 10 例 11 側に施行され、このうち pN(+)は 8 例 8 側であった。後発転移は 8 例 8 側に認められ、ルビエールリンパ節転移は 4 例に認められた。全症例の 5 年 OS:80.9%、DFS:85.4%、10 年 OS:61.4%、DFS:85.4%であった。転帰は無病生存:32 例、担癌生存:1 例、腫瘍死:9 例、他病死 1 例であった。5 年以降で腫瘍死した 3 例は全て口腔内多重症例であった。予後危険因子としては T 分類、pN の有無、部位に有意差を認め、多変量解析にて部位分類が DFS と関連する独立因子であった。

P-9-6

当科における小唾液腺癌の臨床的検討

A clinical study of minor salivary gland carcinoma in our department

○水谷 美保¹、橋田 之彦¹、川俣 綾¹、斎藤 健一¹、堀内 啓²、栢森 高³、山城 正司¹

¹NTT 東日本関東病院 歯科口腔外科、²NTT 東日本関東病院 病理診断科、³東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 口腔病理学分野

Miho Mizutani¹, Yukihiko Hashida¹, Aya Kawamata¹, Kenichi Saito¹, Hajime Horiuchi², Kou Kayamori³, Masashi Yamashiro¹

¹Dentistry & Oral Surgery, NTT Medical Center Tokyo, ²Department of Diagnostic Pathology, NTT Medical Center Tokyo, ³Department of Oral Pathology, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo Medical and Dental University

小唾液腺に発生する唾液腺癌は全唾液腺癌のおよそ 10%程度とされる一方で、小唾液腺に発生する腫瘍は約 50%が悪性腫瘍であるとされている。今回われわれは、1995 年から 2009 年までの 15 年間に当科で治療を行った小唾液腺癌一次症例 17 例について、retrospective に検討を行った。17 例の内訳は、男性 7 例、女性 10 例、年齢中央値は 52 歳(27-75 歳)であった。発生部位は、口蓋:8 例、下顎:4 例、口底:2 例、舌:2 例、上唇:1 例であった。病理組織型は、粘表皮癌が 12 例と最も多く、次いで腺様嚢胞癌 3 例、腺房細胞癌 2 例であった。治療法は外科的切除が 16 例であり、うち頸部郭清術も併用した症例が 4 例であった。1 例では全身状態を考慮し、放射線療法を行った。初回治療後の経過は、原発巣再発が 2 例、後発頸部転移が 3 例にみられた。全 17 例の転帰は、無病生存 14 例、担癌生存 1 例、原病死 1 例、他病死 1 例であり、経過観察期間は 5-210 か月、5 年生存率は 83.3%であった。唾液腺癌は長期経過後に再発・転移をきたすとの報告も見られるため、治療後長期間にわたる経過観察が重要であると考えられた。

P-9-8

超高齢口腔扁平上皮癌患者の臨床的検討

Clinical investigation of oldest-old patients with oral squamous cell carcinoma in Kochi Medical School Hospital

○北村 直也、吉澤 泰昌、笹部 衣里、山本 哲也

高知大学医学部 歯科口腔外科学講座

Naoya Kitamura, Yasumasa Yoshizawa, Eri Sasabe, Tetsuya Yamamoto
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Kochi Medical School, Kochi University

【緒言】高知県の高齢化は全国に比べ約 10 年先行し、2013 年の高齢化率は 31.1%と全国第 2 位である。今回我々は、当科で加療した超高齢口腔扁平上皮癌患者について臨床的に検討した。【対象および方法】1981 年 10 月～2013 年 3 月の 31.5 年間に当科で加療した口腔扁平上皮癌患者 1 次症例 546 例のうち、85 歳以上の超高齢者 36 例を対象とした。1981 年 10 月～1993 年 3 月を 1 期、1993 年 4 月～2003 年 3 月を 2 期、2003 年 4 月～2013 年 3 月を 3 期とし、カルテ情報をもとに後ろ向きに比較検討した。【結果】超高齢者の割合は、1 期:6/153 例(3.9%)、2 期:7/175 例(4.0%)、3 期:23/218 例(10.6%)で、3 期において有意に多数であった。性別、原発部位、病期に関しては、各期間の間に有意差はなかったものの、治療法では手術単独例が 1 期:0 例、2 期:3 例(42.9%)、3 期:18 例(78.3%)と 1 期において有意に少なく、3 期において有意に多かった。また、予後を原病死・2 年以内に他病死・2 年以上生存の 3 群に分類したところ、原病死は 1 期:1 例(16.7%)、2 期:2 例(33.3%)、3 期:1 例(4.6%)、2 年以内に他病死が 1 期:3 例(50%)、2 期:0 例、3 期:3 例(13.6%)と 1 期において有意に多く、2 年以上生存が 1 期:2 例(33.3%)、2 期:4 例(66.7%)、3 期:18 例(81.8%)と 1 期において有意に少なかった。【結語】今後、超高齢口腔がん患者は増加傾向にある。全身状態が許すのであれば、手術単独が予後の向上に寄与する可能性が示唆された。

P-9-9 **名古屋掖済会病院歯科口腔外科における過去7年間の口腔癌症例の臨床的検討**
Clinical analysis of oral cancer cases during the last 7years in department of oral surgery, Nagoya Ekisaikai Hospital

○伊藤 発明¹、阿部 厚¹、國井 綜志¹、皆川 将司¹、竹本 真紀¹、伊東 優¹、足立 守安²
¹名古屋掖済会病院 歯科口腔外科、²静岡県立総合病院 歯科口腔外科

Tatsuki Ito¹, Atsushi Abe¹, Soushi Kunii¹, Masashi Minagawa¹, Maki Takemoto¹, Yu Ito¹, Moriyasu Adachi²
¹The Department of Oral Surgery, Nagoya Ekisaikai Hospital, Aichi, Japan, ²The Department of Oral Surgery, Shizuoka General Hospital, Shizuoka, Japan

当院は「愛知県がん診療拠点病院」に指定されており、地域医療におけるがん治療に貢献している。今回われわれは、当科で治療を行った口腔癌症例について臨床的検討を行ったので報告する。
対象は2007年1月から2014年12月までに当科で一次治療を行った48例で、男性34例、女性14例であった。病理組織別では47例が扁平上皮癌、1例が腺様嚢胞癌であった。原発部位別では舌:22例、歯肉:13例、口腔底:6例、頬粘膜:5例、口蓋:2例であった。TNM分類はT分類ではT1:12例、T2:23例、T3:7例、T4a:6例、N分類ではN0:33例、N1:10例、N2b:4例、N3:1例であった。病期分類では1期10例、2期14例、3期14例、4A期10例であった。治療法は全ての症例で手術治療が行われており、21症例で術後化学療法、1症例で術後放射線療法を併用し、術後化学療法および放射線療法の三者併用治療を1症例で行った。一次治療施行後の経過は、原発巣再発が4例、頸部後発転移が11例であった。転帰は生存37例、原病死8例であり、平均観察期間は53.1ヶ月(7~155ヶ月)、全症例の5年累積生存率は78.0%で、病期別ではStage 1:88.9%、Stage 2:85.7%、Stage 3:76.9%、Stage 4A:52.5%であった。当院では手術治療を主体として口腔癌治療を進めており、近年では術後化学療法も併用することで良好な治療成績が得られているものと考えられた。

P-9-11 **口腔癌術後に肺転移をきたした体幹部定位放射線治療 (SBRT) を施行した症例について**
The cases of stereotactic body radiotherapy (SBRT) to lung metastases of postoperative of oral cancer

○中川 祥、久保田 耕生、今 敬生、伊藤 良平、小林 恒
弘前大学医学部医学研究科 歯科口腔外科学講座

Hiroshi NAKAGAWA, Kousei Kubota, Takao Kon, Ryouhei Ito, Wataru Kobayashi
Department of Dentistry and Oral Surgery, Hirosaki University Graduate School of Medicine

【緒言】口腔癌の原発巣に対する治療成績は向上しているが、遠隔転移の制御は困難であり、予後に与える影響は大きい。当科では口腔癌治療後の肺転移に対して2008年より体幹部定位放射線治療 (SBRT) を行っている。その結果について検討したので若干の知見を踏まえ報告する。
【症例】2008年4月から2013年2月までに当科を受診され、口腔癌に対する治療後、肺転移をきたした患者5名を対象とした。性別は男性5名、平均年齢は68.4歳であった。部位別では下顎歯肉2例、舌2例、口腔底1例であった。病理組織学的分類では、高分化型扁平上皮癌3例、中分化型扁平上皮癌1例、低分化型扁平上皮癌1例であった。臨床病期はStage I:1例、Stage IV:4例であった。治療法は超選択的動注化学放射線療法2例、手術放射線療法2例、手術+超選択的動注化学放射線療法1例であった。肺転移の確認時期は定期経過観察CTにおいて、肺転移巣が確認された時期とした。術後6か月~1年が3例、1年~1年6か月以内が2例であった。いづれの患者に対してもSBRT (Total 50Gy・5分割) が施行された。予後の観察期間中央値は31.4か月 (範囲:13か月~42か月) で3例が原病死、1例が坦癌生存、1例がCRであった。
【結語】一般に原発性肺癌に対するSBRTの治療率は90%以上とされるが口腔癌からの転移巣に対しては難治性であると思われた。

P-9-10 **市立四日市病院歯科口腔外科における小唾液腺癌の臨床的検討**
A clinical study of minor salivary gland carcinoma at the department of oral and maxillofacial surgery, Yokkaichi municipal hospital

○石井 興、山本 知由、上田 整、阿部 成治、池内 睦、小牧 完二
市立四日市病院 歯科口腔外科

Kou Ishii, Tomoyoshi Yamamoto, Sei Ueda, Seiji Abe, Mutsumi Ikeuchi, Kanji Komaki
Department of oral and maxillofacial surgery, Yokkaichi municipal hospital, Yokkaichi, Japan

小唾液腺癌は頭頸部癌の1~2%の割合を占めると報告される比較的低悪性度の癌である。しかし、小唾液腺腫瘍の中では半数が悪性腫瘍とされており悪性度の高い疾患であるため、臨床的に小唾液腺疾患を疑う場合には常に癌を念頭に置いての対応が必要である。また、病理組織学的にも悪性の有無や組織型など鑑別診断に苦慮する事も多く、治療態度も含め慎重な対応が必要である。今回われわれは市立四日市病院歯科口腔外科で加療を施行した小唾液腺癌症例について、臨床的検討を行った。対象:2008年1月1日~2014年12月31日の7年間に当科を受診し、病理組織学的検査、画像診断などで小唾液腺癌の診断を得た13例中当科で加療施行した9例。検討項目:年齢。性別。病期期間。原発部位。病期。組織型。治療。観察期間。生存率。結果は、年齢:38~78歳(中央値63歳)。性別:男5例、女性4例。病期期間:1週間~10年(中央値60日)。原発部位:頬粘膜6例、口底2例、口蓋1例。病期:I 5例、II 2例、III 1例、IV 1例。組織型:粘表皮癌4例、腺房細胞癌2例、粘液腺癌1例、基底細胞腺癌1例、多型低悪性度腺癌1例。治療:全例手術、術後追加化学療法1例、追加化学療法+放射線照射1例。観察期間:377日~2404日(中央値827日)。生存7例、死亡1例(原病死)であった。その他多少の文献的考察を加え報告する。

P-9-12 **当科における唾液腺悪性腫瘍の臨床統計学的検討**
A clinical study of patients with malignant salivary gland tumors

○吉田 佳史¹、太田 嘉英¹、金丸 健太¹、内堀 雅博¹、逢坂 竜太¹、関根 理予¹、鈴木 崇嗣¹、加藤 久視¹、佐々木 剛史¹、大鶴 光信¹、青木 隆幸¹、金子 明寛¹、秋庭 健志²
¹東海大学医学部 外科学系口腔外科学、²東海大学医学部 放射線治療科

Yoshifumi Yoshida¹, Yoshihide Ota¹, Kenta Kanamaru¹, Masahiro Uchibori¹, Ryuta Osaka¹, Riyo Sekine¹, Takatsugu Suzuki¹, Hisashi Kato¹, Mashi Sasaki¹, Mitsunobu Otsuru¹, Takayuki Aoki¹, Akihiro Kaneko¹, Kenji Akiba²
¹Department of oral surgery, Tokai university school of medicine, ²Department of radiation oncology, Tokai university school of medicine

【目的】唾液腺腫瘍は多様な組織型を示すため、良悪性も含めて診断や治療方針に苦慮することも少なくない。そのため、各組織型における臨床的特徴について熟知することが治療成績の向上に繋がると考える。今回、われわれは病理組織学的に唾液腺悪性腫瘍と診断した52例について臨床統計学的検討を行った。【対象および方法】対象は1990年から2014年までの24年間に当科を受診し、病理組織学的に唾液腺悪性腫瘍と診断された52例である。年齢は14歳から82歳(中央値57.5歳)、性別は男性20例、女性32例であった。原発部位は舌下腺15例、口蓋15例、頬部5例、上顎5例、顎下腺4例、下唇3例、白後部2例、舌1例、その他2例であった。【結果】組織型は腺様嚢胞癌36例、粘表皮癌10例、腺房細胞癌2例、多形腺腫内癌1例、腺癌1例、扁平上皮癌1例、組織型不明1例であった。治療方針は根治的切除が50例、姑息的切除2例であった。根治切除においては原発巣切除と同時に頸部郭清術を行った症例が24例であった。5年生存率は93.6%であった。原病死は9例であり、そのうち5年以上経過後に死亡した症例は6例でいずれも肺転移によるものであった。【考察】長期経過後に遠隔転移を認める症例において、原発巣および頸部は良好に制御されていた。唾液腺悪性腫瘍に対する術後補助療法や長期での遠隔転移も含めた経過観察について検討が必要と考えられた。

P-9-13

口腔癌患者における重複癌の臨床的検討

A clinical study of multiple primary cancers in patients with oral cancer

○池田 久住¹、鳴瀬 智史²、井 隆司¹、白石 剛士¹、山下 裕美¹、三浦 桂一郎¹、川崎 貴子¹、大場 誠悟¹、江頭 寿洋¹、中尾 祐仁²、足立 真基²、大森 景介²、柳本 惣市²、梅田 正博²、朝比奈 泉¹

¹長崎大学大学院医歯薬学総合研究科医療科学専攻 展開医療科学講座顎口腔再生外科学分野、²長崎大学大学院医歯薬学総合研究科医療科学専攻 展開医療科学講座口腔腫瘍治療学分野

Hisazumi Ikeda¹, Tomofumi Naruse², Takashi I¹, Takeshi Shiraiishi¹, Hiromi Yamashita¹, Keichirou Miura¹, Takako Kawasaki¹, Seigo Ohba¹, Kazuhiro Egashira¹, Yuuji Nakao², Masaki Adachi², Keisuke Ohmori², Souichi Yanamoto², Masahiro Umeda², Izumi Asahina¹

¹Department of Regenerative Oral Surgery, Unit of Translational Medicine, Graduate School of Biomedical Sciences, Nagasaki University, ²Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Unit of Translational Medicine, Graduate School of Biomedical Sciences, Nagasaki University

【緒言】口腔癌は重複癌の頻度が高いことが報告されている。われわれは、2008年1月から2015年3月までの間に長崎大学病院口腔外科を受診した、口腔悪性腫瘍患者を対象に重複癌の検討を行ったので報告する【対象】2008年1月から2015年3月までに長崎大学病院口腔外科を受診した、口腔悪性腫瘍患者137例。重複癌はWarrenとGatesの診断基準に、同時性異時性の基準は口腔癌取り扱い規約にもとづいた。【結果】137例の内訳は男性67例、女性70例で男女比はほぼ1:1であった。137例中、22例(16%)、26部位に重複癌を認めた。22例中、男性16例、女性6例で男女比は2.7:1で男性の方が多かった。22例中異時性癌は18例で、大腸癌5例、前立腺癌4例、食道癌、胃癌がそれぞれ3例、肺癌、乳癌、皮膚癌がそれぞれ2例、その他が3例であった。口腔癌の発症を基準とした場合、癌の既往があった患者は12例(12/137:8.7%)、12部位で、男性8例、女性4例、口腔癌の発症までの平均は74.8ヶ月であった。口腔癌治療後に重複癌の発生を認めたのは6例(6/137:4.3%)、8部位で男性5例、女性1例で、発症までの期間は平均37ヶ月であった。22例中、4例が重複癌が原因で死亡した。【考察】異時性重複癌が口腔癌が第一癌の場合、異時性重複癌が発生するまでの期間が、そうでない場合に比べて短い傾向にあることが示された。局所的な定期的な検査だけにとどまらず、他科との連携による全身検査も必要と考えられた。

P-9-15

当科における異時性多発癌の検討

A clinical study of Multiple Oral Carcinoma

○野田 晴菜¹、佐藤 春樹¹、早川 泰平¹、川原 侑子²、小野 翔矢²、佐久間 英規²、大岩 伊知郎^{1,2}

¹名古屋第一赤十字病院 歯科口腔外科、

²名古屋第一赤十字病院 歯科

Haruna Noda¹, Haruki Sato¹, Taihei Hayakawa¹, Yuko Kawahara², Shoya Ono², Hidenori Sakuma², Ichiro Oh-iwa^{1,2}

¹Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Japanese Red Cross Nagoya Daiichi Hospital, Nagoya, Japan, ²Department of Dentistry, Japanese Red Cross Nagoya Daiichi Hospital, Nagoya, Japan

対象は2003年1月から2012年12月までの間に、当科で一次治療を行った口腔扁平上皮癌290例中、異時性多発癌を生じた14例とした。検討項目は年齢、性別、原発部位、発生期間、T因子、N因子、経過観察期間、生命予後、他の口腔粘膜病変の有無とした。年齢は36歳～84歳(平均65歳)、男女比は6:8、初発原発部位は下顎歯肉4例、舌3例、頬粘膜3例、上顎歯肉2例、口底2例、下唇1例であった。第二癌の部位:下顎歯肉2例、舌4例、頬粘膜3例、上顎歯肉3例、口底2例、第三癌の部位:下顎歯肉1例、頬粘膜1例、上顎歯肉1例、第四癌の部位:上顎歯肉1例、頬粘膜1例であった。発生期間は第二癌:770～3574日(平均1473日)、第三癌:399～1531日(平均881日)、第四癌:521～1679日(平均1100日)であった。第一癌のT因子はT1:9例、T2:3例、T3:1例、T4:1例、N因子はN0:13例、N2c:1例であった。経過観察期間は1991～6839日(平均3064日)であった。生命予後は無病生存:12例、原病死:1例、他病死:1例であった。また先行する粘膜病変を認めた症例は3例で、口腔扁平苔癬2例、白板症1例であった。

P-9-14

舌癌、口底癌切除後再建症例における UW-QOL「appearance」の変化について

Evaluation of the UW-QOL "appearance" in patients who underwent Reconstruction after ablation cancer of tongue, floor of the mouth

○大谷津 幸生¹、野口 忠秀¹、岡田 成生¹、早坂 純一¹、土屋 欣之¹、加持 秀明²、去川 俊二²、神部 芳則¹、森 良之¹

¹自治医科大学 歯科口腔外科学講座、

²自治医科大学 形成外科学講座

Yukio Oyatsu¹, Tadahide Noguchi¹, Nauro Okada¹, Junichi Hayasaka¹, Yoshiyuki Tsuchiya¹, Hideaki Kamochi², Shunji Sarukawa², Yoshinori Jimbu¹, Yoshiyuki Mori¹

¹Department of Dentistry, Oral and Maxillofacial Surgery, Jichi Medical University, ²Department of Plastic Surgery, Jichi Medical University

【目的】胸鎖乳突筋が温存される頸部廓清と舌、口底に局限した切除後の再建症例であれば、われわれは外見に与える影響は少ないと考えているが実際に患者がどのように受け止めているかについて評価し、その概要および影響因子について検討したので報告する。【方法】2007年4月から2014年3月までに当院にて舌癌、口底癌切除後に遊離組織移植による再建術が施行された症例(胸鎖乳突筋を温存したものに限り)について、術前、術後1カ月、6カ月、1年にThe University of Washington Quality of Life (UW-QOL) scaleの12 domainのうち「appearance」を用い評価を行った症例を対象とした。なお、この評価期間中に再発や後発頸部リンパ節転移を認めた症例については除外した。【結果】対象症例は18例(男:女=9:9)で、年齢の中央値は61歳(35～83歳)であった。部位は舌16例、口底2例であった。再建は前外側大腿皮弁12例、前腕皮弁3例、鼠径皮弁2例、腹直筋皮弁1例であった。「appearance」は術後1ヶ月で低下するが術後6ヶ月で改善を認めた。【考察】舌、口底癌切除後再建症例で、術後1ヶ月の「appearance」が低下した原因としては、皮膚癒痕、廓清に伴う顔面神経下顎枝の一時的な麻痺などの影響が考えられた。

P-9-16

当科における角化嚢胞性歯原性腫瘍129例の臨床統計的検討

Clinico-statistical study of 129 cases of keratocystic odontogenic tumor

○阿部 亮輔¹、阿部 亜希¹、青村 知幸¹、八木 正篤¹、古城 慎太郎¹、山谷 元気¹、羽田 朋弘¹、千葉 卓¹、齋藤 大嗣¹、中里 紘¹、中畑 健太郎¹、水城 春美¹、泉澤 充¹、武田 泰典³

¹岩手医科大学歯学部 口腔顎顔面再建学講座口腔外科学分野、

²岩手医科大学歯学部 口腔顎顔面再建学講座歯科放射線学分野、

³岩手医科大学 病理学講座病態解析学分野

Ryosuke Abe¹, Aki Abe¹, Tomoyuki Aomura¹, Masaatsu Yagi¹, Shintaro Kogi¹, Genki Yamaya¹, Tomohiro Hata¹, Suguru Chiba¹, Daishi Saito¹, Hiroshi Nakasato¹, Kentaro Nakahata¹, Harumi Mizuki¹, Mitsuru Izumisawa², Yasunori Takeda³

¹Division of Oral and Maxillofacial Surgery, Department of Oral and Maxillofacial Reconstructive Surgery, School of Dentistry, Iwate Medical University, ²Division of Oral Radiology, Department of Oral and Maxillofacial Reconstructive Surgery, School of Dentistry, Iwate Medical University, ³Division of Anatomical and Cellular Pathology, Department of Pathology, Iwate Medical University

角化嚢胞性歯原性腫瘍(KCOT)は歯原性上皮に由来する単胞性もしくは多房性の顎骨腫瘍で錯角化を呈する重層扁平上皮により被覆された良性腫瘍の顎骨病変である。2005年WHO分類にてその再発傾向の高さや侵襲性から嚢胞から腫瘍に分類された。今回われわれは1986年4月から2015年3月までの過去30年間に、当科において診断、治療を行い病理組織学的に歯原性角化嚢胞またはKCOTと診断された129例について性別、年齢、部位、治療法、再発の有無について臨床統計的検討を行った。性別は男性80名、女性49名で男性に多くみられ、年齢分布は8-90歳で平均年齢は39.4歳であった。発生部位は上顎30例、下顎87例で基底細胞母斑症候群と診断された12例は多発性に発生していた。治療法は106例で摘出が選択され年齢や腫瘍の大きさから開窓が23例で選択された。また、再発は11例(9%)で再発までの期間は2年～11年で4年以内の再発は9例であった。再発の要因としては腫瘍に近接した歯根周囲の腫瘍残存が多かった。KCOTは部位や大きさによって再発する可能性も念頭に置き、術式の選択と注意深い経過観察が必要であると思われた。

P-9-17

当院における過去8年間のT2舌癌の術式の違いが予後に与える影響についての臨床的検討
A Clinical study of T2carcinoma of the tongue

○田中 太郎、山下 義弘、長井 健太郎、近藤 雄大
宮崎大学医学部 感覚運動医学講座顎顔面口腔外科学分野

Takakuni Tanaka, Yoshihiro Yamashita, Kentaro Nagai, Yudai Kondou
University of Miyazaki Oral and Maxillofacial Surgery

NCCN2015のガイドラインによればT2NOMOの舌癌については原発巣の厚みによって2mm以下であれば原発巣のみの切除、2-4mmの厚みであれば原発巣の切除に頸部郭清の追加を考慮。4mm以上の厚みであれば切除と同側の頸部郭清または両側の頸部郭清を行う、原発巣の切除とセンチネルリンパ節生検により頸部郭清について行うか否かを決定する方法と、放射線治療を行うといったように治療方法が細分化されている。このことに基づき、2007年から2015年までに当科にて行われたT2NOMO舌腫瘍に対する治療法と治療成績について検討し報告する。

P-9-18

千葉徳洲会病院頭頸部外科センター開設以来2年間の口腔扁平上皮癌症例の臨床的検討
Clinical study of oral squamous cell carcinoma in Department of Head and Neck Surgery, Chiba Tokushukai Hospital opened since two years

○後藤 俊行¹、黒坂 正生¹、伏見 千宙²、鎌田 信悦¹
¹千葉徳洲会病院 頭頸部外科センター、²国際医療福祉大学三田病院 頭頸部腫瘍センター

Toshiyuki Goto¹, Masao Kurosaka¹, Chihiro Fushimi², Shinetsu Kamata¹
¹Department of Head and Neck Surgery, Chiba Tokushukai Hospital, ²Department of Head and Neck Oncology and Surgery, International University of Health and Welfare

【緒言】当科は頭頸部領域疾患、特に頭頸部癌を専門に扱う治療センターとして2013年10月に千葉徳洲会病院に新たに開設された。現在、頭頸部癌を専門とする耳鼻咽喉科医1名および口腔外科医3名の体制で、手術による根治治療を中心としながら、患者の状態で機能温存を考慮し、化学療法や放射線療法を含めた集学的治療を積極的に行っている。今回当科開設以来2年間に治療を行った口腔癌症例について臨床的検討を行ったのでその概要を報告する。【対象】2013年10月から2015年9月までに当科を受診した口腔扁平上皮癌1次症例のうち初回治療を行った38例を対象とした。【結果】年齢別では27歳から86歳、平均62.1歳であった。発生部位別では舌:22例(57.9%)、上顎歯肉:5例(13.2%)、下顎歯肉:5例(13.2%)、頬粘膜:1例(2.9%)、口腔底5:5例(13.2%)であった。病理組織学的には扁平上皮癌が37例(97.4%)を占めた。Stage別ではStage1:9例(23.7%)、Stage2:11例(29.0%)、Stage3:9例(23.7%)、Stage4:9例(23.7%)であった。治療法は手術が主体で、36例(94.7%)に行われた。このうち、遊離皮弁による即時再建が行われた症例は22例(61.1%)であった。【考察】今後の治療成績を十分に検討し、より適切な治療方法の選択についての考察が必要と思われた。

P-9-19

遠隔転移による口腔扁平上皮癌非制御例の検討
Distant metastases in patients with squamous cell carcinoma of oral cavity

○西川 雅也¹、山本 憲幸¹、山口 聡¹、市村 典久¹、石川 純¹、若山 博隆¹、古江 浩樹²、日比 英晴¹

¹名古屋大学大学院医学系研究科 頭頸部・感覚器外科学講座顎顔面外科学、²小牧市民病院 歯科口腔外科

Masaya Nishikawa¹, Noriyuki Yamamoto¹, Satoshi Yamaguchi¹, Norihisa Ichimura¹, Jun Ishikawa¹, Hirotaka Wakayama¹, Hiroki Furue², Hideharu Hibi¹
¹Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Nagoya University Graduate School of Medicine, ²Department of Dental, Oral and Maxillofacial Surgery, Komaki City Hospital

【緒言】近年、口腔癌の原発・領域リンパ節の制御率は向上している。しかし局所制御されているにもかかわらず、遠隔臓器への転移をきたし、制御不能となる症例が存在することも事実である。われわれは、遠隔転移による口腔癌非制御例について検討を行った。

【対象と方法】対象は2007年1月から2014年12月までに、当科で一次治療を行った182例である。このうち、領域制御されているにもかかわらず遠隔転移により非制御となっている13例を検討の対象とした。経過観察期間は9か月～8年9か月である。検討項目は腫瘍原発部位、Stage、病理組織学的分類、一次治療、遠隔転移の確認時期と生存期間、部位、治療方法とした。

【結果】遠隔転移をきたし非制御となった13例の原発部位は舌および下顎歯肉が最も多く5例であった。また、Stage別ではStageIII、IVがそれぞれ5例であった。病理組織学的にはYK分類の3型が7例で最も多く、次いで4C型が5例となっていた。また、遠隔転移の出現した臓器に関しては肺が13例で、以下脳、肝、骨が認められた。

【考察】局所制御がされているにもかかわらず、遠隔転移が出現する要因としては、病理組織学的分化度やYK分類の高悪性型、一次治療開始時の高Stageが考えられた。現時点で、遠隔転移に関しての確立された治療法はなく、今後の検討事項と考えられる。

P-9-20

当科における口腔領域の肉腫の臨床的検討
A clinical study of Oral sarcoma in Kindai University Medical Hospital

○榎本 明史、森影 恵里、向井 隆雄、山中 康嗣、濱田 傑
近畿大学医学部附属病院 歯科口腔外科

Akifumi Enomoto, Eri Morikage, Takao Mukai, Yasutsugu Yamanaka, Suguru Hamada
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Kindai University, faculty of Medicine

口腔悪性腫瘍のうち肉腫の発生頻度は1%程度と言われており、稀な疾患である。今回、われわれは、2006年から2014までの8年間で当科にて加療した口腔領域に発生した肉腫の8症例(男性3例・女性5例、年齢13から73歳)について報告する。症例(組織型)の内訳は骨肉腫が2症例、ユーイング肉腫が1症例、血管肉腫が2症例、横紋筋肉腫が2症例、脂肪肉腫が1例であった。病期分類については、骨肉腫2症例がIA期およびIVB期、ユーイング肉腫1症例がIII期、血管肉腫2症例がともにIA期、横紋筋肉腫2症例がともにIII期、脂肪肉腫が1症例がIIA期であった。治療方法に関して、全身転移していた横紋筋肉腫1例に対しては化学療法を施行した。これを除く7症例に対しての一次治療として外科治療が行われた。骨肉腫および横紋筋肉腫に対しては化学療法を、ユーイング肉腫に対しては放射線化学療法を術後補助療法として施行した。予後に関しては、再発・転移は、横紋筋肉腫2症例、骨肉腫2症例、ユーイング肉腫1症例の5症例に認められ、うち4症例は死亡している。検討症例の5年生存率は40%であり、本調査最終観察時点にて生存している症例は8症例中4症例であった。

P-9-21

口腔がん肺転移症例に対する臨床的検討
Clinical analysis for Lung Metastases of Oral Cancer

○大金 覚^{1,2}、河地 誉^{1,3}、齋藤 寛一^{1,3}、森田 奈那³、佐藤 一道³、高野 正行^{1,2}、野村 武史^{1,3}、片倉 朗^{1,4}、柴原 孝彦^{1,2}、高野 伸夫¹、寺嶋 毅⁵、江口 圭介⁶、青柳 裕⁷

¹ 東京歯科大学 口腔がんセンター、² 東京歯科大学 口腔顎顔面外科学講座、³ 東京歯科大学 オーラルメディスン・口腔外科学講座、⁴ 東京歯科大学 口腔病態外科学講座、⁵ 東京歯科大学市川総合病院 呼吸器内科、⁶ 東京歯科大学市川総合病院 呼吸器外科、⁷ 東京歯科大学市川総合病院 放射線科

Satoru Ogane^{1,2}, Homare Kawachi^{1,3}, Hirokazu Saito^{1,3}, Nana Morita³, Kazumichi Sato³, Masayuki Takano^{1,2}, Takeshi Nomura^{1,3}, Akira Katakura^{1,4}, Takahiko Shibahara^{1,2}, Nobuo Takano¹, Takeshi Terashima⁵, Keisuke Eguchi⁶, Yutaka Aoyagi⁷
¹Oral Cancer Center, Tokyo Dental College, ²Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Tokyo Dental College, ³Department of Oral Medicine, Oral and Maxillofacial Surgery, Tokyo Dental College, ⁴Department of Oral Pathological Science and Surgery, Tokyo Dental College, ⁵Department of Respiratory Medicine, Tokyo Dental College Ichikawa General Hospital, ⁶Department of General Thoracic Surgery, Tokyo Dental College Ichikawa General Hospital, ⁷Division of Radiology, Tokyo Dental College Ichikawa General Hospital

【緒言】近年、口腔癌に対する手術療法、放射線療法、化学療法の進歩により、治療成績は向上している。その一方で再発例や転移例も多く、遠隔転移をきたしやすい肺転移症例では制御不能症例が多い。しかし、所属リンパ節への転移と予後との関連について検討した報告は数多くみられるが、肺転移症例に対する予後について検討した報告は比較的少ない。今回われわれは、しばしば遭遇する口腔がんの肺への遠隔転移に注目し、臨床的検討を行ったので報告する。【対象および方法】対象は 2006 年から 2015 年までに東京歯科大学口腔がんセンターで診断された口腔がん肺転移症例である。【結果および考察】今回の症例は、いずれも原発巣治療後の定期的な画像検査によって発見されている。治療法としては、外科療法、放射線療法、化学療法が行っていた。外科療法および放射線療法は条件を満たせば有効であるが、多発性のもや局所制御ができていないものに対して適応はない。化学療法の治療成績においては口腔がん進行例に対する向上が報告されている。しかし、生存期間には多少寄与するが、腫瘍の制御までは期待し難い状況である。現段階では有効な治療法の確立はされていない。今後は、予後ならびに QOL を向上させるため早期発見に努めるとともに、他診療科とより密接な連携をもち、外科療法、放射線療法、化学療法による有効的な集学的治療を確立していかなければならないと考える。

P-9-23

当科における多形腺腫の臨床的検討
A clinical study of Pleomorphic adenoma in our department

○高見澤 聡一、矢島 淳一、堀 泰斗、盛岡 昌史、山崎 正
小渕厚生総合病院 歯科口腔外科

Soichi Takamizawa, Junichi Yajima, Taito Hori, Masafumi Morioka, Tadashi Yamazaki
Department of Dentistry and Oral Surgery, Komoro Kousei General Hospital, Komoro, Japan

【緒言】多形腺腫は全唾液腺腫瘍の 60～74% を占め、大唾液腺では耳下腺に、小唾液腺では口蓋腺に好発する。今回われわれは、約 30 年間に当科で経験した多形腺腫 46 例について臨床統計的観察を行ったのでその概要を報告する。【対象】1984 年 4 月から 2015 年 9 月までに当科を受診し治療を行った多形腺腫 46 例に対し、年齢、性別、発症部位、腫瘍の大きさ、治療法について調査を行った。【結果】発症年齢：19 歳から 90 歳で、平均年齢は 58.5 歳。70 代での発生頻度が 13 例 (28.2%) と最も多かった。性別：男性 19 例、女性 27 例と女性に多く男女比は約 2:3 であった。発症部位：耳下腺が 23 例と最も多く、次いで口蓋が 11 例、顎下腺が 7 例、口唇が 4 例、白後部が 1 例であった。耳下腺に生じた多形腺腫のうち浅葉発生例は 20 例、深葉発生例は 3 例であった。腫瘍の大きさ：7mm から 60mm で、平均は 28mm、11～20mm が 14 例 (30.4%) と最も多く認められた。治療法：大唾液腺症例は全身麻酔下にて摘出術が多く施行されており、小唾液腺症例は局所麻酔下にて摘出術が多く施行されていた。【結語】発症部位頻度では耳下腺が最も多く、口蓋が報告とは異なり、顎下腺に比べ高頻度で認められた。口唇に多形腺腫が発生する頻度は小唾液腺発生例のうち 2% と報告され非常にまれであるが、当科における発症率は全多形腺腫中 8.7%、小唾液腺発生例中 25% と非常に高い頻度で認められた。

P-9-22

当科における Stage1-2 舌扁平上皮癌術後頸部リンパ節転移に対する臨床的検討
Clinical study of delayed cervical lymph node metastasis in Stage1-2 Squamous Cell Carcinoma of the Tongue

○齋藤 寛一^{1,2}、池田 雄介¹、関川 翔一¹、森田 奈那¹、河地 誉^{1,2}、大金 覚²、佐藤 一道¹、野村 武史¹、高野 正行³、片倉 朗⁴、柴原 孝彦³、高野 伸夫²、橋本 和彦⁵、田中 陽一⁵

¹ 東京歯科大学 オーラルメディスン・口腔外科学講座、² 口腔がんセンター、³ 口腔顎顔面外科学講座、⁴ 口腔病態外科学講座、⁵ 臨床検査病理学講座

Hirokazu Saito^{1,2}, Yusuke Ikeda¹, Syoichi Sekikawa¹, Nana Morita¹, Homare Kawachi^{1,2}, Satoru Ogane², Kazumichi Sato¹, Takeshi Nomura¹, Masayuki Takano³, Akira Katakura⁴, Takahiko Shibahara⁴, Nobuo Takano³, Kazuhiko Hashimoto⁵, Yoichi Tanaka⁵
¹Department of Oral Medicine, Oral and Maxillofacial Surgery, ²Oral Cancer Center, ³Department of Oral and Maxillofacial Surgery, ⁴Department of Oral Pathobiological Science and Surgery, ⁵Division of Surgical Pathology, Clinical Laboratory

早期舌扁平上皮癌の治療成績は一般に 5 年生存率 90% 程度で、予後は比較的良好である。一方で、予後不良例が存在することも事実であり、その理由として頸部リンパ節および遠隔への転移がほとんどを占める。そこでまず、今回、頸部リンパ節のリスク因子について検討したのでその概要を報告する。東京歯科大学口腔がんセンターで加療を行った Stage1-2 舌扁平上皮癌一次症例 57 例を対象とした。後発頸部リンパ節転移は 12 例、局所再発 2 例、遠隔転移 2 例であった。その中で、後発頸部リンパ節転移例に対し、腫瘍の深達度、脈管浸潤、神経周囲浸潤の所見、組織学的分化度、浸潤様式などの病理組織学的検査結果について検討を行った。本検討では、後発頸部リンパ節転移を認めた症例についてはいずれも救済手術を行っているが、原病死 1 例をのぞき、腫瘍は制御されている。厳重な経過観察を行い、早期に頸部リンパ節への転移を察知することでほぼ制御が可能であることが示唆された。また、腫瘍の深達度は（後発頸部リンパ節転移あり 2～28mm；平均 6.4mm、後発頸部リンパ節転移なし 2～28mm；平均 6.6mm）であり、腫瘍の深達度と後発頸部リンパ節転移の有無に相関は認めなかった。腫瘍の深達度による予防郭清の是非についてはさらなる検討が必要である。近年では病理組織学的検索とともに遺伝子による予後予測因子が検討されている。今後は遺伝子による検索を含め、検討していく必要がある。

P-9-24

東京歯科大学口腔がんセンターにおける上顎歯肉癌の臨床的検討
Clinical analysis of maxillary gingival cancer in Oral Cancer Center, Tokyo Dental College

○森田 奈那¹、齋藤 寛一¹、河地 誉¹、大金 覚²、佐藤 一道¹、山内 智博³、片倉 朗^{2,4}、柴原 孝彦^{2,5}、野村 武史¹、高野 伸夫²
¹ 東京歯科大学 オーラルメディスン・口腔外科学講座、² 東京歯科大学 口腔がんセンター、³ がん・感染センター都立駒込病院 歯科・口腔外科、⁴ 東京歯科大学 口腔病態外科学講座、⁵ 東京歯科大学 口腔顎顔面外科学講座

Nana Morita¹, Kazuhiro Saito¹, Homare Kawachi¹, Satoru Ogane², Kazumichi Sato¹, Tomohiro Yamauchi³, Akira Katakura^{2,4}, Takahiko Shibahara^{2,5}, Takeshi Nomura¹, Nobuo Takano²
¹Department of Oral Medicine, Oral and Maxillofacial Surgery, Tokyo Dental College, ²Oral Cancer Center, Tokyo Dental College, ³Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Tokyo Metropolitan Cancer and Infectious Diseases Center Komagome Hospital, ⁴Department of Oral Pathobiological Science and Surgery, Tokyo Dental College, ⁵Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Tokyo Dental College

【緒言】当センターでは、NCCN のガイドラインの準拠し集学的治療を行っている。一般に口腔癌の所属リンパ節への転移は、予後不良因子の一つである。上顎歯肉癌では、対側へのリンパ節やルビエールリンパ節への転移の発生頻度が高いとされている。今回我々は、上顎歯肉癌の予後因子を検討する目的で、臨床的検討を行ったので報告する。【対象】2006 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日までに当センターで根治治療を行った上顎歯肉癌で扁平上皮癌の診断を得た一次症例 42 例を対象とした。【結果】男性 21 例、女性 21 例、平均年齢は 73.3 歳であった。42 例の治療法は外科療法が 40 例、放射線治療が 1 例、放射線併用化学療法が 1 例であった。病期分類では Stage2 が最も多く認められた。後発頸部リンパ節転移症例は 9 例（同側転移 7 例、対側転移 2 例）で Level1b への転移が最も多く認められた。遠隔転移は 2 例であった。ルビエールリンパ節への転移は 1 例に認められた。転帰としては死亡症例が 10 例（原病死 4 例、他病死 6 例）であった。【まとめ・考察】本検討では後発頸部リンパ節転移は 21% に認められた。原病死 4 例のうち、3 例は局所再発もしくは局所制御困難症例であり、この結果から局所制御の有無が予後を予測する重要な因子として示唆された。

P-9-25

頸部リンパ節後発転移を認めた口腔扁平上皮癌患者の臨床的検討

Clinical study of oral squamous cell carcinoma patients with secondary cervical lymph node metastasis

○小根山 隆浩¹、佐藤 英明¹、山口 晃¹、田中 彰²

¹日本歯科大学新潟病院 口腔外科、²日本歯科大学新潟生命科学歯学部 口腔外科学講座

Takahiro Oneyama¹, Hideaki Sato¹, Akira Yamaguchi¹, Akira Tanaka²
¹Oral and Maxillofacial Surgery, The Nippon Dental University Niigata Hospital,
²Department of Oral and Maxillofacial Surgery, The Nippon Dental University School of Life Dentistry at Niigata

【緒言】近年、臨床診断 NO 症例は嚴重な経過観察を条件に、予防頸部郭清が回避される傾向にあるが統一した見解は得られていない。そこで、2004 年 1 月から 2014 年 12 月までの 11 年間に日本歯科大学新潟病院口腔外科で治療が行われた口腔扁平上皮癌患者で、初回原発巣治療後に頸部リンパ節後発転移を認めた 30 例について臨床的検討を行った。【対象】男性 22 例、女性 8 例、年齢は 29 歳から 82 歳、平均 62.8 歳であった。原発部位では舌 16 例、下顎歯肉 4 例、上顎歯肉 4 例、頬粘膜 3 例、口底 2 例、口蓋 1 例であった。T 分類では T1 6 例、T2 24 例で全例 NOMO であった。【結果】初回治療は全例に部分切除術が行われ、原発巣切除断端では陽性 5 例、軽度上皮異形成 5 例、陰性 20 例であった。初回切除から頸部リンパ節後発転移発現までの期間は、2 年以内の 23 例では 2 から 21 か月で平均 8.2 か月であり、5 年以上の 4 例を含めると 2 から 144 か月で平均 23.5 か月であった。後発転移部位では IIA が 11 例、IB が 8 例の順であった。被膜外浸潤を認めたものが 12 例であった。後発転移郭清後の治療では、維持化学療法のうち内服が 5 例、静脈投与単独が 4 例、化学放射線療法が 7 例であった。予後では、非担癌生存が 15 例、担癌生存が 2 例、腫瘍死が 11 例、他因死が 2 例であった。【結論】頸部リンパ節後発転移への対応に関する指標は明確でなく、初回診断や初回治療後の経過観察期間、検査方法、後発転移後の治療法などの再検討が必要と思われる。

P-9-27

悪性腫瘍症例に対する周術期抗菌薬適正使用化への取り組み

An action to appropriate use of antimicrobial prophylaxis agents in Surgeries of maxillofacial malignant tumor

○西川 敦¹、児玉 泰光¹、齋藤 太郎¹、大貫 尚志¹、黒川 亮¹、小玉 直樹¹、小山 貴寛¹、池田 順行¹、永田 昌毅¹、星名 秀行^{1,2}、高木 律男¹

¹新潟大学大学院医学総合研究科 顎顔面口腔外科学分野、
²新潟大学医学総合病院 インプラント治療部

Atsushi Nishikawa¹, Yasumitsu Kodama¹, Taro Saito¹, Hisashi Ohnuki¹, Akira Kurokawa¹, Naoki Kodama¹, Takahiro Koyama¹, Nobuyuki Ikeda¹, Masaki Nagata¹, Hideyuki Hoshina^{1,2}, Ritsuo Takagi¹
¹Division of Oral and Maxillofacial Surgery, Niigata University Graduate School of Medical and Dental Sciences, Niigata, Japan, ² Oral Implant Clinic, Medical and Dental Hospital, Niigata University

【目的】悪性腫瘍手術における手術部位感染 (SSI) は、他の口腔外科手術に比べ発生率が高い事が知られている。一方で、SSI 対策として、広域スペクトル抗菌薬の選択や投与期間の延長は、耐性菌発生を助長して周術期管理を難渋させる要因となる。当科では 2011 年 7 月の ICT ラウンドを契機に、口腔外科手術全体の予防的抗菌薬投与を検討し、それまで多用されていたセフェム系第二世代に替え、現在は第一世代を推奨している。今回、予防的抗菌薬としてセフェム系第一世代を用いた悪性腫瘍症例について、SSI を指標にその効果を検証したので報告する。【対象および方法】2009 年 1 月から 2013 年 12 月まで中央手術室で手術を行った悪性腫瘍症例 140 例を対象に、患者情報 (性別、年齢、ASA-PS 分類)、疾患別分類、手術情報 (麻酔方法、創分類、手術時間、埋入物の有無、皮弁再建の有無)、抗菌薬使用状況 (使用抗菌薬、投与期間)、SSI 発生状況について調査し、セフェム系第一世代投与群 (CEZ 群: 63 例) と、第二世代投与群 (CTM 群: 73 例) とで比較検討した。【結果】SSI 発生症例は 8 例 (5.7%) であり、CEZ 群 3 例 (4.8%)、CTM 群 3 例 (4.1%) で、CEZ 群と CTM 群との SSI 発生には差はなかった。【考察】悪性腫瘍症例において、セフェム系第一世代でも第二世代と同程度に SSI 発生を予防可能である事が確認された。今後、SSI 発生リスク症例の抽出およびリスク症例に対する個別の SSI 対策を検討する必要性が示された。

P-9-26

抗血栓薬服用患者の口腔癌手術—抗血栓薬が手術や周術期に及ぼす影響について—

Clinical study of oral cancer surgery in patients receiving antithrombotic therapy

○古賀 幹一¹、平木 昭光¹、吉田 遼司¹、郷原 俊輔¹、犬束 憲史¹、廣末 晃之¹、福岡 大喜¹、尾木 秀直¹、篠原 正徳²、中山 秀樹¹

¹熊本大学大学院生命科学部 総合医薬科学部門 感覚・運動医学講座 歯科口腔外科学分野、²伊東歯科口腔病院

Kan-ichi Koga¹, Akimitsu Hiraki¹, Ryoji Yoshida¹, Syunsuke Gohara¹, Kennsi Inutsuka¹, Akiyuki Hirose¹, Daiki Fukuma¹, Hidenao Ogi¹, Masanori Shinohara², Hideki Nakayama¹
¹Department of Oral & Maxillofacial Surgery, Sensory and Motor Organ Sciences, Faculty of Medical and Pharmaceutical Sciences, Kumamoto University, ²Itou Dento-Maxillofacial Hospital

【緒言】近年、高齢化に伴い、心疾患や脳血管障害などの疾患のために抗血栓療法を行っている患者に遭遇する機会が増えている。最近では拔牙を行う際には、抗血栓薬の休薬を行わずに処置を行うことが多くなった。しかし、口腔癌の手術などの比較的大きい手術を行う際の報告はほとんどなく、また明確な基準やガイドラインも存在しないのが現状である。今回、抗血栓薬が手術や周術期に及ぼす影響について検討を行った。【対象と方法】2005 年から 2015 年までに当科において抗血栓薬を服用中に口腔癌手術を行った 83 例について検討を行った。内訳は男性 51 例、女性 32 例、平均年齢 74.3 歳。抗血栓薬の種類は抗凝固薬 18 例、抗血小板薬 56 例、抗血小板薬 2 剤併用 5 例、抗凝固薬と抗血小板薬の併用 4 例。休薬症例 36 例 (休薬群)、内服継続例 23 例 (継続群)、代替療法例 24 例 (代替群)。原発部位は舌 28 例、下顎歯肉 19 例、上顎歯肉 8 例、口底 11 例、頬粘膜 14 例、口蓋 3 例。stage 分類は 1:16 例、2:25 例、3:17 例、4:13 例。再発症例 12 例であった。術式は腫瘍切除 43 例、頸部郭清術 5 例、腫瘍切除+頸部郭清術 19 例、腫瘍切除+頸部郭清術+再建術 16 例であった。【結果】抗血栓薬の休薬群、継続群、代替群の 3 群間において術中および術後出血量、術後合併症、後出血イベントに統計学的有意差は認めなかった。【結論】腫瘍切除から再建を伴う複合手術まで抗血栓薬服用継続下での手術が可能である事が示唆された。

P-9-28

当科における口腔扁平上皮癌の臨床統計学的検討

Clinical statistical study of oral squamous cell carcinoma in our department

○石田 喬之、比地岡 浩志、吉村 卓也、久米 健一、野添 悦郎、中村 典史

鹿児島大学医学総合研究科先進治療科学専攻 顎顔面機能再建学講座 口腔顎顔面外科学分野

Takayuki Ishida, Hiroshi Hijioka, Takuya Yoshimura, Kenichi Kume, Etsuro Nozoe, Norifumi Nakamura
 Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Field of Oral and Maxillofacial Rehabilitation, Advanced Therapeutics Course, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Kagoshima University

【緒言】当科では 2005 年より口腔癌専門チームを結成し、原発巣再発および頸部リンパ節転移に対して種々の取り組みを行ってきた。今回、これまでの治療成績を評価し今後の治療戦略を検討する目的で、2005 年以降当科で根治療法を行った口腔扁平上皮癌一次症例について臨床統計学的検討を行ったので報告する。【対象】2005 年 10 月から 2014 年 12 月までに当科で手術を含む根治的治療を行った口腔扁平上皮癌患者 157 名を対象とした。【結果】症例は男性 96 名、女性 61 名、年齢は 34 ~ 91 歳 (平均 68.1 歳) であった。原発部位は舌 67 例、下顎歯肉 38 例、上顎歯肉 15 例、口底 19 例、頬粘膜 11 例、その他 7 例 (硬口蓋 4 例、軟口蓋 2 例、口唇 1 例) であった。全生存率は 79.9%、疾患特異的生存率 (DSS) は 89.6% で、予後不良例の内訳は原発再発死 3 例 (1.9%)、頸部リンパ節転移死 6 例 (3.8%)、遠隔転移死 2 例 (1.3%) であった。臨床病期別 DSS は stageI: 95.8%、stageII: 90.6%、stageIII: 92.6%、stageIV: 78.7% であった。浸潤様式別 DSS は YK-2: 100.0%、YK-3: 96.2%、YK-4c: 62.1%、YK-4d: 62.5% であった。【結論】当科の治療成績は、経過観察期間が短い症例を含むものの、緒家の報告と比較し遜色ないものと思われた。予後に影響している因子として浸潤様式が挙げられ、YK-2、3 と比較し YK-4c、4d で有意に予後不良であった (P < 0.01)。今後、これらの症例に対して新たな治療戦略の検討が必要と思われた。

P-9-29

口腔癌頸部リンパ節転移の統計学的な評価方法の検討

Study of statistical evaluation method of oral cancer cervical lymph node metastasis

○小畑 協一、岸本 晃治、藤井 由紀子、矢尾 真弓、志茂 剛、佐々木 朗

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 口腔顎顔面外科学分野

Kyoichi Obata, Kouji Kishimoto, Yukiko Fujii, Mayumi Yao, Tsuyoshi Shimo, Akira Sasaki
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Okayama University Graduate School of Medicine, Dentistry, and Pharmaceutical Science, Okayama, Japan

【緒言】 口腔癌の頸部リンパ節転移の有無は、治療方針に大きな影響を与え、患者の予後に関わる重要な因子である。今回われわれは、口腔癌患者における頸部リンパ節転移の有無を、術前に統計学的に評価する方法を検討したので報告する。**【対象および方法】** 対象は、2008年4月から2014年8月の間で、造影CTとFDG-PET/CTから頸部リンパ節転移を疑い、当科で頸部郭清術を施行した口腔扁平上皮癌89例(リンパ節総数301個)である。方法は、各条件に従い症例を分別したあとに、造影CTやFDG-PET/CTから得られた量的データと、原発部位や年齢といった質的データを抽出し、受信者動作特性曲線(ROC)や判別分析および林の数量化2類を用いて多変量的に解析した。**【結果】** 頸部リンパ節転移に最も影響を及ぼすデータは造影CTでのリンパ節短径値であり、続いてFDG-PET/CTのリンパ節SUVmax値であった。予測率は最も高いもので93.9%(一次症例、頸部郭清術のみ施行)であり、2014年9月以降に当科で治療を行った症例の各値を予測式に代入したところ、統計学的に評価を行うことが可能であった。**【結論】** 多変量的に解析することで、頸部リンパ節転移の有無を、術前に統計学的に評価することが可能であった。

P-9-31

当科における女性口腔扁平上皮癌患者の臨床的検討

Clinical statistical study on oral squamous cell carcinoma in female patients

○鬼谷 薫、森川 貴迪、船越 彩子、右田 雅士、柴原 孝彦
東京歯科大学歯学部 口腔顎顔面外科学講座

Kaoru Onidani, Takamichi Morikawa, Ayako Funakoshi, Masashi Migita, Takahiko Shibahara
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Tokyoku Dental College, Chiba, Japan

【目的】 口腔扁平上皮癌は年々増加傾向にある。口腔扁平上皮癌の臨床的検討を行った報告は散見されるが、女性に関する検討についての報告は少ない。そこで、今回我々は女性口腔扁平上皮癌患者の特徴を明らかにすることを目的として、当科を受診した口腔扁平上皮癌患者を対象に各項目の性差について比較検討を行った。**【対象・方法】** 対象は2005年1月から2014年12月の10年間に当科を受診した口腔扁平上皮癌患者405例とした。調査項目は年齢、観察期間、原発部位、病期分類、飲酒、喫煙、生存率などとし、これらの性差について統計学的検討を行った。**【結果】** 405例中、男性235例(58%)、女性170例(41%)であった。年齢は19-96歳で平均は全体で63.6歳、男性61.8歳、女性63.5歳であり女性が高かった。また観察期間は1.5-120か月で中央値は男性37.2か月、女性43.2か月であった。原発部位は男女とも舌が最も多く性差は見られなかった。病期分類では女性の方が早期例の割合が高かった。さらに飲酒、喫煙者の割合、Sake指数、Brinkman指数は全て女性の方が少なかった。一方、5年全生存率は男性91.9%、女性87.2%で差はなかった。**【考察】** 女性はリスク因子となる飲酒、喫煙の割合が低いが発症時の年齢が高かったため、口腔内の状態悪化や免疫機能、基礎疾患等も因子となっているのではないかと考えた。

P-9-30

口腔扁平上皮癌におけるセンチネルリンパ節生検施行症例の予後に関する臨床的検討

A clinical study of prognosis after sentinel lymph node biopsy in patients with oral squamous cell carcinoma

○真野 隆充、原田 耕志、内田 堅一郎、梅田 浩嗣、三島 克章、上山 吉哉

山口大学大学院医学系研究科 情報解析医学系歯科口腔外科学分野

Takamitsu Mano, Koji Harada, Kenichiro Uchida, Hirotsugu Umeda, Katsuaki Mishima, Yoshiya Ueyama
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Yamaguchi University Graduate School of Medicine, Yamaguchi, Japan

【緒言】 口腔扁平上皮癌において頸部リンパ節転移の有無は大きく予後に影響を及ぼす。転移の判定にはCT、MRI、PET/CT、超音波などが用いられているが、これらを用いても確定が得られない症例も存在する。そのためNO症例のリンパ節転移を診断するためのセンチネルリンパ節(SN)生検が実施されている。今回、われわれはSN生検を施行した症例の予後に関して臨床的検討を行ったので報告する。

【対象および方法】 対象は2004年11月から2015年3月までの間に口腔扁平上皮癌1次症例で臨床的にNO症例に対してSN生検が施行された59例とした。これらの症例において、原発部位、生検後および郭清後の経過等について検討した。

【結果】 性別では男性43例、女性16例で、年齢は35歳から94歳であった。原発巣は舌19例、下顎歯肉19例、口底11例、上顎歯肉5例、頬粘膜5例で、T1が8例、T2が51例であった。SN生検で陽性の症例は14例(23.7%)であった。SN生検陰性症例で後に頸部転移を認めた症例は5例(11.1%)あり、そのうち2例は腫瘍死していた。SN生検陽性症例では反対側の頸部転移が1例あったが、頸部再発はなく、腫瘍死は肺転移の1例のみであった。

【考察】 SN生検施行症例の予後は概ね良好であり、SN生検の有用性が示唆された。ただし、陰性例においても後発頸部転移や遠隔転移がみられることより、SN生検施行症例においても慎重な経過観察が必要である。

P-9-32

舌扁平上皮癌 stage I, II 症例における局所再発に関する臨床的検討

Clinical study on local recurrence of stage I and II tongue squamous cell carcinoma

○山田 浩之、雨宮 剛志、熊谷 賢一、重松 宏昭、中岡 雅典、君塚 幸子、長谷部 充彦、園山 智生、川口 浩司、濱田 良樹
鶴見大学歯学部 口腔顎顔面外科学講座

Hiroyuki Yamada, Tsuyoshi Amemiya, Kenichi Kumagai, Hiroaki Shigematsu, Masanori Nakaoka, Sachiko Kimizuka, Mitsuhiko Hasebe, Tomoo Sonoyama, Koji Kawaguchi, Yoshiki Hamada
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Tsurumi University School of Dental Medicine

目的: 舌扁平上皮癌 Stage I, II 症例における局所再発の特徴を臨床的に検討する。**対象および方法:** 2009年4月から2014年8月までに当科で舌扁平上皮癌(Stage I, II)と診断され、初回手術を行った41症例を対象とした。男性24例、女性17例で平均年齢は60.5歳(28~90歳)であった。経過観察中に画像診断で局所再発と診断された症例を後ろ向きに抽出し臨床的検討を加えた。結果: 局所再発は41例中3例に認められた。3例とも初回手術時の病理組織標本で切除断端は陰性であった。**症例1:** 患者は50歳の女性。舌部分切除後13か月でPET/CTにより下顎骨内側部の局所再発と両側肺転移が確認され、術後17か月で死亡した。**症例2:** 患者は43歳の女性。舌半側切除術および予防的頸部郭清術後10か月でPET/CTにより下顎骨内側部の局所再発と両側肺転移が確認され、術後14か月で死亡した。**症例3:** 患者は72歳の男性。舌半側切除術および予防的頸部郭清術後6か月でPET/CTにより下顎骨内側部に局所再発が認められた。現在セツキシマブ 250mg/m²/週の投与により部分奏功の状態である。**まとめ:** 3例(7.3%)の局所再発が下顎骨内側部に発症し、このうち2例は肺転移を合併していた。茎突舌筋やオートガイ舌筋の走行に一致した部位への再発であったため、筋線に沿ったスキップ病変の存在が強く疑われた。

P-9-33 口腔癌周術期における高蛋白経腸栄養剤を用いた栄養管理の検討
Effect of high protein enteral nutrient for perioperative oral cancer patients

○薄木 崇介、平岡 慎一郎、大倉 正也、古郷 幹彦
大阪大学大学院歯学研究科 顎口腔病態制御学講座

Takasuke Usuki, Shinichiro Hiraoka, Masaya Okura, Mikihiro Kogo
The First Department of Oral and Maxillofacial Surgery, University of Osaka, Osaka, Japan

口腔癌周術期には、術後の経口摂取困難による低栄養状態や体重減少を来すことが多い。近年、周術期の低栄養状態は SSI や、生命予後への関連も報告されており、術後早期の経腸栄養療法の開始が推奨されている。ペプタメン A F は、重度熱傷などの集中治療が必要な重症患者に対して開発された高蛋白製剤である。消化態栄養剤であり、消化吸収に優れるとされるが、口腔癌術後患者への投与報告はなく、投与の安全性や有害事象の有無についても報告がない。当科では、2014 年より口腔癌術後患者に対してペプタメン AF を用いた栄養療法を実施しており、今回投与による有害事象の有無を含めた安全性について検討した。**【対象、方法】** 2014 年 10 月から 2015 年 7 月までに、遊離皮弁移植による再建術を実施した口腔癌切除患者計 14 例。同栄養剤を手術翌日から 5 日目までを経鼻経管を用いて投与した。**【結果、考察】** 投与中止が必要となる下痢等の消化器症状は発症せず、著明な BUN 上昇や、有意な電解質異常も少なかった。栄養学的指標については術後急性期の評価では有意な改善は認めなかったが、4 例にプレアルブミン値の上昇を認めた。**【結語】** ペプタメン AF は、口腔癌術後患者の経腸栄養療法において、有意な有害事象の出現をみとめず、安全に使用することができると考えられた。今後症例を増やし、栄養学的指標の改善を目指した適切な投与量等の検討を重ねる予定である。

P-9-35 stage I、II 口腔扁平上皮癌症例の臨床的検討
A retrospective study of patients with stage I-II oral squamous cell carcinoma

○山口 聡¹、山本 憲幸¹、西川 雅也¹、市村 典久¹、玉利 正之¹、若山 博隆¹、石川 純¹、古江 浩樹²、日比 英晴¹

¹名古屋大学大学院医学系研究科 頭頸部・感覚器外科学講座頭頸面外科学、²小牧市民病院 歯科口腔外科

Satoshi Yamaguchi¹, Noriyuki Yamamoto¹, Masaya Nishikawa¹, Norihisa Ichimura¹, Msayuki Tamari¹, Hirotaka Wakayama¹, Jun Ishikawa¹, Hiroki Furu², Hideharu Hibi¹
¹Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Nagoya University Graduate School of Medicine, ²Oral and Maxillofacial Surgery, Komaki City Hospital

近年、口腔扁平上皮癌の治療成績は向上しつつあるが、早期期であっても再発、後発転移などにより予後不良例を経験する。Stage I、II の早期口腔扁平上皮癌では潜在的なリンパ節転移が予後を規定する因子であることは多数報告されている。今回われわれは、潜在的リンパ節転移に対する臨床的検討を行った。対象：2007 年から 2014 年当科で術前治療を行わなかった Stage I、II 口腔扁平上皮癌一次症例 78 例を対象とした。男性 51 例、女性 27 例、初診時年齢は 27 歳から 95 歳であった。部位別では舌癌 43 例、下顎肉癌 11 例、上顎肉癌 8 例、頬粘膜癌 7 例、口唇癌 1 例、口底癌 7 例、口蓋癌 1 例であった。T 分類では T1：30 例、T2：48 例であった。後発頸部リンパ節転移症例について臨床的検討を行った。結果：Kaplan-Meier 法による 5 年累積生存率は Stage I：88.6%、Stage II：88.6%であった。後発頸部リンパ節転移症例は Stage I：3 例、Stage II：7 例の計 10 例で、5 年累積生存率は 78.8%であった。原発部位別では舌癌が最も多く 7 例であった。後発頸部リンパ節転移症例の原発巣切除標本の病理組織学的特徴として、腫瘍宿主境界部が不明瞭であり、YK 分類でいう YK-3 から YK-4D に相当する浸潤様式を呈していた。結論：病理組織学的に腫瘍宿主境界部が不明瞭な浸潤様式をとる腫瘍は後発リンパ節転移の可能性が高く、一次治療後の注意深い経過観察が必要である。

P-9-34 当科における悪性リンパ腫の臨床病理学的検討
Clinical study of malignant lymphoma in oral and maxillofacial region in our department

○江頭 寿洋¹、大場 誠悟¹、池田 久住¹、池田 通²、朝比奈 泉¹
¹長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 顎口腔再生外科学分野、
²長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 口腔病理学分野

Kazuhiro Egashira¹, Seigo Ohba¹, Hisazumi Ikeda¹, Toru Ikeda², Izumi Asahina¹
¹Department of Regenerative Oral Surgery, Unit of Translational Medicine, Graduate School of Biomedical Sciences, Nagasaki University, Nagasaki, Japan, ²Department of Oral Pathology and Bone Metabolism, Unit of Basic Medical Sciences, Nagasaki University, Nagasaki, Japan

【諸言】 悪性リンパ腫はリンパ球や単球、組織球が腫瘍化しリンパ系組織に発生する悪性腫瘍で、全悪性腫瘍の約 5% を占め本邦では年間約 1 万人に発症する。全身各所のリンパ節に発生するが、特に頭頸部は好発部位とされている。今回我々は過去 22 年間に経験した悪性リンパ腫について検討を行ったので報告する。**【対象・方法】** 1994～2015 年の間に当科を受診し病理組織学的に悪性リンパ腫と診断された 16 症例を対象とした。**【結果】** 悪性リンパ腫と診断された 16 名の患者の男女比は約 2：1、平均年齢は 64.4 歳 (35～95 歳) であった。発症部位は歯肉が最も多く、次いで口蓋、顎下部の順であり、進行度の指標となる乳酸脱水素酵素 (LDH：基準値 119～229) は平均値が 264.4 で、高値を示したのは 7 例であった。初診時の臨床診断は造血系腫瘍とされたものが 2 例で、大半は良性または悪性腫瘍とのみ診断されており、顎骨の炎症と診断されたものが 3 例あった。確定診断後に全例血液内科に転院、化学療法ならびに放射線療法が行われており転院までの平均日数は 19.4 日であった。**【考察】** 近年、悪性リンパ腫は化学療法等の進歩により治療成績が向上しているが、多彩な症状を呈するため初診時診断に苦慮することが多い。病理組織学的検査による診断が必須であり、早期に診断を確定させた上で迅速な血液内科への対診を見極めることが重要であると考えられた。

P-10-1 口腔がん患者への緩和ケアチームの介入状況について
A role of palliative care team for patients with oral cancer at our hospital

○重田 崇至、松井 太輝、赤澤 登
兵庫県立がんセンター 口腔外科

Takashi Shigeta, Taiki Matsui, Noboru Akazawa
Department of Oral and maxillofacial Surgery, Hyogo Cancer Center, Hyogo, Japan

【緒言】 支持療法 (supportive care) とはがんそのものに伴う症状や治療による副作用を予防軽減させる治療のことである。近年支持療法を治療過程の早期に導入することが必要とされ、当科でも緩和ケアチームが介入し治療前後の心理的ストレスを和らげるケアを積極的に行うよう心がけている。当科における緩和ケアチームの介入状況について報告する。**【対象】** 2012 年 1 月～2015 年 9 月に当科で加療した口腔がん患者 143 例のうち緩和ケアチームが介入した 32 例について患者背景、緩和ケアチームの介入時期、介入期間、介入目的等につき retrospective に検討を行った。**【結果】** 患者背景は、男性：20 例、女性：12 例、37 歳～85 歳、病期は Stage1：3 例、Stage2：11 例、Stage3：3 例、Stage4：15 例であった。介入時期は、治療前：1 例、手術前後：20 例 (手術前：12 例、手術後：8 例)、化学放射線療法前後：7 例、終末期：4 例であった。介入目的は心理・精神症状：19 例、不眠：9 例、せん妄：8 例、疼痛：8 例、嘔気：2 例、その他身体症状：2 例、家族ケア：1 例 (重複あり) であった。介入期間は 29 例で治療終了時に介入終了、3 例で治療終了後も継続介入が必要であった。**【結語】** 緩和ケアチームの介入は多くの症例で治療終了までにサポートが終了していた。口腔がん患者は手術による顔貌の変形や機能障害を伴うため、治療後も精神的苦痛が癒えない場合は継続的なサポートを積極的に依頼する必要があると考えられた。

P-10-2

口底癌患者の疼痛コントロールに下顎孔伝達麻酔が有用であった 1 例

A case of the inferior alveolar block injection was useful for the sharp pain control of the mouth floor cancer patient

○大山 定男¹、小川 千晴¹、長谷川 稔洋¹、福田 仁¹、加島 義久¹、山内 智博¹、内田 育宏^{1,2}、吉田 俊一^{1,3}、筋生田 整治⁴、宮下 英高⁴、白田 慎⁴、相馬 智也⁴

¹がん・感染症センター都立駒込病院 歯科口腔外科、²日野市立病院 歯科口腔外科、³独立行政法人国立病院機構霞ヶ浦医療センター 歯科口腔外科、⁴慶應義塾大学医学部 歯科・口腔外科教室

Sadao Ohyama¹, Chiharu Ogawa¹, Toshihiro Hasegawa¹, Jin Fukuda¹, Yoshihisa Kashima¹, Tomohiro Yamauchi¹, Ikuhiro Uchida², Syunichi Yoshida³, Seiji Asoda⁴, Hidetaka Miyashita⁴, Shin Usuda⁴, Tomoya Souma⁴

¹Department of Oral Surgery, Tokyo Metropolitan Cancer and Infectious Diseases Center Komagome Hospital, ²Department of Dentistry and Oral Surgery, Hino Municipal Hospital, ³Department of Dentistry and Oral Surgery, National Hospital Organization Kasumigaura Medical Center, ⁴Department of Dentistry and Oral Surgery, School of Medicine, Keio University

【緒言】口腔癌による癌性疼痛は、口腔機能に影響し QOL の低下につながる。今回われわれは、疼痛コントロールにおいて下顎孔伝達麻酔を用いることで良好な疼痛管理が行え QOL 向上につながった症例を経験したのでその概要を報告する。**【症例および経過】**患者は 57 歳男性。口底部潰瘍および右側頸下部の腫脹を主訴で紹介来院された。初診時に口底の潰瘍部より生検を施行し扁平上皮癌の診断を得たため、全身精査を行ったところ、頸部リンパ節転移と多発肺転移を認めたため、根治治療は困難と診断し、化学療法を行なったが、腫瘍の増悪を認め、顎下リンパ節の増大および、腫瘍の舌への伸展による疼痛が出現した。癌性疼痛に対してオキシコドンを用いたが、舌運動時の疼痛が緩和せず、舌神経をブロックする目的に下顎孔伝達麻酔を施行したところ疼痛緩和を認め、苦痛の軽減を図ることができた。**【考察】**がん性疼痛治療の第一選択は薬物療法であり、WHO 方式がん疼痛治療ガイドラインが広く用いられている。WHO 方式三段階ラダーで鎮痛できない場合に神経ブロックがある。神経ブロックは体動痛にも対応でき、鎮痛剤の減量も可能とする。下顎孔伝達麻酔は、下顎孔に入ると麻酔するため、同時に舌神経も麻酔されるため、舌、口底の疼痛に対して有用であったと考えられた。また、奏功時間も考慮した麻酔薬の選択も行い除痛持続時間についても良好な結果を得た。

P-11-1

舌・口底癌切除後再建症例の嚥下機能の検討

The clinical study on pre and postoperative swallowing function in patients of tongue and/or floor cancer with reconstruction

○井口 達也¹、酒井 克彦²、斎藤 寛一²、中村 智代子³、富田 喜代美³、山内 智博¹、石田 瞭¹、野村 武史²、高野 伸夫³

¹東京歯科大学 口腔健康科学講座摂食嚥下リハビリテーション研究室、²東京歯科大学 オーラルメディシン・口腔外科学講座、³東京歯科大学市川総合病院 リハビリテーション科、⁴がん・感染症センター都立駒込病院、⁵東京歯科大学 口腔がんセンター

Tatsuya Iguchi¹, Katsuhiko Saka², Hirokazu Saito², Chiyoako Nakamura³, Kiyomi Tomita³, Tomohiro Yamauchi¹, Ryo Ishida¹, Takeshi Nomura², Nobuo Takano³

¹Department of Oral Health and Clinical Science, Division of Dysphagia Rehabilitation, Tokyo, Japan, ²Department of Oral Medicine Oral and Maxillofacial surgery, Tokyo Dental College, Tokyo, Japan, ³Department of Physical Medicine and Rehabilitation Ichikawa general hospital Tokyo Dental College, Ichikawa, Chiba, ⁴Department of Oral and Maxillofacial surgery, Tokyo Metropolitan Cancer and Infectious Diseases Center Komagome Hospital, ⁵Oral Cancer Center, Tokyo Dental College, Ichikawa, Chiba

【目的】口腔癌手術後の摂食嚥下障害は、切除部位と切除範囲によって異なっており、切除範囲が広がるほど術後の機能障害も強く生じてくる。近年、広範囲欠損に対する再建術は、著しく進歩し、術後の機能、形態の維持に不可欠なものとなってきた。今回、東京歯科大学口腔がんセンターで加療した口腔癌症例のうち、舌・口底癌再建術施行患者を対象に、嚥下機能に関する臨床的検討を行ったので報告する。**【対象および方法】**2010 年から 2015 年の 6 年間に東京歯科大学口腔がんセンターで、舌・口底癌悪性腫瘍切除で即時再建を行った 37 症例を対象とした。内訳は、男性 31 人、女性 6 人で、平均年齢は 59.6 歳であった。嚥下機能評価として術後の嚥下内視鏡検査ならびに嚥下造影検査、藤島の摂食・嚥下能力のグレード、退院時の経口摂取状況などについて検討した。**【結論】**退院時の経口摂取状況は経口摂取群が 33 例で、経口摂取不可群が 4 例であり、胃瘻造設後に退院となった。藤島の摂食・嚥下能力のグレードは、入院時は 9.5 ± 0.9 であり、退院時には 7.4 ± 1.4 となり数値の低下が認められた。口腔癌切除後の嚥下機能障害は、全て末梢器官の障害であることが特徴で、一つ一つの嚥下器官の喪失、温存の状態を正しく整理して捉えることが再建や術後のリハビリを実施する上で重要であると考えられる。

P-10-3

癌治療に伴う口腔粘膜炎に対する半夏瀉心湯の使用法における検討

Effect of Hangeshashinto on oral mucositis associated with cancer treatment

○山下 裕美、池田 久住、大場 誠悟、白石 剛士、河井 洋祐、川崎 貴子、朝比奈 泉

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 展開医療科学講座顎口腔再生外科学分野

Hiromi Yamashita, Hisazumi Ikeda, Seigo Ohba, Takeshi Shiraiishi, Yosuke Kawai, Takako Kawasaki, Izumi Asahina
Department of Regenerative Oral Surgery, Unit of Translational Medicine, Nagasaki University Graduate School of Biomedical Sciences

口腔粘膜炎は化学療法や放射線療法により発症する有害事象のひとつであり、近年使用頻度が増加している分子標的薬を用いた治療でも認められる。口腔粘膜炎による痛みは、しばしば食事摂取量の低下に伴う全身状態の悪化をもたらす、治療を完遂できなくなることがある。したがって、口腔粘膜炎をコントロールすることは、がん治療を継続させるうえで重要な課題といえる。近年、半夏瀉心湯が口腔粘膜に対して抗炎症作用と抗菌作用などの効果をもつことが明らかにされてきており、口腔粘膜炎の治療薬として注目されている。半夏瀉心湯は 7 つの生薬（半夏、黄芩、乾姜、人参、甘草、大棗、黄連）から構成され、乾姜、黄芩、黄連は、PGE2 の産生を抑制することが基礎研究において確認されている。臨床研究でもこれまでに使用されてきたステロイド軟膏や含嗽剤と比較して鎮痛効果、口腔粘膜炎の改善効果を認めるとして内服、含嗽、直接塗布など様々な使用方法が検討されている。当科においても、癌治療に伴う口腔粘膜炎を発症した患者に対し半夏瀉心湯 1 包（7.5g）を白湯約 50ml に溶解し含嗽薬として使用したが、漢方薬独特の味を受容することが難しく、また高齢な患者では毎食後、顆粒を溶解させ含嗽剤を準備することが難しく効果を認める前に中断する症例が多かった。そこで簡便な方法で使用でき含嗽可能な濃度を検討した結果、有効な使用方法が得られたので報告する。

P-12-1

舌表在癌はエコーで描出できるか

Can ultrasound detect superficial tongue cancer?

○八木原 一博¹、石井 純一¹、桂野 美貴¹、土田 絵梨¹、石川 文隆²、柳下 寿郎²、岡田 茂治³、大滝 加奈江³

¹埼玉県立がんセンター 口腔外科、²埼玉県立がんセンター 病理診断科、³埼玉県立がんセンター 臨床検査部

Kazuhiro Yagihara¹, Junichi Ishii¹, Miki Katsurano¹, Eri Tsuchida¹, Ayataka Ishikawa², Hisao Yagishita², Shigeharu Okada³, Kanae Ootaki³

¹Department of Oral Surgery, Saitama Cancer Center, ²Department of Pathology, Saitama Cancer Center, ³Department of clinical laboratory, Saitama Cancer Center

【目的】舌表在癌は、病理組織学的に口腔上皮内腫瘍 (OIN、2010 年口腔癌取扱規約) および SM 癌を示す。臨床的には硬結がなく腫瘍の厚さが少ない病変とわれわれは認識しているが、客観性に欠ける。厚さの客観的診断には、エコー検査が有用である。今回、舌表在癌に対する舌エコー検査の有用性を検討した。

【対象・方法】対象は 2012 年 7 月から 2015 年 9 月までに埼玉県立がんセンター口腔外科を受診し、術中に舌エコー検査を併用し切除した扁平上皮癌 20 例である。内訳は男性 9 例、女性 11 例、年齢は 32-80 歳 (平均 63 歳)、腫瘍の大きさは 2cm 以下 12 例、2cm 超 8 例であり、B モードを中心に腫瘍が低エコーとして描出可能か評価した。また、食道癌取扱規約における表在癌の深達度分類に準じて分類、評価した。

【結果】B モードで、低エコーとして描出できた症例は 20 例中 13 例であった。また、描出できた症例の低エコーの厚さは 0.9 ~ 4.6mm (平均 2.0mm) であった。食道表在癌の深達度 5 亜分類のうち、B モードで腫瘍が描出できたものは 0-I (表在隆起型) 3/3 例、0-IIa (表面隆起型) 4/4 例、0-IIb (表面平坦型) 1/7 例、0-IIc (表面陥凹型) 5/6 例であり、0-III (表在陥凹型) 症例はなかった。

【結論】舌エコー検査は、食道表在癌の深達度分類のうち 0-IIb 病変以外は描出され、深部方向の腫瘍進展の評価に有用である。

P-12-2

パノラマ X線写真の異常所見から判明した顎関節部への転移性腫瘍の2例

Two cases of the metastatic tumor to temporomandibular joint which were revealed by the abnormal finding in the pantomography

○村山 敦¹、西岡 稔浩¹、吉川 恭平¹、松本 憲^{1,2}、山口 智之³、滝原 浩守⁴

¹岸和田徳洲会病院 口腔外科、²大阪大学大学院歯学研究科、³岸和田徳洲会病院 外科、⁴岸和田徳洲会病院 消化器内科

Atsushi Murayama¹, Toshihiro Nishioka¹, Kyohei Yoshikawa¹, Ken Matsumoto^{1,2}, Tomoyuki Yamaguchi³, Hiroshi Takihara⁴
¹Department of Oral and Maxillofacial Surgery, KISHIWADA TOKUSHUKAI Hospital, Osaka, Japan, ²Osaka University Graduate School of Dentistry, ³Department of Surgery, KISHIWADA TOKUSHUKAI Hospital, Osaka, Japan, ⁴Department of Gastroenterological Medicine, KISHIWADA TOKUSHUKAI Hospital, Osaka, Japan

顎口腔領域への転移性腫瘍は、予後不良とされる。パノラマで顎関節突起周囲の異常所見を認め全身検索したところ、多発性の転移性腫瘍が判明した症例を経験したので、その概要を報告する。症例1：79歳男性。15年前に胃癌の既往。肝細胞癌破裂で1年前より当院で複数回TACE施行し、経口抗癌剤投与中。開口時の下顎右側偏位を主訴に当科院内紹介。パノラマで右側顎関節突起の消失を認めた。CTで精査したところ右側顎関節突起を取り囲み外側翼突筋等に浸潤した腫瘍性病変を認めた。PET-CTでは右側顎関節周囲や大腿骨等にFDGの集積を認めた。現行の化学療法を続行したが、3ヶ月後に自宅でCPAとなり死亡。症例2：71歳男性。8年前に大腸癌の既往。左側耳下腺腫脹を主訴に当科紹介受診。パノラマで左側下顎関節突起基部の骨梁パターンが右と比較して僅かに不明瞭であった。CTで精査したところ左側下顎頭から顎関節突起部の骨破壊像、造影CTで顎関節周囲に内部不均一な腫瘍性病変を認めた。PET-CTで左側顎関節周囲と左側肺上葉や肋骨、右側肩甲骨、他多数の部位にFDGの集積を認めた。顎関節のFNAはclass Vであり、肩甲骨の転移巣に対しCTガイド下穿刺生検を行ったところ、大腸癌の後発転移が判明。その後化学療法施行したが、3ヶ月後に自宅で急変し呼吸不全で死亡。臨床所見と併せて、パノラマで通常起こりえない部位での異常な骨吸収像を認めた場合、転移性腫瘍も念頭において全身検索が必要と思われる。

P-12-4

他科でのPET/CT検査にて口腔内に異常集積がみられ精査依頼を受けた2例

2 cases which were consulted from medical department, because abnormal accumulation in oral cavity was judged by PET/CT examination

○上原 忍¹、櫻井 伸一¹、鎌田 孝広²、栗田 浩²

¹篠ノ井総合病院 歯科口腔外科、²信州大学医学部 歯科口腔外科学講座

Shinobu Uehara¹, Sinichi Sakurai¹, Takahiro Kamata², Hiroshi Kurita²
¹Department of Dentistry and Oral Surgery, Shinonoi General Hospital, ²Department of Dentistry and Oral Surgery, Shinshu University School of Medicine

PET/CT検査は癌の病期決定、効果判定、再発転移診断に際し重要な画像検査の一つである。しかし、癌以外でもFDGの取り込みが多い部分では集積像が見られる。今回われわれは、他科で悪性腫瘍診断に行われたPET/CT検査にて、口腔領域に異常集積像が見られ精査依頼を受けた2例について報告する。症例1 64歳女性。主訴：右乳癌術後経過観察のPET/CT検査にて、右下顎骨の異常集積を指摘された。既往歴：C型肝炎、高血圧症、右乳がん(pT1N0M0)術後5年6か月。現病歴：特記事項なし。現症：右下顎肉内に発赤や腫脹なし。PET/CT画像：右胸壁や腋窩に集積像なく、転移病巣なし。右下顎体部のみに異常集積像あり。パノラマX線・CT所見：右下8水平埋伏歯の歯根周囲に母指頭大の境界明瞭な楕円形の透過像を認めた。臨床診断：右下顎嚢胞、右下8水平埋伏歯。経過：確定診断のため生検を施行し病理組織学的診断は肉芽組織で悪性所見はなかった。症例2 79歳男性。主訴：肝細胞癌疑いのPET/CT検査にて、右舌への異常集積を指摘された。既往歴：高血圧症、C型肝炎 肝細胞癌の疑い。現病歴：特記事項なし。現症：舌に異常所見なし。右上6番口蓋歯肉に軽度発赤あり。PET/CT所見：右舌縁に12×17mmの異常集積(SUV 5.89)の集積を認める。パノラマX線所見：右上下大臼歯部に軽度歯槽骨吸収を認める。臨床診断：右舌癌の疑い。経過：3か月間経過観察し、舌に異常所見を認めていない。

P-12-3

慢性硬化性顎下腺炎を合併した口底癌の1例

A case of oral floor carcinoma with chronic sclerosing sialadenitis of submandibular gland

○立石 善久、清水 基之、板敷 康隆、原 慎吾、立本 行宏
 高知医療センター 歯科口腔外科

Yoshihisa Tateishi, Motoyuki Shimizu, Yasutaka Itashiki, Shingo Hara, Yukihiko Tatemoto
 Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Kochi Medical Center

癌原発巣の進展範囲は触診および画像である程度正確に診断可能であるが、その周囲に炎症組織が存在した場合には診断困難となる。今回我々は、慢性硬化性顎下腺炎を合併した口底癌の治療に際して、原発巣の進展範囲の把握に苦慮した症例を経験したので、その概要を報告する。患者は61歳女性で、2014年6月頃より左側顎下部の腫瘍を認めていた。経過観察を行うも、増大傾向を認めたため、7月1日当科紹介となった。初診時、左側顎下部に弾性硬い腫瘍を触知した。左側口底部後方に表面乳頭状の有茎性腫瘍が認められ、左側口底、舌根および咽頭側壁にかけて硬結を伴っていた。CTでは左側顎下腺の腫大および内部の造影効果は不均一で径19mm×10mmの石灰化を伴っていた。MRIにて原発巣は顎下腺への浸潤が疑われ、顎下腺被膜は不明瞭であった。左側口底部腫瘍の生検にて扁平上皮癌との診断が得られたことより、口底癌(T4aN2bM0)に対してCDDPによる動注化学療法を計3回(360mg)および放射線照射(40Gy)を行った後、2014年11月に全身麻酔下にて気管切開術、頸部郭清術、腫瘍切除術、チタンプレートおよび大胸筋皮弁による再建術を施行した。術前の画像所見より顎下腺周囲皮下への浸潤が疑われたことより、顎下部皮膚の合併切除を行ったが、摘出標本の病理組織にて顎下腺および顎下腺周囲に腫瘍細胞は認められず、慢性炎症の組織像であった。

P-12-5

術前18F-FDG PET/CT撮影での口腔癌原発巣における定量評価の有用性

Prognostic value of pretreatment 18F-FDG PET/CT volume-based parameters in primary oral squamous cell carcinoma

○米澤 奈津季¹、南川 勉¹、北島 一宏²、高橋 佑輔¹、
 寛 康正¹、榊原 晶子¹、長谷川 巧実¹、明石 昌也¹、
 古森 孝英¹

¹神戸大学大学院医学研究科 外科系講座口腔外科学分野、
²兵庫医科大学 放射線医療センター 核医学・PET診療部

Natsuki Yonezawa¹, Tsutomu Minamikawa¹, Kazuhiro Kitajima², Yusuke Takahashi¹, Yasumasa Kakei¹, Akiko Sakakibara¹, Takumi Hasegawa¹, Masaya Akashi¹, Takahide Komori¹
¹Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Kobe University Graduate School of Medicine, Kobe, Japan, ²Department of Nuclear Medicine and PET center, Hyogo College of Medicine, Hyogo, Japan

【緒言】癌患者における術前18F-FDG PET/CT撮影の有用性については多くの報告がある。FDGの集積の指標は主にSUV maxが用いられるが、予後予測については一定の見解が得られていない。今回われわれは、口腔癌患者の術前PET/CT画像から3次元的なmetabolic tumor volume (MTV)およびtotal lesion glycolysis (TLG)を算出し、これらの意義および有用性について、後方視的に検討したので報告する。
 【対象および方法】対象は2011年から2014年に当院を受診しPET/CT撮影後に手術を施行した口腔癌患者40例で、原発巣の内訳は舌：21例、歯肉：13例、口底：6例、年齢は22～86歳、病期はStage-II：23例、Stage-III-IV：17例であった。原発巣のSUV max、MTV、TLGと病理組織学的な予後予測因子や再発との関連について解析した。
 【結果】MTV、TLGはpT、pNと強い相関関係を認めたが、分化度やYK分類との相関は認めなかった。log rank検定の結果、DSSではTLGで有意差を認め(p<0.05)、DFSではMTV、TLGで有意差を認めた(p<0.05)。
 【結論】口腔癌患者において術前PET/CT撮影での定量評価は、予後予測に有用であることが示唆された。

P-12-6

口腔癌に対する FDG-PET/CT 検査と臨床病理学的因子との関連についての検討

A clinical analysis of FDG-PET/CT on patients with oral cancer

○小林 淳一、宮崎 晃巨、金子 剛、岡本 準也、出張 裕也、荻 和弘、中垣 貴文、宮本 昇、中井 裕美、平塚 博義
札幌医科大学医学部 口腔外科学講座

Jun-ichi Kobayashi, Akihiro Miyazaki, Tsuyoshi Kaneko, Jun-ya Okamoto, Hironari Dehari, Kazuhiro Ogi, Takafumi Nakagaki, Shou Miyamoto, Hiromi Nakai, Hiroyoshi Hiratsuka
Department of Oral Surgery, Sapporo Medical University School of Medicine

【目的】悪性腫瘍は一般に糖代謝が亢進しており、FDG を強く集積するものが多いため、FDG-PET/CT は種々の癌腫において病期診断や転移リンパ節検出の診断に用いられている。特に口腔癌においては扁平上皮癌が多く、FDG の高集積を示すため病期診断、転移、再発診断に有用である。FDG-PET/CT は CT や MRI などと異なって病変の形態や大きさではなく、代謝活性に基づいて診断するので、CT や MRI よりも高い診断精度を示すと考えられる。今回、口腔扁平上皮癌における FDG-PET/CT の有用性と臨床病理学的因子との関連を検討した。【対象・方法】2010 年 1 月から 2013 年 12 月までの期間に治療前に FDG-PET / CT 検査を行った口腔扁平上皮癌一次症例 43 例（年齢中央値 71.6 歳、男性 24 女性 19）を対象とした。Stage 分類別では Stage I: 10 例、Stage II: 8 例、Stage III: 8 例、Stage IV: 17 例であった。病理組織診断をもとに pN+ ; 21 例と pN0 あるいは cN 0（頸部郭清未施行例）; 22 例に分類し、FDG-PET/CT の頸部リンパ節転移の診断精度を治療前の造影 CT、US、MRI と比較検討し、分化度、浸潤様式との関連について検討した。【結果】PET/CT の正診率は 97.7% で CT、MRI、US を上回る正診率であった。腫瘍死症例の原発巣 SUV max は全例 10 以上であった。【結論】PET/CT は CT、MRI、US と比較して高い正診率を有していることから術前頸部転移診断において重要な画像検査であることが示唆された。

P-12-8

口腔癌患者に対する術前の頸動脈エコー検査についての検討

Evaluation of preoperative carotid ultrasonography for oral cancer patients

○西原 良治¹、土屋 欣之¹、渡辺 秀紀²、土肥 昭博²、山下 雅子¹、大谷津 幸生¹、岡田 成生¹、早坂 純一¹、野口 忠秀¹、神部 芳則¹、森 良之¹

¹ 自治医科大学医学部 歯科口腔外科学講座、

² 自治医科大学附属さいたま医療センター

Ryoji Nishihara¹, Yoshiyuki Tsuchiya¹, Hideki Watanabe², Akihiro Dohi², Masako Yamashita¹, Yukio Oyatsu¹, Naruo Okada¹, Junichi Hayasaka¹, Tadahide Noguchi¹, Yoshinori Jinbu¹, Yoshiyuki Mori¹

¹Department of Dentistry, Oral and Maxillofacial Surgery, Jichi Medical University, Tochigi, Japan, ²Department of Dentistry, Oral and Maxillofacial Surgery, Saitama Medical Center, Jichi Medical University, Saitama, Japan

今回われわれは、1) 硬化性病変の評価による術後の脳血管系の合併症の予防、2) 頸部郭清術や再建を伴う手術の際には頸動脈の評価の目的に口腔癌患者に対して、術前に頸動脈エコー検査を行い、その結果について検討したので報告する。【対象・方法】対象は 2009 年 10 月から 2013 年 12 月までに当科にて手術施行した口腔癌患者のうち、術前に頸動脈エコー検査を行った 106 例である。男性 59 例、女性 47 例で、年齢は 19 歳～92 歳の平均 65.3 歳。方法は日立アロカメディカル社製 Prosound α-1 0 を用いて計測し、NASCET 法にて狭窄率を算出した。【結果】106 例のうち 9 例において頸動脈の狭窄または閉塞を認めた。男性 7 人、女性 2 人、平均年齢は 72.9 歳、既往歴は脳梗塞 2 例、心筋梗塞 2 例、両側頸動脈狭窄症 1 例、徐脈頻脈症候群が 1 例で、この 6 例中 4 例では抗血栓療法を実施していた。また 9 例中 4 例においては狭窄を認めた頸部に他疾患にて放射線照射歴があり、内 2 例において 90% の高度な狭窄と完全閉塞を認めた。9 例中 8 例については術後合併症無く経過したが、内 1 例については術後に狭窄部位を原因とした脳梗塞の発症を認めた。【考察】術前に頸動脈エコーにより血管の硬化性病変の評価を行いリスク患者に対して必要に応じて抗血栓療法等の術前処置を行うことは、術後の脳梗塞などの塞栓症の予防となる可能性があると考えられた。

P-12-7

びまん性硬化性骨髄炎との鑑別が困難であった顎骨中心性癌の 1 例

A case of the central carcinoma of jaw which had difficulty in differentiation with diffuse sclerosing osteomyelitis

○秦 浩信¹、佐藤 明¹、浅香 卓哉¹、宮腰 昌明¹、吉川 和人¹、黒嶋 雄志¹、北村 哲也³、林 利彦⁴、箕輪 和行²、進藤 正信³、北川 善政¹

¹ 北海道大学 口腔診断内科学、² 北海道大学 歯科放射線科、

³ 北海道大学 口腔病理病態学、⁴ 北海道大学 形成外科

Hironobu Hata¹, Akira Sato¹, Takuya Asaka¹, Masaaki Miyakoshi¹, Kazuhiro Yoshikawa¹, Takeshi Kuroshima¹, Tetsuya Kitamura², Toshihiko Hayashi⁴, Kazuyuki Minowa², Masanobu Shindou³, Yoshimasa Kitagawa¹

¹Oral diagnosis and oral medicine school of dental medicine Hokkaido University, ²Dental Radiology school of dental medicine Hokkaido University, ³Oral Pathology and Biology school of dental medicine Hokkaido University, ⁴Department of Plastic and Reconstructive Surgery School of Medicine Hokkaido University

【緒言】びまん性硬化性骨髄炎 (DSO) との鑑別が困難であった顎骨中心性癌の 1 例を経験したので報告する。【症例】63 歳女性。2015 年 4 月より右下顎の腫脹と疼痛を認め、近歯科医院で抗菌薬による消炎を受けたも著変なく、5 月頃より右下顎の麻痺も自覚したため他院口腔外科受診。下顎骨骨髄炎の診断下に外科消炎を勧められたが希望されず、同月末当科初診。血液検査の結果炎症所見は乏しく、CT、MRI で右下顎骨に軽度の骨膨脹性変化を伴う硬化性変化を認め、びまん性硬化性骨髄炎 (DSO) が疑われた。7 月に PET-CT および骨シンチグラフィを撮像したところ、ともに右下顎骨への強い集積を認め、やはり骨髄炎の診断であった。DSO の診断下に BP 製剤の投与を予定し、8 月中旬に根尖病巣を認めた。右下顎大臼歯を抜歯し抜歯窩の肉芽組織と周囲骨の病理組織生検を施行したところ、扁平上皮癌の病理診断を得た。CT を撮像したところ、右下顎骨周囲に軟組織進展と骨膜反応がみられ、骨髄の硬化性変化内に骨融解性変化と下顎管の破壊を認めた。さらに右咬筋、内・外側翼突筋、側頭筋内に軟組織浸潤を認めた。顎骨中心性扁平上皮癌の診断の下、9 月某日に気管切開、右全頸部郭清、右下顎半側切除、骨頭付きチタンプレートと腹直筋皮弁による再建を施行した。10 月より術後追加治療を施行し、現在経過観察中である。

P-12-9

MRI による胸管描出がリンパ管結紮に有用であった頸部郭清術後乳び漏の 1 例

A case of successful treatment with Magnetic Resonance Imaging for chyle leakage after neck dissection

○林 宏栄、早坂 純一、仁保 千秋、大田原 宏美、作山 葵、渡辺 秀紀、岡田 成生、野口 忠秀、神部 芳則、森 良之
自治医科大学医学部 歯科口腔外科学講座

Hirosaka Hayashi, Junichi Hayasaka, Chiaki Niho, Hiromi Otawara, Aoi Sakuyama, Hideki Watanabe, Naruo Okada, Tadahide Noguchi, Yoshinori Jinbu, Yoshiyuki Mori
Dept. of OMS, Jichi Medical Univ., Tochigi, Japan

【緒言】乳び漏は頸部郭清術後の合併症の一つとして知られているが、その発生頻度は比較的低い。しかし、ひとたび生じると体液組成異常をはじめ電解質異常や栄養障害・免疫障害を引き起こし、患者の入院期間を延長させる重篤な合併症である。今回われわれは口底癌患者の頸部郭清術後に乳び漏を生じ、MRI を用いて胸管の走行と漏出部位を同定しリンパ管結紮を行った症例を経験したのでその概要を報告する。【症例】74 歳、男性。初診：2015 年 7 月、既往歴：高血圧症・前立腺肥大症・高脂血症、主訴：口底部の潰瘍、現症：口底部に 20 × 20mm 大の潰瘍を認め易出血性であった。【処置及び経過】口底部扁平上皮癌 (cT2N2cM0) の診断で 8 月初旬に全身麻酔下で気管切開術・両側頸部郭清術・口底部悪性腫瘍切除術・左腹直筋皮弁による口底部再建を施行。術後 3 日目に左頸部の乳び漏を認めた。ソマトスタチンアナログの投与・局所圧迫などの保存的治療を継続するも改善せず、術後 28 日目に全身麻酔下でリンパ管結紮を行った。再手術前に MRI を施行し胸管の走行と漏出部位を確認した。乳びの漏出部位は MRI の所見と一致しておりリンパ管の結紮に有用であった。術後経過は良好で乳び漏の再発を認めなかった。

P-13-1

口腔扁平上皮癌における神経周囲浸潤の分析
A study of perineural invasion in oral squamous cell carcinoma

○土屋 欣之、野口 忠秀、小澤 通子、山下 雅子、大谷津 幸生、岡田 成生、早坂 純一、神部 芳則、森 良之
自治医科大学医学部 歯科口腔外科学講座

Yoshiyuki Tsuchiya, Tadahide Noguchi, Michiko Ozawa, Masako Yamashita, Yukio Ouyatsu, Naruo Okada, Junichi Hayasaka, Yoshinori Jinbu, Yoshiyuki Mori
Department of Dentistry, Oral and Maxillofacial Surgery, Jichi Medical University

口腔扁平上皮癌における神経周囲浸潤（以下PNI）は、局所再発のリスク因子として認識されている。【目的】当科にて、口腔扁平上皮癌患者の一次治療を行い、病理医がHE染色にてPNIの有無の確認を行った症例の予後について分析を行った。【対象および方法】2008年1月から2013年9月までに口腔扁平上皮癌と診断され当科にて一次治療を行い、患病理医がPNIの有無の確認し、2年以上の予後評価を行った181症例であった。PNI症例は、32例で17.7%であった。【結果】症例の構成は、男性19例、女性13例。年齢は25～86歳で平均63.6歳。原発部位は舌が最も多く17例。Stage分類では、StageIVAが13例と最も多かった。PNI症例の予後は、腫瘍死が15例、無病生存が13例、他病死が4例であった。疾患特異的2年生存率は53%であった。また、非PNI症例の予後は、疾患特異的2年生存率では92%であり、PNI症例の生存率は有意に低かった。また、PNI症例で予後不良症例は、13例が原発巣再発非制御、1例が頸部リンパ節転移非制御、1例が遠隔転移非制御であった。PNI症例で腫瘍死した15例中9例は術後放射線療法が行われていたが、局所制御不能であった。【結論】PNI症例は局所再発および生命予後の重要なリスク因子であった。PNI症例は放射線治療に抵抗性であり、新たな術後補助療法の検討が必要と思われる。

P-13-3

歯原性嚢胞からの発生が考えられた原発性上顎中心性癌の1例
The case of Primary intraosseous squamous cell carcinoma arising in a odontogenic cyst

○濱田 裕嗣¹、別所 央城²、前山 恵里¹、大野 啓介¹、高野 正行¹、齊藤 力¹、片倉 朗²、柴原 孝彦¹、松坂 賢一³、市川 雄二⁴、高橋 光⁴

¹東京歯科大学 口腔顎顔面外科学講座、²東京歯科大学 口腔病態外科学講座、³東京歯科大学 臨床検査病理学講座、⁴東京都保健医療公社豊島病院 歯科口腔外科

Yuji Hamada¹, Hiroki Bessyo², Eri Maeyama¹, Keisuke Ohno¹, Masayuki Takanosaito¹, Chikara Saito¹, Akira Katakura², Takaniko Shibahara¹, Kenichi Matsuzaka³, Yuji Ichikawa⁴, Hikaru Takahashi⁴
¹Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Tokyo Dental College, Tokyo, Japan, ²Department of Oral and Pathobiological science and Surgery, Tokyo Dental College, ³Department of Clinical Pathophysiology, Tokyo Dental College, ⁴Department of Dentistry and Oral Surgery, Tokyo Metropolitan Health and Medical Corporation Toshima Hospital

【緒言】顎口腔領域における癌腫は被覆口腔粘膜上皮に原発することが多い。今回われわれは、歯原性嚢胞から発生したと考えられた原発性上顎中心性癌の1例を経験したのでその概要を報告する。【症例】患者は59歳、男性。既往歴は、高血圧症、高尿酸血症、脂質異常症。鼻閉感を主訴に近医耳鼻咽喉科受診し、歯科疾患の可能性を指摘されたため紹介医を受診した。初診時口腔内所見は、右側上顎第二小臼歯相当部粘膜に正常粘膜肉の一部骨内への陥凹を認めた。パノラマエックス線写真、CTを撮影したところ上顎右側に2本の埋伏歯とその歯冠周囲に境界明瞭な嚢胞様透過像を認め、さらにその周囲骨に境界不明瞭で粗造な骨吸収所見を認めた。【処置・経過】生検の結果、扁平上皮癌との診断を得た。その後治療目的に当科紹介受診し、上顎右側部分切除術および右側肩甲骨骨筋上頸部郭清術を施行した。病理検査結果では、上顎骨切除部に埋伏歯とその周囲に嚢胞構造がみられ、濃染した巨大な核を有する腫瘍細胞の結合織組織内への浸潤を認めた。内部では腫瘍嚢胞を形成しており、扁平上皮癌の所見であった。病理組織検査では、口腔粘膜上皮や上顎洞粘膜上皮と明確な連続性は認めず、歯原性嚢胞より発生したものと考えられた。現在のところ再発、転移等認めず、経過良好である。【結論】この症例を経験し、歯原性嚢胞から悪性腫瘍が発生する可能性も考慮すべきであると考えられた。

P-13-2

NPRAは舌扁平上皮癌においてVEGF-A、VEGF-Cと関連して浸潤・転移に関与する
NPRA expression is associated with tumor invasion and metastasis potential, involving with VEGF-A and -C expression, in oral tongue squamous cell carcinoma

○山田 慎一¹、柳本 惣市²、中尾 祐仁²、今山 直美²、鳴瀬 智史²、松下 祐樹²、六反田 賢²、梅田 正博²、栗田 浩¹

¹信州大学医学部 歯科口腔外科学教室、
²長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 口腔腫瘍治療学分野

Shin-ichi Yamada¹, Souichi Yanamoto², Yuji Nakao², Naomi Imayama², Tomofumi Naruse², Yuki Matsushita², Satoshi Rokutanda², Umeda Masahiro², Hiroshi Kurita¹

¹Department of Dentistry and Oral Surgery, Shinshu University School of Medicine, Matsumoto, Japan, ²Department of Clinical Oral Oncology, Nagasaki University Graduate School of Biomedical Sciences Nagasaki, Japan

【目的】ナトリウム利尿ペプチド受容体の一つであるNPRA(natriuretic peptide receptor-A)は、心房性ナトリウムペプチドと結合しcGMP依存性に細胞の増殖に関与するとされているが、悪性腫瘍での発現意義の関する報告は少ない。本研究では舌扁平上皮癌におけるNPRAの発現と臨床病理学的因子との関連を検討し、その特性を明らかにすることを目的とした。【材料および方法】舌扁平上皮癌57例の生検時標本および正常口腔粘膜症例10例を用い、抗ヒトNPRA抗体で免疫組織化学染色を行った。NPRAの発現と臨床病理学的因子、予後との関連を検討した。【結果】NPRAの過剰発現は舌癌組織に有意に発現し浸潤様式、局所再発、後発転移との間に有意な相関がみられた。リンパ節転移にも関与する傾向がみられた。また、VEGF-A、VEGF-Cの発現との間にも有意な相関がみられた。NPRA過剰発現症例では疾患特異的生存率が有意に低下し予後不良となる傾向がみられNPRA過剰発現症例群の5年疾患特異的生存率は42.6%であった。【結論】NPRAは舌扁平上皮癌において癌細胞浸潤に関与しており、局所再発、後発転移との関連が示唆され有意な予後因子となり得る可能性が示唆された。NPRAの発現はVEGFに発現とも関連し、舌扁平上皮癌細胞の細胞生物学的特徴に影響を及ぼす可能性が示唆された。

P-13-4

生検でsclerosing odontogenic carcinoma (SOC)が疑われた下顎clear cell odontogenic carcinoma(CCOC)の一例
Clear cell odontogenic carcinoma(CCOC) of the mandible: suspicious of sclerosing odontogenic carcinoma (SOC) by biopsy

草深 公秀
静岡県立静岡がんセンター 理診断科

Kimihide Kusafuka
Pathology Division, Shizuoka Cancer Center

【背景】硬化性歯原性癌(SOC)は近年Koutlasらによって報告された極めて稀な歯原性悪性腫瘍である。また、歯原性明細胞癌(CCOC)も稀な歯原性悪性腫瘍である。両者の関係についての詳細は解明されていない。今回、生検でSOCを疑ったCCOCを経験した。【症例】64歳、男性。主訴は下顎前歯の動揺。20XX年6月頃、上記主訴にて、近医歯科で、同年8月ブリッジ装着。翌年2月検診にて、パノラマで下顎正中部に骨透過像を指摘され、翌月、当院歯科口腔外科を受診。CT:下顎骨正中部に境界明瞭な骨皮質の欠損と充実性腫瘍を疑う像あり。生検では線維性間質に樹枝状の上皮の増殖を認め、SOC疑いと診断。MRIでも下顎骨正中～右側に12x23x19mmの境界明瞭な腫瘍で、T1で等信号、T2で高信号に造影される。4月に当院頭頸部外科受診。PETでもリンパ節転移や遠隔転移なし。6月に下顎区域切除。術後3ヶ月では再発・転移はない。【病理】歯肉表面には潰瘍などは無い。腫瘍は多角形の淡明な異型上皮細胞が胞巣状～シート状の増殖しており、一部は好酸性の顆粒細胞も混在する。間質は線維性で、骨浸潤あり。腫瘍細胞はPAS陽性のglycogenを含み、免疫染色ではAE-1/3, CK5/6やp63が瀰漫性に陽性で、Ki-67標識率は10%程度。【まとめ】以上よりCCOCと最終診断した。CCOCは、局所再発以外にも時に遠隔転移を起こす歯原性癌腫である。また、CCOCは稀に樹枝状の形態を示すことからSOCと近縁の疾患かもしれない。

P-13-5

生検時、唾液導管癌と診断された HER2 陽性唾液腺癌の 1 例
HER2 positive salivary gland tumor initially diagnosed as salivary duct carcinoma

○佐藤 健彦¹、高野 昌士¹、黒嶋 雄志²、和田 麻友美¹、
牧野 修治郎¹

¹ 社会医療法人北斗 北斗病院歯科口腔外科、
² 北海道大学大学院歯学研究所 口腔病態学講座口腔診断内科学

Takehiko Sato¹, Masashi Takano¹, Takeshi Kuroshima², Mayumi Wada¹, Shujiro Makino¹
¹Oral Surgery, Hokuto Hospital, ²Department of Oral medicine and diagnosis, Hokkaido University, Graduate School of Dental Medicine

唾液腺腫瘍は、多彩な組織像を呈することを大きな特徴としていることから病理組織診断に苦慮することが多く、治療方針の決定に慎重な対応を要する。なかでも唾液導管癌においてヒト上皮増殖因子受容体 2 (HER2) の陽性率が他の唾液腺癌に比して高いとの報告があり、その発現解析が診断に寄与する可能性が示されている。今回、生検時に HER2 陽性所見を認め唾液導管癌と診断された症例を経験したので検討を追加して報告する。症例は 79 歳男性。2014 年 6 月頃より左頬部に腫脹を自覚し、9 月上旬に自意にて当科受診。初診時、顔面神経麻痺を認めず、左耳下腺開口部やや頭側の頬粘膜下に可動性に乏しい弾性硬でやや不整形の腫瘍性病変を触知した。CT, MRI にて、左頬粘膜下から上顎骨に沿って辺縁不整な腫瘍を認めた。生検では炎症による筋線維の変性と診断されたが外来経過観察後も著変なく、受診 2 か月後に再生検を行ったところ唾液腺導管癌の診断となった。メチオニン-PET で病変に集積を認めたが、頸部リンパ節、遠隔臓器に集積を認めなかった。同年 12 月に頬粘膜腫瘍切除(上顎骨合併切除)、肩甲骨骨筋上郭清、前外側大腿皮弁による口腔再建実施。術後 1 か月より放射線治療 (56Gy/28Fr) 実施した。術後 2 か月目から TS-1 内服を開始し、現在外来経過観察中であるが、再発や遠隔転移の所見は認めない。

P-13-7

口腔扁平上皮癌被膜外浸潤症例の臨床病理学的検討
Clinicopathological study of extracapsular spread of oral squamous cell carcinoma

○寛 康正、南川 勉、寺岡 駿、米澤 奈津季、高橋 佑輔、
長谷川 巧実、明石 昌也、古森 孝英

神戸大学大学院医学研究科外科系講座 口腔外科学分野

Yasumasa Kakei, Tsutomu Minamikawa, Syun Teraoka, Natsuki Yonezawa, Yusuke Takahashi, Takumi Hasegawa, Masaya Akashi, Takahide Komori
The Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Kobe University Graduate School of Medicine, Kobe, Japan

【緒言】現在、口腔癌の予後予測因子として頸部転移リンパ節の有無などが報告されている。中でも被膜外浸潤の有無は術後再発リスクとされているが被膜外浸潤陽性症例に局限して詳細な検討を行った報告は希少である。そこで今回我々は被膜外浸潤陽性症例の中で、さらに予後不良に関連する因子を検討したので報告する。【対象】当科において 1999 年から 2014 年までに口腔癌のリンパ節転移に対し頸部郭清術を行い、病理組織学的に 1 つ以上のリンパ節で被膜外浸潤を認めた 74 例である。転移リンパ節の個数・レベル・大きさ・原発巣の YK 分類、放射線治療の有無などについて後ろ向きに調査した。また被膜外浸潤の進展度を周囲の脂肪あるいは筋組織内への浸潤が肉眼的に広範囲に認めるか否かで 2 つに分類した。【結果】被膜外浸潤を認めた症例の中でも予後不良であったのは、複数個の被膜外浸潤を認めた症例・被膜外浸潤陽性転移リンパ節がレベル 3 より遠位にあった症例・肉眼的に広範囲に被膜外浸潤を認めた症例であった。原発巣では YK4 型の場合他に比べ予後不良であった。また術後放射線治療の行えなかった症例の方が予後不良であった。【考察】本研究から口腔癌の被膜外浸潤陽性頸部リンパ節転移症例の中でも、原発巣の浸潤様式が YK 分類 4 型・複数個の被膜外浸潤陽性リンパ節・被膜外浸潤陽性リンパ節のレベルが遠位に認められることが予後不良に関連する因子である可能性が示唆された。

P-13-6

エナメル上皮腫における Snail, Slug, Twist の発現
Expression of Snail, Slug and Twist in Ameloblastoma

○栗岡 香美¹、和唐 雅博²、井関 富雄¹、田中 昭男²、森田 章介¹
¹ 大阪歯科大学 口腔外科学第一講座、² 大阪歯科大学 口腔病理学講座

Kagami Kurioka¹, Masahiro Wato², Tomio Iseki¹, Akio Tanaka², Syosuke Morita¹
¹The First Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Osaka Dental University, ²Department of Oral pathology

【目的】上皮間葉転換 (EMT) 関連因子の Snail, Slug および Twist と局所侵襲性に発育するエナメル上皮腫の関与を明らかにするため免疫組織学的方法で検討した。一部の症例について E-Cadherin と二重染色を行った。【材料および方法】生検ならびに手術標本を 1% ホルマリン固定しパラフィン包埋したエナメル上皮腫 36 例を用いた。通常に従い脱パラフィン後、クエン酸緩衝液中で抗原の賦活を行いそれぞれと反応させた。Alkarene Phosphatase 標識抗ウサギ抗体で反応させ、PermaRed で発色させた。【結果】Snail は、強発現が 21 例、弱発現が 11 例、発現しないものが 4 例であった。Slug は、強発現が 34 例、弱発現が 1 例、発現しないものが 1 例であった。Twist は、強発現が 9 例、弱発現が 14 例、発現しないものが 13 例であった。E-cadherin は腫瘍細胞の細胞膜に発現していたが、発現の減弱している部位がみられ、その部位には Snail, Slug や Twist が発現していた。budding のみられる部位にもその傾向がみられた。【結論】エナメル上皮腫における EMT に Snail, Slug および Twist が関わっていた。それらの発現部位に E-Cadherin が減弱していたことは、エナメル上皮腫の侵襲性の発育と関係していることが示唆された。

P-13-8

舌に生じた低悪性筋線維芽細胞肉腫 (low-grade myofibroblastic sarcoma) の一例
A case of low-grade myofibroblastic sarcoma in the tongue

○三上 友理恵¹、森山 雅文¹、見立 英史¹、川野 真太郎¹、
清島 保²、中村 誠司¹

¹九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座顎顔面腫瘍制御学分野、²九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座口腔顎顔面病態病理学研究分野

Yurie Mikami¹, Masafumi Moriyama¹, Eiji Mitate¹, Shintaro Kawano¹, Tamotsu Kiyoshima², Seiji Nakamura¹

¹Section of Oral and Maxillofacial Oncology, Division of Maxillofacial Diagnostic and Surgical Sciences, Faculty of Dental Science, Kyushu University, Fukuoka, Japan, ²Laboratory of Oral Pathology and Medicine, Division of Maxillofacial Diagnostic and Surgical Sciences, Faculty of Dental Science, Kyushu University, Fukuoka, Japan

【緒言】低悪性筋線維芽細胞肉腫 (LGMS) は軟部腫瘍の 1 つであり、異型筋線維芽細胞が増殖するまれな腫瘍である。今回、われわれは舌の LGMS を経験したので報告する。

【症例】患者: 38 歳、女性。現病歴: 初診約 1 か月前より舌尖部に腫瘍を自覚。以後徐々に増大したため、紹介にて当科初診。現症: 舌尖部に約 10 × 15 mm の境界明瞭で弾性軟の腫瘍を認めた。処置: 舌良性腫瘍の臨床診断のもと、外来局所麻酔下にて正常組織を 2-3 mm つけ、切除した。病理組織学的所見: 上皮下に束状・花筵状に増殖した核異型の乏しい紡錘形の細胞で構成され、間質に膠原化を伴う腫瘍を認めた。境界は比較的明瞭であったが、腫瘍内には少数の異型核分裂像および血管内浸潤を認めた。免疫組織化学染色では、紡錘形の細胞は vimentin, α-SMA, calponin に陽性となり、上皮系のマーカーは陰性であったことから、筋線維芽細胞と考えられた。病理診断: LGMS。経過: 病理診断確定後、安全域が不十分と判断し、画像検査にて転移がないことを確認後、全身麻酔下にて切除部位より約 10 mm の追加切除を行った。追加切除物には腫瘍細胞は認めなかった。

【考察】本症例は細胞の核異型が乏しいことから低悪性と診断されたが、低悪性で血管内浸潤を認めることは稀である。現在術後 1 年が経過しており、再発・転移は認めないが、今後も定期的な経過観察が必要と考えている。

P-13-9

口腔領域に発生した Spindle cell carcinoma の2例
2 cases of spindle cell carcinoma of the oral region

○辻 要¹、上田 衛¹、安田 典泰¹、渡邊 信也¹、山田 耕治¹、吉田 博昭¹、井関 富雄¹、和唐 雅博²、森田 章介¹

¹大阪歯科大学 口腔外科学第一講座、²大阪歯科大学 口腔病理学講座
Kaname Tsuji¹, Mamoru Ueda¹, Norihiro Yasuda¹, Shinya Watanabe¹, Koji Yamada¹, Hiroaki Yoshida¹, Tomio Iseki¹, Masahiro Wato², Shosuke Morita¹
¹First Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Osaka Dental University, Osaka, Japan, ²Department of the Oral Pathology, Osaka Dental University, Osaka, Japan

【緒言】 Spindle cell carcinoma (SpCC) は、組織学的に紡錘形細胞を主とする多形細胞の増殖からなり、肉腫を思わせる像を呈する稀な腫瘍で、扁平上皮癌の亜型として分類されている。今回われわれは口腔領域に発生した SpCC の2例を経験したので報告する。【症例】 症例1：68歳女性。現病歴：2009年9月に下顎前歯部歯肉と右側頬粘膜の白斑を自覚したため某病院歯科を受診し、当院を紹介され来院した。精査にて Squamous cell carcinoma (SCC) の診断を得たため、術前治療後に腫瘍切除術および即時再建術を行った。その後、右側頬粘膜、右側下唇および右側口底に腫瘍の再発と新発生を認めたため、切除術、化学療法および放射線治療を行っていたが、2014年2月右側頬粘膜に外向性腫瘍を認め SpCC の診断を得た。切除術を施行したが再度腫瘍の増大を認め、制御不能となり同年8月に死亡の転帰となった。症例2：77歳女性。現病歴：2009年4月に右側下顎歯肉部の潰瘍を自覚したため、近歯科より当院を紹介され来院した。SCC の診断を得たため、術前治療後に腫瘍切除術および即時再建術を行った。その後、右側上顎および右側舌部に腫瘍の再発と新発生を認めたため切除術を行い経過観察していたが、2015年4月に右側下顎歯肉に外向性腫瘍を認め、SpCC の診断を得たため切除術を施行した。現在経過観察中であるが再発は認めていない。【結語】 口腔領域に発生した SpCC の2例を経験したので報告した。

P-13-11

舌に発生した扁平上皮癌と平滑筋肉腫の混在病変の1例
A case of mixed tumor Leiomyosarcoma and Squamous cell carcinoma of the Tongue

○梨 正典、熊坂 士、福澤 智、片岡 利之、深田 健治、岡本 俊宏、安藤 智博

東京女子医科大学医学部 歯科口腔外科学教室

Masanori Nashi, Akira Kumasaka, Satoshi Fukuzawa, Toshiyuki Kataoka, Kenji Fukada, Toshihiro Okamoto, Tomohiro Ando
The Department of Dentistry and Oral Surgery, Tokyo Women's Medical University, Tokyo, Japan

平滑筋肉腫は子宮、消化管等で好発する悪性新生物で、頭頸部では稀とされている。また、われわれが渉猟した中で、本邦での平滑筋肉腫と扁平上皮癌が混在した報告例はなかった。今回われわれは扁平上皮癌と平滑筋肉腫が混在した症例を経験したため、その概要を報告する。【症例】 66歳男性、平成24年11月に近歯科に舌の違和感を主訴に受診。右側舌根部に有茎性腫瘍を認めたため、同月に精査加療目的に当科紹介受診した。腫瘍は15mm×15mm大でその周囲に2mm大の表面粗造な部位を認め同部の接触痛を認めた。生検で腫瘍内部は肉芽組織で異型性の強い細胞が混在し、前方部は過角化を伴い肥厚した重層扁平上皮の乳頭状増生を認めた。CTおよびMRI所見で右舌根部に境界不明瞭な低吸収域を認め、有意なリンパ節腫大を認めず、舌癌 T2N0M0 と診断した。【処置および経過】 全身麻酔下で右側舌部分切除術を施行。術後、TS-1(100)を2週間投与、1週間休薬を1クールとし、4クール施行した。病理組織学的所見では、腫瘍実質は紡錘細胞の増生と多数の細胞分裂像を認め、その周囲に異型の強い扁平上皮が存在していた。免疫組織化学的所見では腫瘍実質は smooth muscle actin(+) で CD31(-)、CD34(-)、c-kit(-)、s-100 タンパク (-)、周囲の扁平上皮ではサイトケラチン AE1+AE3(+), EMA(+) であった事より、平滑筋肉腫と扁平上皮癌が衝突した病変と診断した。現在術後2年半が経過しているが、再発なく経過良好である。

P-13-10

舌白板症の3年10か月にわたる経過観察中に癌化した腺扁平上皮癌の1例
A case of Adenosquamous carcinoma -malignant transformation of the tongue leukoplakia 3years 10months after-

○高井 美玲¹、青木 尚史¹、山内 千佳¹、堀井 幸一郎¹、重富 俊雄²、渋谷 恭之¹

¹名古屋市立大学大学院医学研究科生体機能・構造医学専攻 感覚器・形成医学講座口腔外科学分野、²名古屋徳洲会総合病院

Mirei Takai¹, Naofumi Aoki¹, Chika Yamauchi¹, Kouichirou Horii¹, Toshio Shigetomi², Yasuyuki Shibuya¹
¹Department of Oral Maxillofacial Surgery, Nagoya City University Graduate School of Medical Science, ²Nagoya Tokusuyukai General Hospital

【緒言】 腺扁平上皮癌は、扁平上皮癌と腺癌の両方の組織像を伴う高悪性型の癌であり、予後不良とされている。顎口腔領域における本邦での報告はまれで、われわれが渉猟した限りで自検例を含め45例、白板症から腺扁平上皮癌に癌化した例は本症例が初めてである。今回われわれは、白板症の長期経過観察中に癌化し、比較的早期発見・治療を遂行することができた舌腺扁平上皮癌を経験したので報告する。【症例】 66歳、女性。【主訴】 舌の白色変化、疼痛。【現病歴】 2009年10月より舌の白色変化、疼痛を自覚し近医内科受診。ビタミン製剤、口腔用ステロイド軟膏処方され、経過観察行っても改善見られず、精査・加療目的に当科紹介初診。【既往歴】 肋骨カリエス、子宮筋腫、脂質異常症。【処置及び経過】 当科初診時、右舌縁部に18×8mm、表面粗造の白色病変を認めた。生検後の病理組織所見より舌白板症と診断し、1～3か月に1回程度の経過観察を行った。初診より1年6か月後頃より1×1mm大の乳頭様腫瘍を認めたがその後の増大傾向なく、3年9か月後頃にはびらんを認め、生検により扁平上皮癌との病理組織所見を得た。2013年9月に全身麻酔下で右舌部分切除術を施行した。病理組織診断の結果、腺扁平上皮癌(pT1N0M0)と診断された。現在、術後2年経過し、再発・転移所見なく経過良好である。【結語】 白板症の3年10か月に及ぶ長期経過観察中に、腺扁平上皮癌化した1例を経験したので報告した。

P-13-12

巨細胞肉芽腫との鑑別が困難であった下顎頭に生じた軟骨芽細胞腫の1例
A case of chondroblastoma arising in the mandibular condyle difficult to differentiate from giant cell granuloma

○上村 恭子¹、永田 将士¹、児玉 彩¹、吉田 遼司¹、平木 昭光¹、篠原 正徳^{1,2}、三上 芳喜³、中山 秀樹¹

¹熊本大学大学院生命科学研究部歯科口腔外科学分野、²医療法人伊東会伊東歯科口腔病院 顎顔面再建・再生センター、³熊本大学医学部附属病院 病理部病理診断科

Kyoko Uemura¹, Masashi Nagata¹, Aya Kodama¹, Ryoji Yoshida¹, Akimitsu Hiraki¹, Masanori Shinohara^{1,2}, Yoshiki Mikami², Hideki Nakayama¹
¹Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Life Sciences, Kumamoto University, Japan, ²Itoh Dento-Maxillofacial Hospital, ³Department of Diagnostic Pathology, Kumamoto University Hospital

【緒言】 軟骨芽細胞腫は原発性骨腫瘍のうち1%以下にみられる稀な良性腫瘍である。このうち頭頸部領域における発生頻度は低く、特に下顎頭に発生した報告は極めて少ない。今回われわれは再発を繰り返し、巨細胞肉芽腫との鑑別が困難であった軟骨芽細胞腫の1例を経験したので報告する。【症例】 患者は54歳女性。左側顎関節部の腫脹を主訴に2006年12月近医を受診し、腫瘍性病変を指摘され当科紹介受診した。CT、MRIで左側下顎頭外側に骨破壊と腫瘍を疑う軟部影を認め、2007年1月に全身麻酔下にて腫瘍の一部を生検し、術中迅速診断にて巨細胞肉芽腫との診断を得たため、腫瘍を可及的に掻爬した。1年間の経過観察後に終診となったが、2012年に左側顎頭の違和感にて当科再診。MRIにて再発腫瘍の頭蓋内への進展を認めたため当院脳神経外科へ加療依頼し、2013年2月に腫瘍摘出術を施行した。病理診断は巨細胞肉芽腫であった。2014年5月のMRIで左側顎関節部～中頭蓋底に再度腫瘍再発を認めたため、脳神経外科、耳鼻咽喉科と合同で手術を行い、下顎頭基部を切断し、下顎頭および周囲軟組織を摘出した。術後病理所見で巨細胞の他に、単核の多核形ないし類円形細胞が充実に集簇し、軟骨基質の形成を認めたため、軟骨芽細胞腫の診断に至った。その後再発は認めない。【結論】 軟骨芽細胞腫は掻爬によって治療を得ることもあるが、症例に応じて下顎頭切除を含めた en bloc 手術も考慮すべきと思われる。

P-13-13

多発性内分泌腫瘍症 (MEN2B) を有さず硬口蓋に生じた単発性粘膜神経腫の 1 例

A case report of solitary mucosal neuroma of the hard palate without multiple endocrine neoplasia type 2B

○高山 優、五味 暁憲、武者 篤、横尾 聡
群馬大学大学院医学系研究科 顎口腔科学分野

Yu Takayama, Akinori Gomi, Atsushi Musha, Satoshi Yokoo
Department of Stomatology and Maxillofacial Surgery, Gunma University Graduate School of Medicine, Gunma, Japan

【緒言】口腔粘膜神経腫はまれな神経原性腫瘍であり、多発性内分泌腫瘍症 2B 型 (以下 MEN2B: Multiple endocrine neoplasia type B) に伴う症状の 1 つとされている。今回われわれは、基礎疾患に MEN2B を有さず、硬口蓋に生じたまれな単発性粘膜神経腫の 1 例を経験したので報告する。【症例と経過】患者: 37 歳, 女性。主訴: 右上 7 口蓋側肉肉腫脹。既往歴・家族歴: 特記事項なし。現病歴: 2012 年 1 月右上 7 口蓋側肉肉の腫脹を自覚し近医歯科受診, 紹介により群馬大学口腔外科受診した。現症: 右上 7 口蓋側肉肉から遠心歯肉に表面粘膜正常であり, 境界やや不明瞭な骨様硬の無痛性の膨隆を認めた。画像所見: CT, MRI で病変部の骨膨隆は認められたが, density や信号の変化等は認めなかった。処置および経過: 生検結果で神経腫の診断のもと, 全身麻酔下にて腫瘍を摘出した。病理診断結果: 粘膜神経腫。経過: MEN2B を有する可能性があったため全身検索を行ったが口腔粘膜神経腫以外に所見は認めず, 口腔内に単発性に生じた粘膜神経腫であった。現在まで再発なく経過良好である。【結語】MEN2B に伴う口腔粘膜神経腫であった場合, 将来の甲状腺癌を予知できるため, その診断は極めて重要な意味を有する。

P-13-15

急速に進行した低分化型口腔扁平上皮癌の一例

A case of squamous cell carcinoma, poorly differentiated of tongue

○田中 文恵¹、大野 純²、府川 晃久³、橋本 憲一郎³、池邊 哲郎¹、橋本 修一²

¹福岡歯科大学 顎・顔面外科学講座口腔外科学分野、²福岡歯科大学 生体構造学講座病態構造学分野、³福岡歯科大学 口腔・顎顔面外科学講座口腔腫瘍学分野

Fumie Tanaka¹, Jun Ohno², Teruhisa Fukawa³, Ken-ichiro Hashimoto³, Tetsuro Ikebe¹, Shuichi Hashimoto²

¹Division of Oral Surgery, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Fukuoka Dental College, Fukuoka, Japan, ²Division of Pathology, Department of Morphological Biology, Fukuoka Dental College, Fukuoka, Japan, ³Division of Oral tumor, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Fukuoka Dental College, Fukuoka, Japan

【緒言】口腔扁平上皮癌 (OSCC) の中には急速に進行し予後不良となる例がある。今回舌に発生した OSCC において免疫組織化学的解析から上皮間葉形質転換 (EMT) が示唆された一例を経験したので報告する。【症例】45 歳, 男性。舌の出血を主訴に受診。左側舌縁部に硬結を伴う 25 × 45mm の外向性腫瘍を認めた。超音波検査にて左側オトガイ下リンパ節 1 個に転移を認めた。生検にて OSCC の診断を得た。【経過】左側舌半側切除術、左側根治的頸部郭清術、前腕皮弁による再建術を施行した。術後 6 か月目に左側頸下リンパ節への転移を認め放射線化学療法を開始した。術後 1 年 3 か月目に CT にて胸膜播種を認め緩和ケアへ移行するも術後 1 年 5 か月目に死亡した。【病理学的所見】HE 染色では異型扁平上皮から浸潤部腫瘍組織への移行像がみられ OSCC の像を呈していた。それに引き続く腫瘍は筋層まで膨張性浸潤増殖し短紡錘形を呈する肉腫様形態を呈していた。核分裂像も散見され脈管侵襲も認められた。AE1/AE3、E-cadherin は異型扁平上皮から浸潤移行する腫瘍細胞において陽性、深部増殖部においては陰性であった。Ki-67 index は 64% であり高い増殖能が考えられた。Vimentin は紡錘形腫瘍細胞に陽性であった。【考察】本症例は病理組織学的に明らかな OSCC の成分を一部には認められたものの深部に浸潤増殖する腫瘍細胞が肉腫様の像を示し AE1/AE3 陰性、Vimentin 陽性を呈したことより EMT を来し予後不良となった可能性が示唆された。

P-13-14

下歯槽神経より発生した神経周膜腫の 1 例

A case of Perineurioma derived from the inferior alveolar nerve

○栗原 淳¹、清水 崇寛^{1,2}、小川 将¹、関 麻衣^{2,3}、佐野 孝昭³、横尾 聡^{1,2}

¹群馬大学医学部附属病院 歯科口腔・顎顔面外科、²群馬大学大学院医学研究科 顎口腔科学分野、³群馬大学大学院医学研究科 病理診断学分野

Jun Kurihara¹, Takahiro Shimizu^{1,2}, Masaru Ogawa¹, Mai Seki^{2,3}, Takaaki Sano³, Satoshi Yokoo^{1,2}

¹The Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Medicine, University of Gunma, Japan, ²Oral and maxillofacial surgery, Graduate school of medicine, Gunma University, Japan, ³The Department of pathological diagnosis, Graduate school of medicine, Gunma University, Japan

【緒言】神経周膜腫 (以下 PN) は主に四肢, 体幹に発生する末梢神経病変であり, 口腔内に PN が生じることは非常にまれである。PN は神経内に発生する神経内 PN (INPN) と軟組織に発生する軟部 PN に分類される。今回われわれは下歯槽神経の神経周膜に由来し, 下顎骨体部に発症した INPN の 1 例を経験したので, 概要について報告する。【症例】43 歳, 男性。右側下唇〜オトガイ部にかけての知覚鈍麻感を自覚し, 近医歯科受診。CT 上にて右側下顎骨体部に類円形 X 線透過像を認めたため, 某病院歯科口腔外科を受診。生検術を施行され, 神経鞘腫の診断となり当科紹介となる。MRI にて右下顎管が拡大し, 漸増型の増強効果を示していた。【経過】2015 年 4 月下旬, 全身麻酔下にて腫瘍摘出術を施行した。肉眼的に下歯槽神経に連続して嚢状の腫瘍 (3.2 × 1.0cm) がみられたため, 周囲の下歯槽神経血管束を結紮・切断し一塊として摘出した。病理組織学的に, 神経線維束周囲に腫瘍組織が束状に増殖していた。さらに神経線維を取り囲み, 神経線維束を分離するような腫瘍細胞の増生も認められた。免疫組織学的に腫瘍細胞は Glut-1 陽性, EMA 弱陽性, Claudin-1 弱陽性であった。腫瘍細胞は S-100 陰性であったが, 残存した神経線維は S-100 陽性であった。病理診断は INPN であった。【結語】今回われわれは下顎に発生した非常にまれな INPN を経験したので報告した。現在術後半年を経過しているが, 再発を示唆する所見は認められない。

P-13-16

顎口腔領域に発生した神経鞘腫に関する臨床的・病理組織学的検討

Clinical and histopathologic analysis of schwannoma in oral and maxillofacial region in terms of vascular and neural network formation

大隅 麻貴子^{1,2}

¹群馬大学医学部附属病院 歯科口腔・顎顔面外科、²群馬大学大学院医学系研究科 顎口腔科学分野

Makiko Osumi^{1,2}

^{1,2}Oral and Maxillofacial Surgery, Gunma University Hospital, Maebashi, Japan, ²Department of Stomatology and Maxillofacial Surgery, Gunma University Graduate School of Medicine, Maebashi, Japan

【はじめに】神経鞘腫は, 有髄神経の schwann 細胞に由来する良性腫瘍であり, 顎口腔領域での発生は少ない。今回われわれは, 群馬大学歯科口腔・顎顔面外科で治療した神経鞘腫について, 臨床的, 病理組織学的に検討し, 特に腫瘍内血管・リンパ管形成所見から, 腫瘍の組織形成機序について考察した。【対象および検討方法】1992 年から 2014 年までの 22 年間に当科で治療を施行し, 病理学的に神経鞘腫と判断された 11 例を検討対象とし, (1) 臨床的, 病理学的な診断的特徴を検討するとともに, (2) S-100, CD34, D2-40, VEGFR 抗体を使用し, 免疫組織学的に腫瘍内の血管・リンパ管形成を観察した。【結果】1. 臨床的結果: 発生部位は舌が最も多く, 腫瘍の最大径は 20mm 以下のものが多く見られた。2. 病理組織学的結果: 11 例中 9 例で Antoni A 型と B 型は混在しており, Antoni B 型では腫瘍内変性所見が見られた。腫瘍の最大径が 20mm を越える症例は, 全例 Antoni B 型の占有比が 6 割を越えていた。3. 免疫組織学的結果: S-100 は Antoni A 型で強陽性, B 型で陽性を示した。CD34 陽性血管は Antoni A 型, B 型, 被膜のすべてで認められたが, B 型において多く認められた。D2-40 陽性リンパ管は Antoni B 型が 7 割を占める 1 例のみに認められた。【考察およびまとめ】Vascular and neural network formation という神経・血管の成長相互作用が神経鞘腫の増殖において重要な役割を果たしていると考えられた。

P-13-17 下顎骨および肝に発生した未分化癌の1例
Undifferentiated Carcinoma of the Mandible and the Liver:
A case report

○筋生田 整治¹、宮下 英高¹、山田 有佳¹、吉川 桃子¹、
相馬 智也¹、森田 麻友¹、長谷川 稔洋²、高橋 萌¹、
中川 種昭¹、河奈 裕正¹
¹慶應義塾大学医学部 歯科・口腔外科学教室、²がん・感染症センター
都立駒込病院 口腔外科

Seiji Asoda¹, Hidetaka Miyashita¹, Yuka Yamada¹, Momoko Yoshikawa¹, Tomoya Souma¹,
Mayu Morita¹, Toshihiro Hasegawa², Moe Takahashi¹, Taneaki Nakagawa¹,
Hiromasa Kawana¹
¹Department of Dentistry and Oral Surgery, School of Medicine, Keio University,
Tokyo, Japan, ²Department of Oral Surgery, Tokyo Metropolitan Cancer and
Infectious Diseases Center Komagome Hospital, Tokyo, Japan

下顎骨および肝に発生し、原発巣の特定に至らなかったまれな腫瘍の1例を経験したので報告する。症例は64歳男性で、2006年10月に肝腫瘍手術を実施し、未分化癌の診断を得ていた。同年12月のPET-CTにて右側下顎骨にFDG集積を認めため、2007年1月、当科紹介となった。初診時、口腔内に異常所見は認めなかったが、右側オトガイ部の知覚鈍麻を認め、CT、MRIでは下顎骨に直径4cm大の腫瘍がみられた。生検結果は肝腫瘍と同様の組織像を呈する未分化癌で、同年4月、全身麻酔下に右側下顎半側切除、チタンプレートによる即時再建術を実施した。切除標本でも肝腫瘍と同様の未分化癌と診断されたが、下顎骨、肝のいずれが原発巣であるか、あるいはともに転移巣であるかの断定は困難であった。その後経過良好であったが、下顎手術から7年後の2014年4月、PET-CTにて下顎骨切除後の軟組織内にFDG集積を認めた。生検では未分化癌であり、他部位に転移・再発病変を認めなかったため、同年5月、右側下顎腫瘍切除術、右側選択的頸部郭清術を実施した。切除標本の病理組織像もこれまで同様未分化癌であった。2度目の下顎手術から1年5か月の現在、下顎骨、肝ともに再発はみられず、他の原発巣や新たな転移巣も認めないが、今後も厳重な経過観察が必要である。

P-13-19 舌癌におけるTumor budding (簇出)の臨床的検討
Clinical research of the tumor budding on Tongue cancer

○首藤 俊一、府川 晃久、池崎 晶二郎、田中 文恵、
橋本 憲一郎、平木 昭光、池邊 哲郎
福岡歯科大学医科歯科総合病院 口腔外科

Shunichi Sudo, Teruhisa Fukawa, Shojiro Ikezaki, Fumie Tanaka, Kenichiro Hashimoto,
Akimitsu Hiraki, Tetsuro Ikebe
Department of Oral and Maxillofacial surgery

Tumor budding とは腫瘍先進部の間質に存在する4つ以下の細胞で構成された腫瘍塊である。日本癌治療学会の大腸癌治療ガイドラインでは、Tumor budding の存在がリンパ節転移危険因子として認められ、術後のリンパ節郭清などの追加切除適応基準に Tumor budding の存在が記されている。今回、我々は舌癌における Tumor budding の臨床的検討を行ったので報告する。【対象】2008年から2011年に当科で扁平上皮癌と診断され手術を行い当院にて術後の定期的なフォローが可能であった男性15名、女性11名の26名26例でそのうちわけはStage I 11例、Stage II 8例、Stage III 1例、Stage IVa 5例、Stage IVc 1例でいずれも術前に化学療法と放射線療法は行っていない。また再発、後発転移症例は含まれていない。【方法】HE染色を行った切除標本において腫瘍の浸潤先進部を20倍レンズを用いて観察し、最も密集して観察された Tumor budding の範囲で Tumor budding 数を数える。Tumor budding 数とTNM分類、YK分類との比較検討を行った。観察者は2名の口腔外科医で行った。【結果】2名の口腔外科医ともに Tumor budding ありとした症例は26例中12例で認められた。Tumor budding 数の最大値は6個であった。Tumor budding を Stage 分類別に比較すると Stage I 症例は7例、Stage II 症例は1例、Stage III 症例は0例、Stage IVa 症例は4例、Stage IVc 症例は1例に認めた。

P-13-18 舌尖部に生じた筋上皮腫の1例
A case of myoepithelioma of the tongue

○千北 さとみ¹、中松 耕治¹、牟田 晃洋¹、矢内 雄太²、上里 梓³、
鬼丸 満穂³、小田 義直⁴
¹飯塚病院歯科 口腔外科、²九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顔面
病態学講座口腔顎顔面外科学分野、³九州大学大学院医学研究院 病理病態学、⁴九州大学大学院医学研究院 形態機能病理学

Satomi Chigita¹, Kouji Nakamatsu¹, Akihiro Muta¹, Yuta Yanaï², Azusa Uezato³,
Mizuho Onimaru³, Yoshinao Oda⁴
¹Department of Dentistry and Oral Surgery, Iizuka Hospital, Fukuoka, Japan,
²Section of Oral & Maxillofacial Surgery, Division of Maxillofacial Diagnostic
and Surgical Sciences, Faculty of Dental Science, Kyushu University, Fukuoka,
Japan, ³Pathophysiological and Experimental Pathology, Department of
Pathology, Graduate School of Medical Sciences, Kyushu University, Fukuoka,
Japan, ⁴Department of Anatomic Pathology, Pathological Sciences, Graduate
School of Medical Sciences, Kyushu University, Fukuoka, Japan

【緒言】筋上皮腫は腫瘍性筋上皮細胞の増殖を主体とする良性唾液腺腫瘍で、全唾液腺腫瘍の1~1.5%とまれな腫瘍である。耳下腺や口蓋が好発部位であり、舌の発生例はほとんど報告がない。今回舌尖部に発生した筋上皮腫の1例を経験したので報告する。【患者】41歳、男性。【主訴】舌の腫瘍。【現病歴】初診の約3年前に舌尖部の無痛性の腫瘍を自覚し、近医で切除を勧められ当科を受診した。【現症】舌尖部に14×13mmの境界明瞭な類球形の腫瘍を認めた。弾性硬、表面粘膜は正常で、可動性は認めなかった。【処置および経過】臨床的に良性腫瘍が疑われたため切除生検を行った。腫瘍の周囲2mmで切開し、周囲組織を一層付けて切除した。腫瘍は薄い被膜を有し周囲組織との癒着は認めなかった。術後2か月の時点で再発なく経過している。【病理組織学的所見】線維性被膜に覆われた境界明瞭な腫瘍で多角形細胞の増殖と軟骨粘液基質を認めた。特殊染色ではMIB-1 5%、免疫組織化学染色ではAE1/3、EMA、S-100、vimentin、α-SMA 陽性を示した。【診断】筋上皮腫。【考察】免疫組織化学染色にて上皮系、間葉系マーカーのいずれも陽性を認め、筋上皮腫の診断に至った。予後は一般に良好とされているが、局所浸潤性や悪性化を示す症例の報告もある。本症例は臨床的、病理組織学的所見から再発の可能性は低いと考えられるが、慎重に経過観察を行う予定である。

P-13-20 エナメル上皮線維歯牙腫の一例
A case of ameloblastic fibro-odontoma

○平野 大輔¹、大橋 祐生¹、星 秀樹³、飯島 伸¹、武田 泰典²、
杉山 芳樹¹
¹岩手医科大学歯学部 口腔顎顔面再建学講座口腔外科学分野、
²岩手医科大学 病理学講座病態解析学分野、³青森県立中央病院 歯科口腔外科

Taifu Hirano¹, Yu Ohasi¹, Hideki Hoshi³, Shin Iijima¹, Yasunori Takeda²,
Yoshiki Sugiyama¹
¹Division of Oral and Maxillofacial Surgery, Department of Reconstructive Oral
and Maxillofacial Surgery, School of Dentistry, Iwate Medical University, ²Division
of Anatomical and cellular Pathology, Department of Pathology of Iwate Medical
University, ³Dentistry and Oral Surgery, Aomori Prefectural Hospital

【緒言】エナメル上皮線維歯牙腫は、歯原性上皮と歯原性外胚葉性間葉組織の両者の増殖からなり、象牙質、エナメル質の形成をきたす良性的歯原性腫瘍である。今回われわれは、下顎右側大白歯部に発生したエナメル上皮線維歯牙腫を経験したので、その概要を報告する。【症例】患者は9歳の女児で、かかりつけの歯科医院のエックス線写真にて下顎右側大白歯部に石灰化物を含む嚢胞様透過像を認めた。精査治療を目的に、平成25年3月に当科を紹介受診した。歯科用コーンビームCT所見にて、右側の下顎大白歯部から下顎枝前縁部にかけて、境界明瞭で内部に小石灰化物が存在する多房性の透過性病変を認め、第二大歯の歯胚は下方へ圧排されていた。局所麻酔下に生検を行ったところ病理組織学的にエナメル上皮線維腫であった。平成25年5月に全身麻酔下に腫瘍を摘出した。摘出物の病理組織学的診断はエナメル上皮線維歯牙腫であった。外来にて経過観察を行ったが、術後半年で下顎右側第二大歯歯胚の近心部に再発が疑われる所見を認めた。平成26年1月に再度全身麻酔下に下顎右側第二大歯歯胚摘出術、下顎腫瘍摘出術を行った。現在、再発時から1年半経過しているが、経過良好である。【考察】エナメル上皮線維歯牙腫の処置は摘出挿入術が一般的とされているが、数年経過後に再発した症例や悪性化の報告もみられるため、今後も定期的な経過観察が必要であると思われる。

P-13-21

下唇に発生した粘液貯留嚢胞と鑑別が困難であった腺房細胞癌の 1 例

A case of lower lip acinic cell carcinoma with difficulty in preoperative diagnosis from mucocele

○矢尾 真弓¹、志茂 剛¹、小畑 協一¹、藤井 由紀子¹、長塚 仁²、佐々木 朗¹

¹ 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 口腔顎顔面外科学分野、

² 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 口腔病理病態学分野

Mayumi Yao¹, Tsuyoshi Shimo¹, Kyouichi Obata¹, Yukiko Fujii¹, Hltoshi Nagatsuka², Akira Sasaki¹

¹Department of Oral and Maxillofacial Surgery, and Biopathological Science, Okayama University Graduate School of Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences, ²Department of Oral Pathology and Medicine, Biopathological Science, Okayama University Graduate School of Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences

【緒言】腺房細胞癌は、正常漿液性腺房細胞に類似の細胞増殖を特徴とする唾液腺腫瘍で、耳下腺に好発するが小唾液腺、特に口唇の発生頻度は低い。今回われわれは、下唇に発生した粘液貯留嚢胞に類似した腺房細胞癌の 1 例を経験したので報告する。【症例】患者：29 歳男性。【主訴】下唇の腫脹。【現病歴】2013 年 5 月、下唇の腫脹を覚え近医歯科病院を受診、精査加療のため当科初診となった。【口腔内所見】下唇正中に境界明瞭な、20 × 20mm の弾性やや硬な腫瘍を認めた。【臨床診断】下唇粘液貯留嚢胞。【処置および経過】超音波検査を施行したところ、均一で境界明瞭な低エコー領域を認め、腫瘍性病変の可能性を指摘された。PET 検査を施行したところ SUVmax=5.33 で悪性腫瘍を疑う所見を得たため、外来局所麻酔下で穿刺吸引細胞診および生検を施行、腺房細胞癌との診断に至った。2013 年 6 月に全身麻酔下で腫瘍切除を施行、術後 2 年 4 ヶ月経過した現在、再発、転移の徴候はなく経過良好である。【病理組織学的所見】嚢胞様構造を呈した腫瘍で、異型に乏しい核と、PAS 陽性の顆粒を細胞質内に有した腫瘍細胞が、内腔を圍繞するように配列していた。一部の腫瘍細胞は内腔および周囲結合組織内へ浸潤していた。【結語】口唇の腺房細胞癌は発生頻度が低いが、粘液貯留嚢胞に類似した所見を有することがあるため、鑑別が非常に重要である。

P-14-1

舌白板症症例における臨床病理学的検討

Clinicopathological study of tongue leukoplakia cases

○荘司 洋文¹、浅野 一成^{1,2}、辺見 卓男³、柳下 寿郎⁴、岡部 貞夫⁴

¹ 日本歯科大学附属病院 口腔外科、² 日本歯科大学生命歯学部 口腔外科学講座、³ 日本歯科大学生命歯学部 病理学講座、⁴ 日本歯科大学附属病院 歯科放射線・口腔病理診断科

Shoji Hirohumi¹, Asano Kazunari^{1,2}, Henmi Takuo³, Yagishita Hisao⁴, Okabe Sadao⁴
¹Oral surgery, The Nippon Dental University Hospital, ²Dept. of Oral and Maxillofacial Surgery, The Nippon Dental University, School of the life dentistry at Tokyo, ³Dept. of Pathology, The Nippon Dental University, School of the life dentistry at Tokyo, ⁴Division of Oral Diagnosis, Dental and Maxillofacial Radiology and Oral pathology Diagnostic Service, The Nippon Dental University Hospital

2010 年に口腔癌取扱規程が発行され、口腔上皮内腫瘍 OIN や口腔上皮性異形成 OED が徐々にではあるが、口腔外科や口腔病理医にも認知されるようになってはいる。しかし、総意形成は未だされていない。そのため、前がん病変である白板症が放置され、最終的に浸潤がんになって治療される症例がないわけではない。そこで、本発表では、舌白板症全摘術を施行した症例を対象に臨床病理学的な検討を行い、その組織病態を明らかにし、今後の治療について考察する。【対象】2006 年 1 月から 2015 年 9 月までの舌白板症全摘切除された 81 症例について検討した。【結果】男 43 名、女 38 名。平均年齢は 56 歳 (23-84 歳)。最終病理組織診断では上皮過形成 3 例、OED 37 例、OIN (Tis 癌) 19 例、扁平上皮癌 (Ca) 19 例、その他 3 例で、癌が全体の 47% を占めていた。予後については 81 例中 11 例に同側部位に白板症の再発 (10 例) あるいは新たな病変 (1 例) を認めた。それらはすべて再切除した。その病理組織診断の内訳は OED → 過形成 (1 例) / OIN (3 例)、Tis → OED (1 例) / Tis (第 2 癌 1 例) / Ca (1 例)、Ca → OED (4 例) がみられた。1 例ではあったが Ca → 頸部後発転移を認めた。【まとめ】切除された舌白板症の 47% が OIN あるいは Ca であったことから、舌白板症は積極的な治療対象とすべきと考える。

P-13-22

舌リンパ節に転移した下顎骨肉原発基底細胞癌の 1 例

Basal cell carcinoma of mandible with lingual lymph node metastasis: a case report

○薬師寺 孝¹、有泉 高晴¹、太田 亮輔¹、船越 彩子¹、渡部 幸央¹、森川 貴迪¹、齋藤 寛一^{1,2}、岩本 昌士¹、右田 雅士¹、大金 寛²、恩田 健志¹、柴原 孝彦¹、高野 伸夫²、橋本 和彦³

¹ 東京歯科大学 口腔顎顔面外科学講座、² 東京歯科大学 口腔がんセンター、³ 東京歯科大学市川総合病院 臨床検査科

Takashi Yakushiji¹, Takaharu Arizumi¹, Ryosuke Ohta¹, Ayako Funakoshi¹, Yukio Watabe¹, Takamichi Morikawa¹, Hirokazu Saito², Masashi Iwamoto¹, Masashi Migita¹, Satoru Ogane², Takeshi Onda¹, Takahiko Shibahara¹, Nobuo Takano², Kazuhiko Hashimoto³

¹The Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Tokyo Dental College, Tokyo Japan, ²Oral Cancer Center, Tokyo Dental College, ³Division of Surgical Pathology, Clinical Laboratory of Ichikawa General hospital, Tokyo Dental College

基底細胞癌 (basal cell carcinoma) は扁平上皮癌の亜型の一つとされており、口腔領域ではまれである。今回われわれは、22 歳の下顎肉内にした基底細胞癌の 1 例を経験したので、概要を報告する。【症例】22 歳 男性。【現病歴】2015 年 5 月頃より下顎右側大臼歯の動揺と同部の腫脹を認めた。近歯科病院を受診したところ、エックス線検査にて下顎右側臼歯部から下顎枝にかけての骨吸収像を認めたため、精査加療目的に当科紹介となる。【現 症】下顎右側第二大臼歯部から下顎枝にかけて潰瘍を認め、パノラマエックス線所見では同部の骨透過像を認めた。造影 CT では、下顎骨臼歯部の骨破壊像と顎下リンパ節、上内深頸リンパ節の腫大を認めた。FDG PET-CT では、病変部への FDG の集積と患側の顎下リンパ節、上内深頸リンパ節、舌リンパ節に FDG の集積を認めた。【臨床診断】下顎骨悪性腫瘍疑い【処置および経過】当科初診時に下顎右側第二大臼歯部より生検を行ったところ、悪性腫瘍が疑われたものの確定診断は得られなかった。平成 27 年 7 月、全身麻酔下に下顎骨半側切除による腫瘍切除術、両側頸部郭清術 (左側顎下部郭清術、右側根治的頸部郭清術変法)、金属プレートによる下顎骨再建、遊離前腕皮弁による即時再建術、気管切開術を行った。【病理組織診断】基底細胞癌現在術後 4 か月を経過しているが、再発なく経過している。

P-14-2

癌抑制遺伝子 Smad4 は口腔白板症の癌化に
関与する

Smad4 correlates with malignant transformation of oral leukoplakia

○坂田 純基、吉田 遼司、廣末 晃之、松岡 祐一郎、永田 将士、川原 健太、有田 英生、中嶋 光、上村 恭子、福岡 大喜、尾木 秀直、平木 昭光、篠原 正徳、中山 秀樹

熊本大学大学院生命科学研究部 総合医薬学部門 感覚・運動医学講座 歯科口腔外科学分野

Junki Sakata, Ryoji Yoshida, Akiyuki Hirotsue, Yuichiro Matsuoka, Masashi Nagata, Kenta Kawahara, Hidetaka Arita, Hikaru Nakashima, Kyoko Uemura, Daiki Fukuma, Hidenao Ogi, Akimitsu Hiraki, Masanori Shinohara, Hideki Nakayama
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Life Sciences, Kumamoto University, Kumamoto, Japan

【緒言】口腔白板症は前癌病変の一つに分類され、その癌化予測因子の解析は口腔癌の早期治療、早期発見のうえで非常に重要である。今回われわれは新たな分子マーカーの候補として Smad4 に着目し検討を行った。【対象と方法】2000 年から 2011 年に当科で臨床的に白板症と診断され、病理組織学的診断基準を満たした口腔白板症症例 150 例 (うち 24 例はのちに癌化を認めた) を対象とした。尚、病理組織学的診断基準は上皮の肥厚と過角化症または錯角化症、有棘層肥厚がみられ、基底膜の破壊がなく粘膜固有層に明らかな病変を認めないこととした。抗 Smad4 抗体で免疫組織化学染色を行い、陽性細胞率と染色強度各々に対して染色スコアをつけ、高発現と低発現の 2 群に分けて各臨床項目との関連を検討した。また、HE 染色標本で上皮性異形成の程度と間質へのリンパ球浸潤の程度を評価した。【結果】Smad4 は細胞の核に染色性を示した。Smad4 低発現群では有意に間質のリンパ球浸潤が強かった。また、Smad4 低発現、間質への高度リンパ球浸潤は癌化と有意な相関を認め、Smad4 低発現かつ間質のリンパ球浸潤を認めた群はその他の群と比較してさらに強い相関を認めた。累積癌化率は Smad4 低発現群および Smad4 低発現かつ間質のリンパ球浸潤を認めた群で有意に高かった。【結論】Smad4 が癌化の早期予測マーカーとして応用できる可能性が示唆された。また、その分子機構に局所における炎症反応の関与が示唆された。

P-14-3

口腔扁平苔癬 (OLP) における HPV-16 感染と HPV-16 感染 OLP の上皮におけるベータカテニン発現について
HPV-16 infection in Oral Lichen Planus (OLP) and the expression of beta-catenin in the epithelium of OLP infected with HPV-16

○加藤 世太^{1,2}, 磯村 まどか¹, 佐藤 伸明¹, 河合 遼子¹, 吉田 和加^{1,2}, 杉田 好彦^{1,2}, 久保 勝俊^{1,2}, 前田 初彦^{1,2}
¹ 愛知学院大学歯学部 口腔病理学講座、² 愛知学院大学 未来口腔医療研究センター

Seeta Kato^{1,2}, Madoka Isomura¹, Nobuaki Sato¹, Ryoko Kawai¹, Waka Yoshida^{1,2}, Yoshihiko Sugita^{1,2}, Katsutoshi Kubo^{1,2}, Hatsuhiro Maeda^{1,2}
¹Department of Oral Pathology, School of Dentistry, Aichi Gakuin University, ²Research Institute of Advanced Oral Science, Aichi Gakuin University

【目的】

我々は、HPV-16 感染が口腔扁平苔癬 (OLP) の悪性化におけるリスクファクターである可能性を考え、同疾患の HPV-16 感染を検索した。また、HPV-16 陽性 OLP の上皮におけるベータカテニン発現を評価した。

【対象および方法】

実験には、後に悪性化した 8 症例を含む OLP200 症例を使用した。コンセンサスプライマーを用いた PCR での陽性症例について HPV-16 型特異的 PCR を実施した。さらに、ベータカテニン免疫染色を行い、PCR での HPV-16 陽性 OLP (陽性群) と陰性 OLP (陰性群) の陽性細胞数を計測し評価した。

【結果】

PCR での HPV-16 陽性率は 25.5% であった。OLP 臨床型別陽性率は、びらん型が最も高かった。また、後に悪性化した 8 例中 5 例が HPV-16 陽性であり、全てびらん型であった。さらに、陽性群では上皮の細胞質や核にベータカテニン陽性像が確認され、陽性群が陰性群に比べて有意に陽性細胞数が多かった ($p < 0.01$)。

【結論】

以上より、HPV-16 感染が OLP 悪性化のリスクファクターであり、びらん型 OLP に HPV-16 関連の悪性化が起きることが示唆された。また、OLP でベータカテニン発現は減少するという報告があるが、本実験では陽性群で有意に陽性細胞が多いことから、HPV-16 がベータカテニンの細胞質や核への集積に関与する可能性が考えられた。さらに、ベータカテニンの異常集積は細胞増殖遺伝子を過剰発現するといわれており、HPV-16 陽性 OLP では細胞増殖が促進されることが示唆された。

P-15-1

舌癌小線源治療患者に対して歯科衛生士による積極的な周術期口腔機能管理が施された 1 例
A clinical report of perioperative oral care by a dental hygienist in brachytherapy for a tongue cancer patient

○坂田 朋美¹, 松本 良恵¹, 原口 美穂子², 渡邊 裕³, 難波 佳子¹, 足達 淑子¹, 戒田 篤志⁴, 三浦 雅彦⁴, 吉村 亮一⁵, 谷口 尚²
¹ 東京医科歯科大学歯学部附属病院 歯科衛生保健部、² 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 顎顔面補綴学分野、³ 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 口腔放射線医学分野、⁴ 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 口腔放射線腫瘍学分野、⁵ 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 腫瘍放射線治療学分野

Tomomi Sakata¹, Yoshie Matsumoto¹, Mihoko Haraguchi², Hiroshi Watanabe³, Yoshiko Nanba¹, Toshiko Adachi¹, Atsushi Kaieda⁴, Masahiko Miura⁴, Ryoichi Yoshimura⁴, Hisashi Taniuchi²
¹ Department of Dental Hygiene, Dental Hospital, Tokyo Medical and Dental University (TMDU), ² Department of Maxillofacial Prosthetics, Graduate School, Tokyo Medical and Dental University (TMDU), ³ Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Graduate School, Tokyo Medical and Dental University (TMDU), ⁴ Department of Oral Radiation Oncology, Graduate School, Tokyo Medical and Dental University (TMDU), ⁵ Department of Radiation Therapeutics and Oncology, Graduate School, Tokyo Medical and Dental University (TMDU)

本学医学部放射線治療科は、口腔癌に小線源治療を行っている数少ない施設である。治療は約 1 週間入院下で行われ、腫瘍へ直接小線源を刺入し組織内照射を行う。入院 1 週間前には、歯学部顎義歯外来へ紹介があり、放射線治療補助装置 (スベイス) の製作および周術期口腔機能管理が依頼される。患者は線源刺入中および刺入後の歯磨きは原則禁止されている。抜針翌日に退院後、1 週間かけて患部に急性期障害の粘膜炎が出現し、2-3 週でピークとなる。粘膜炎の消退には約 2 か月を要し、この間も歯磨きは原則禁止されている。今回、舌癌の小線源治療患者に対し、治療開始前および退院直後より歯科衛生士による積極的な周術期口腔機能管理の介入ができた 1 例を報告する。

患者は 82 歳、男性。右側舌癌にて 192Ir 針を用いた小線源治療 Σ 70Gy をスベイス装着し施行した。治療前から歯科衛生士による周術期口腔機能管理を開始し、治療後の粘膜炎発現中も、疼痛や出血に十分配慮し清掃指導を行った。また、小線源治療後の粘膜炎の発現から消失までの一連の経過を観察できた。

今回、周術期に歯科衛生士が積極的に介入した舌癌小線源治療の 1 例を報告した。これまで歯磨きが禁止されていた期間に専門的な介入が行え、退院後の口腔ケアに関する不安を取り除き、患者のモチベーションや QOL の向上を図ることができた。今後、放射線治療科と連携を図り、小線源治療患者の周術期口腔機能管理について検討していきたい。

P-14-4

口腔扁平上皮癌組織における蛍光観察装置の有用性
Utility of the fluorescence visualization device to the oral squamous cell carcinoma

○丸茂 知子¹, 田邊 耕士^{2,3}, 三浦 直³, 野村 武史⁴, 柴原 孝彦¹
¹ 東京歯科大学 口腔顎顔面外科学講座、² 東京歯科大学 薬理学講座、³ 東京歯科大学 口腔科学研究センター、⁴ 東京歯科大学 オーラルメディスン・口腔外科学講座

Tomoko Marumo¹, Koji Tanabe^{2,3}, Tadashi Miura³, Takeshi Nomura⁴, Takahiko Shibahara¹
¹Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Tokyo Dental college, Tokyo, Japan, ²Department of Pharmacology, Tokyo Dental College, Tokyo, Japan, ³The Oral Health Science Center, Tokyo Dental College, Tokyo, Japan, ⁴Department of Oral Medicine, Oral and Maxillofacial Surgery, Tokyo Dental College, Tokyo, Japan

【目的】近年、口腔癌スクリーニング検査の新しい手法として、細胞の自家蛍光を利用した蛍光観察装置が導入され始めた。これまでのヨード染色法や肉眼では判別できない病変を検出出来る方法として期待されている。本研究では、自家蛍光と口腔癌との関連性を明らかにするために、癌細胞株における自家蛍光強度について比較検討を行い、併せて自家蛍光物質との比較も行った。

【方法】細胞試料として、ヒト扁平上皮癌細胞株 (KON, SAS, HSC-4, Ca9-22)、ヒト表皮角化細胞株 (HaCaT) を用いた。各細胞を剥離回収後、PBS に懸濁し 1×10^5 cells/mL の濃度で細胞浮遊液を作製した。また自家蛍光物質として想定される試料として Collagen, NADH, FAD の測定を行った。測定には分光蛍光光度計 RF-5300PC (島津、京都) を用い、励起波長 (EX) 380 nm ~ 680 nm の条件で蛍光波長 (EM) を測定した。得られた EM をもとに蛍光強度を算出、比較検討を行った。

【結果】癌細胞は正常細胞に比較して有意に低い蛍光強度を示した。自家蛍光物質と正常細胞の蛍光スペクトルには部分的に一致する特徴が示された。

【考察】癌スクリーニング検査における蛍光観察装置の有用性、および細胞で観察される自家蛍光への自家蛍光物質の部分的な関与の可能性が示唆された。

P-15-2

高井病院口腔外科における周術期口腔機能管理の現状と展望
The present conditions and the prospects of the perioperative oral management in the Takai hospital

○吉岡 元¹, 玉置 盛浩¹, 中村 泰士¹, 青木 久美子², 山川 延宏², 中山 洋平², 桐田 忠昭²
¹ 社会医療法人高井会高井病院 口腔外科、² 奈良県立医科大学 口腔外科学講座

Hajime Yoshioka¹, Shigehiro Tamaki¹, Hiroshi Nakamura¹, Kumiko Aoki², Nobuhiro Yamakawa², Youhei Nakayama², Tadaaki Kirita²
¹Department of Dentistry oral Surgery, Takai Hospital, Nara, Japan, ²Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Nara Medical University, Nara, Japan

【緒言】平成 24 年度に周術期口腔機能管理料が新設されて以降、当科では各科と連携を行い、周術期口腔ケアを行っている。今回、当院における周術期口腔機能管理の現状と今後の課題について検討したので報告する。【対象、方法】平成 24 年 4 月から平成 27 年 3 月まで約 3 年間に周術期口腔機能管理を行った患者を対象とした。調査内容は紹介診療科、算定内容、歯科治療内容を検討した。【結果】患者総数は 212 例 (男性 112 例、女性 100 例) で、平均年齢 74.3 歳であった。周術期口腔機能管理料 I, II を算定した患者は 153 例で、周術期口腔機能管理料 III を算定した患者は 59 例であった。本院の月間全身麻酔総数は約 120 例で、周術期口腔機能管理実施率は約 10.9% であった。紹介診療科は消化器外科、心臓血管外科が 81% と多数を占めていた。歯科治療内容に関しては、専門的口腔ケアや義歯調整、歯石除去が多数を占め、動揺歯の固定や保護床の作製、抜歯が行われていた。また、口腔ケア施行前に撮影した X-P にて顎骨嚢胞、歯性上顎洞炎などの口腔外科疾患を 8 例認めており、後に当科で加療した。【まとめ】周術期口腔機能管理の導入以降、年々実施率と患者数が増加しており、周術期口腔機能管理を行うことは当科にとっても大きな利点であると思われた。

P-15-3

当科での周術期口腔機能管理の現状と標準化へ向けての取り組み

Efforts toward standardization and Current Status of Perioperative Oral Function Management in Shinsyu University Hospital

○鎌田 孝広、栗田 浩

信州大学医学部 歯科口腔外科教室

Takahiro Kamata, Hiroshi Kurita

Department of Dentistry and Oral Surgery, Shinsyu University School of Medicine

当科では以前より主に強力な化学療法を必要とする血液疾患患者や口腔内細菌の関与が比較的多い心臓血管疾患患者などの口腔機能管理に取り組んできたが、2012年4月より口腔ケアセンターを開設し、対象を拡大して周術期口腔機能管理を開始した。口腔ケアセンター開設から2年間で、総初診数は1327名で平均55名/月が受診している。依頼科は多岐にわたり、消化器外科、泌尿器科、呼吸器外科の順で多い傾向がみられた。口腔機能管理の内容は、歯周治療、外科治療（拔牙）、補綴治療の順であった。治療別の口腔機能管理介入状況は、がん手術療法26%、化学療法11%、放射線療法10%、心臓血管手術19%、臓器移植外科手術41%であった。効果の検証では、血液培養による口腔機能管理前後の口腔細菌検出率の低下、消化器がん手術患者における入院期間、絶食期間の短縮などの効果がみられた。口腔機能管理の診断は、誰が行っても変わらない判断となることが望ましい。実際の現場ではマンパワーの不足や研修の観点から、若い歯科医師が担当することが多く、誰でも診断できる指標があれば、臨床で役立つと考える。当科では過去の文献や報告を参考に、化学療法、造血幹細胞移植などの原疾患の治療に分けてプロトコルを作製しそれに沿って診断、治療、管理を行っている。しかし現時点ではデータや報告も少なくその妥当性は検証できていない。今後さらにデータを蓄積し標準化への検討を進めていきたい。

P-15-4

悪性リンパ腫の治療中に発見された下顎骨髄炎の1例

A case of osteomyelitis detected during chemotherapy of malignant lymphoma

○新垣 理宣^{1,2}、道 泰之²、鶴澤 成一²、原田 清²

¹群馬県立がんセンター 歯科口腔外科、²東京医科歯科大学歯学部 附属病院 顎顔面外科

Tadanobu Aragaki^{1,2}, Yasuyuki Michi², Narikazu Uzawa², Kiyoshi Harada²

¹Oral surgery, Gunma prefectural cancer center, Gunma, Japan, ²Maxillofacial surgery, Tokyo medical and dental surgery, Tokyo, Japan

【緒言】今回我々は悪性リンパ腫の化学療法中に下顎骨髄炎の重篤化を認めた1例を経験したため報告する。

【症例】86歳女性。現病歴 悪性リンパ腫（Burkitt Lymphoma）の診断にて、当院血液内科にてR-CHOP療法を施行。施行開始7日目に口腔内出血あり当科紹介となる。既往歴：横行結腸がん術後。骨粗鬆症にてビスホスホネート製剤内服。初診時臨床所見：右下顎臼歯部に複数の残根を認め、同部歯肉は腫脹し瘻孔を形成していた。画像所見：治療前の18F-FDG-PET/CTでは右下顎に局限したFDG集積を認めていた。臨床診断：右下顎骨髄炎。化学療法に伴う免疫抑制により重篤化したものと考えられた。処置及び経過：左下顎骨の洗浄及び残根を抜去及び抗菌薬の投与を行ったところ、右下顎の腫脹及び排膿は軽快した。現在外来にて経過観察中である。

【考察】FDG-PET/CTでは悪性腫瘍のみならず歯性炎症でも集積を認めるため、腫瘍との鑑別が必要である。また、化学療法中は免疫抑制による歯性炎症が重篤化する可能性があり、歯科医師による口腔管理が重要である。

P-15-5

小児急性前骨髄性白血病患者に発症した舌疣贅性黄色腫の1例

A case of verruciform xanthoma of the tongue in a patient with pediatric acute promyelocytic leukemia

○渡邊 美穂¹、小根山 隆浩²、佐久間 要²、戸谷 収二²、田中 彰¹、岡田 康男³

¹日本歯科大学新潟生命歯学部 口腔外科学講座、²日本歯科大学新潟病院 口腔外科、³日本歯科大学新潟生命歯学部 病理学講座

Miho Watanabe¹, Takahiro Oneyama², Kaname Sakuma², Syuji Toya², Akira Tanaka¹, Yasuo Okada³

¹Department of Oral and Maxillofacial Surgery, The Nippon Dental University, School of Life Dentistry at Niigata, ²Oral and Maxillofacial Surgery, The Nippon Dental University in Niigata Hospital, ³Department of Pathology, The Nippon Dental University, School of Life Dentistry at Niigata

【緒言】疣贅性黄色腫（verruciform xanthoma）は、1971年にShaferによって初めて報告された比較的稀な良性的粘膜炎であり、乳頭状に増殖した上皮と粘膜固有層への泡沫細胞の集合を特徴とする。今回我々は、小児急性前骨髄性白血病（APL）患者で造血細胞移植後の周術期口腔機能管理中に、舌疣贅性黄色腫を発症した1例を経験したので報告する。

【症例】患者は15歳男子。2009年2月APLの診断にて化学療法が行われ完全寛解に至ったが、その後治療関連AMLを発症したため、化学療法による寛解後に臍帯血移植が施行された。移植後の慢性GVHDによる口腔乾燥と口腔内管理の依頼にて紹介来院となった。当院では口腔ケア機能管理センターにて小児歯科と併せて口腔乾燥治療およびフッ素塗布によるう蝕予防を継続した。2014年診察時左側舌下部に7×6mmの表面顆粒状、黄白色の腫瘍性病変を認めたため腫瘍摘出術を施行。病理組織学的所見として、被覆重層扁平上皮の錯角化亢進と外向性乳頭状の小隆起が多数認められ、上皮脚間の粘膜固有層には疣贅性黄色腫に特徴的な泡沫細胞の集簇が見られたため疣贅性黄色腫と診断した。術後の腫瘍再発は認めておらず、口腔管理・ケアを継続中である。【結語】小児悪性腫瘍患者は生存率の向上により様々な問題点が指摘されており、治療に伴う晩期合併症への対応も必要となるため長期的な口腔機能管理が重要であると思われる。

P-16-1

口腔上皮内腫瘍（OIN）の癌化にはM2型マクロファージが関与している

Carcinogenesis of oral intraepithelial neoplasia may be related with M2-polarized tumor-associated macrophages

○柳生 貴裕、青木 久美子、山川 延宏、上田 順宏、上山 善弘、今田 光彦、桐田 忠昭

奈良県立医科大学医学部 口腔外科学講座

Takahiro Yagyu, Kumiko Aoki, Nobuhiro Yamakawa, Nobuhiro Ueda, Yoshihiro Ueyama, Mitsuhiro Imada, Tadaaki Kirita
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Nara Medical University, Nara, Japan

【目的】腫瘍内とその周辺に存在するマクロファージは、M2型マクロファージの特徴を示す。M2型マクロファージはマクロファージヘモグロビンスカベンジャー受容体（CD163）陽性を示し、固形癌においては悪性化を促進すると言われている。しかし、口腔上皮内腫瘍（OIN）におけるM2型マクロファージの役割については明らかになっていない。そこで、OINにおけるCD163陽性細胞と癌化（間質浸潤）を含む臨床病理学的因子との関連について解析した。

【材料および方法】浸潤性扁平上皮癌を除く口腔粘膜からの切除標本115例を対象とした。HE標本にて上皮異形性の程度を診断した。CD163、CD68免疫組織化学染色を行い、粘膜直下に浸潤するCD163、CD68陽性細胞数を計測した。中央値をカットオフ値として、CD163 high、CD163 low および CD68 high、CD68 low に分類した。上皮異形成と臨床病理学的因子との関連についてロジスティック回帰モデルにて解析した。OINの癌化と臨床病理学的因子との関連については、ログランク法にて比較し、コックス比例ハザードモデルにて解析した。

【結果】上皮異形成が進行すると、粘膜直下のCD163陽性細胞数は有意に増加した。さらに、粘膜直下のCD163陽性細胞は、OINの癌化の独立した危険因子と判明した。

【結論】OINの癌化に、粘膜直下に浸潤するM2型マクロファージが関与している可能性が示唆された。

P-16-2

口腔扁平上皮がん由来細胞株における EMT とセリンプロテアーゼ因子の発現

Expression of serin protease factor and EMT of oral squamous cell carcinoma

○吉澤 邦夫¹、能崎 晋一²、川尻 秀一³、上木 耕一郎¹

¹山梨大学大学院総合研究部医学域臨床医学系 歯科口腔外科講学講座、²国立病院機構金沢医療センター、³金沢大学大学院 細胞浸潤学分野歯科口腔外科講学講座

Kunio Yoshizawa¹, Shinichi Nozaki², Shuichi Kawashiri³, Koichiro Ueki¹
¹Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Division of Clinical Medicine, Graduate Faculty of Interdisciplinary Research, University of Yamanashi, ²Department of Dentistry and Oral Surgery, National Hospital, ³Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Kanazawa University Graduate School of Medical Science

緒言 口腔がん浸潤様式は、予後予測する上で有効であるが、とくに4D型は浸潤能が強く生命予後が不良であることが知られている。今回は、がん浸潤メカニズムの機序を解明することを目的に、浸潤様式の由来が明らかな口腔扁平上皮がん細胞株を用いて、EMT関連因子とセリンプロテアーゼ因子について比較検討した。**実験材料および方法** 実験に供した細胞株は3型からHSC-2, HSC-4, OSC-20の3種、4C型からOBC-01, OSC-19, OTC-04の3種、4D型からHOC313, TSUの2種とした。検討した発現因子は、上皮マーカーE-cadherin, Claudin-7に加え、E-cadherinを抑制することで知られている転写因子Snailとした。他には、セリンプロテアーゼであるuPAおよびuPAR、反対にセリンプロテアーゼ阻害因子となるMaspinをターゲットとした。それぞれのタンパク、遺伝子発現を調べた。**結果** E-cadherin, Claudin-7については、他の浸潤様式に比べて4D型で減弱していた。また、uPAおよびuPAR発現は4C型、4D型で高発現する一方で、Maspinは反対に4D型で発現減弱を認めた。**考察** 浸潤様式4D型では、上皮マーカーが減弱する一方で、細胞外マトリックス分子uPA, uPARが高発現していることから、4D型は細胞接着機能を失い高浸潤能を持つことが示唆された。

P-16-4

口腔癌細胞株を用いた軸索ガイダンス因子 Roundabout homolog (ROBO) 1 の発現解析

Analysis of expression of axon guidance molecule ROBO1 in oral cancer's cell lines

○小松 紀子^{1,3}、阿部 雅修⁴、安部 貴大²

¹東京大学大学院医学系研究科 顎口腔外科・歯科矯正歯科、²東京大学医学部附属病院 顎口腔外科・歯科矯正歯科、³東京大学先端科学技術研究センター計量生物学 (富士フィルム基金)、⁴東京大学保健・健康推進本部 (保健センター)

Noriko Komatsu^{1,3}, Masanobu Abe⁴, Takahiro Abe²
¹Department of Oral and Maxillofacial Surgery, The University of Tokyo Graduate School of Medicine, ²Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Dentistry and Orthodontics, The University of Tokyo Hospital, ³Department of Quantitative Biology and Medicine, Research Center for Advanced Science and Technology, The University of Tokyo, ⁴Division for Health Service Promotion, The University of Tokyo

【諸言】 脊椎動物の発生段階における脊椎軸索伸長方向を制御する膜タンパク質として同定されたRoundabout homolog 1 (ROBO1)は、細胞移動、細胞接着などの調節因子として知られている。最近、悪性腫瘍への関与が明らかとなったが、口腔癌での情報は少ない。**【目的】** ヒト由来口腔扁平上皮癌患者から樹立された細胞株HSQ-89, HO-1-u-1, Sa3, SASを用いてROBO1の発現の有無について検討を行う。**【材料と方法】** 細胞株は理化学研究所細胞材料開発室より入手した。抗ROBO1抗体は共同研究機関である先端科学技術研究センター計量生物学で独自に開発されたモノクローナル抗体を用いた。mRNA発現は各種プライマーを設計のうえqRT-PCRで検討し、シークエンス解析を行った。タンパク発現はウエスタンブロット、フローサイトメトリー、免疫染色で検討した。**【結果】** mRNAはいずれの細胞株も発現を認めた。HSQ-89は、シークエンスでROBO1と同じ配列を認めた。タンパク質ではHSQ-89, HO-1-u-1, Sa3に発現を認めたが、SASでは検出できなかった。**【結論】** 口腔癌細胞株でROBO1の発現を認めた(mRNA; 4/4, タンパク質; 3/4)。ROBO1の発現が口腔癌の発生や浸潤・転移に関与するか、今後さらなる検討を進める。

P-16-3

GalNAc-T3 強発現は早期口腔扁平上皮癌における無病生存期間の独立した予測因子である

Strong Expression of Polypeptide N-Acetylgalactosaminyl Transferase 3 Independently Predicts Shortened Disease-Free Survival in Patients with Early Stage Oral Squamous Cell Carcinoma

○原田 佳和^{1,2}、宮脇 昭彦¹、大矢 亮一¹、山田 壮亮²

¹産業医科大学病院 歯科口腔外科、²産業医科大学 第2病理学教室

Yoshikazu Harada^{1,2}, Akihiko Miyawaki¹, Ryoichi Oya¹, Sohsuke Yamada²
¹Department of Dentistry and Oral Surgery, University Hospital of Occupational and Environmental Health, Kitakyushu, Japan, ²Department of Pathology, University of Occupational and Environmental Health, Kitakyushu, Japan

【背景・目的】 口腔扁平上皮癌(OSCC)は早期診断・手術により予後改善を得られる疾患であるが、早期症例(ESOSCC)でさえ局所再発や後発頸部リンパ節転移がしばしば認められるため、再発・転移のリスクを推測し得る生物学的マーカーを発見することは有用である。一方、癌細胞では細胞表面の糖鎖修飾が変化している。N-acetylgalactosaminyltransferases (GalNAc-Ts)はムチンO結合型糖鎖付加を触媒する酵素であり、GalNAc-T3は、種々の悪性腫瘍で臨床病理学的因子との関連があると報告されているが、これまでOSCCでの検討はない。今回、ESOSCCでのGalNAc-T3発現について、予後を含めた臨床病理学的因子との関係を検討したので報告する。**【方法】** 対象は1994年から2015年に産業医科大学病院で手術療法単独により初回治療を受けたT1-2N0の患者110名である。切除標本をGalNAc-T3抗体により免疫組織化学染色を行い、弱発現群と強発現群に分類し、臨床病理学的因子および生存期間との関係を統計的に検討した。**【成績】** 強、弱発現群はそれぞれ70例(63.6%)、40例(36.4%)であった。強発現群は弱発現群に比べて有意に、低分化傾向、脈管侵襲が認められ、5年、特に2年無病生存率が低下していた。5年全生存率では両群に有意差は認められなかった。**【考察】** GalNAc-T3強発現は、ESOSCCでの再発高リスク群の有益な臨床マーカーとなり得、術後早期における補助療法適応の判断にも非常に有用であると考えられた。

P-16-5

口腔癌・口腔前がん病変患者の唾液中の代謝動態に関する研究

Metabolomic profiles of saliva in oral cancer and dysplasia

○石川 恵生¹、杉本 昌弘²、北島 健一郎¹、飯野 光喜¹

¹山形大学医学部 歯科口腔・形成外科学講座、²慶應義塾大学先端生命科学研究所

Shigeo Ishikawa¹, Masahiro Sugimoto², Kenichiro Kitabatake¹, Mitsuyoshi Iino¹
¹Department of Dentistry, Oral and Maxillofacial Plastic and Reconstructive Surgery, ²Institute for Advanced Biosciences, Keio University

【目的】 唾液は簡便かつ非侵襲的に採取可能な検体であり、また血液や尿同様に豊富な分子を含有していることから、新たな生体試料として注目を浴びている。本研究では、口腔癌および口腔前癌病変を含む何らかの口腔粘膜病変を有する患者の唾液中に含まれる代謝物を測定し、口腔癌・口腔前癌病変スクリーニング用マーカーを網羅的に探索することを目的とした。**【方法】** 対象者は、口腔悪性腫瘍患者6名、口腔前癌病変患者10名、そして扁平苔癬など口腔癌や前癌病変以外の何らかの口腔粘膜病変を有する患者32名とした。これらの対象者から約5mlの安静時唾液を採取し、唾液中に含まれる代謝物濃度を、キャピラリー電気泳動質量分析(CE-MS)法を用いて網羅的に測定・定量した。得られた結果からMann-Whitney U testを用いて2群比較を行い、統計的に有意な差を認めた代謝物からROC(Receiver Operating Characteristic curve)曲線を作成し、AUC(area under the curve)を算出した。**【結果】** 唾液から約350種類の代謝物を検出・同定ができた。この中で約20種類の代謝物が、口腔癌および口腔白斑症患者の唾液において統計的に有意に高値を示した。**【結論】** 唾液中の代謝物は、口腔癌および口腔前癌病変スクリーニングのためのバイオマーカーとして有用であることが示唆された。

P-16-6

口腔扁平上皮癌細胞の細胞外分泌マーカー
Extracellular secretion marker of oral squamous cell carcinoma cells

○恩田 健志¹、林 幸央¹、関川 翔一¹、松本 暢久¹、
渡部 幸央¹、高野 伸夫²、柴原 孝彦^{1,2}

¹東京歯科大学 口腔顎顔面外科学講座、²東京歯科大学 口腔がんセンター

Takeishi Onda¹, Kamichika Hayashi¹, Syouchi Sekikawa¹, Nobuhiko Matsumoto¹, Yukio Watabe¹, Nobuo Takano², Takahiko Shibahara^{1,2}
¹Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Tokyo Dental College, ²Oral Cancer Center, Tokyo Dental College

【目的】癌細胞が恒常的かつ特異的に細胞外に分泌する分子を高感度に検出できれば、低侵襲な癌診断に応用できる。我々はプロテオーム解析から口腔扁平上皮癌細胞が発現異常を示す92種類のタンパク質群を同定し報告してきた。本研究ではこの中からターゲットとなり得る細胞外分泌マーカーの抽出を試みた。【材料および方法】プロテオーム解析によりリストアップした発現異常分子についてKeyMolnet®softwareを用いて(1)局在情報「Extracellular」をもつ分子(2)(1)を制御している分子(3)Exocytosisと関連する分子群に至る制御関係(4)分泌と関連する分子群に至る制御関係について解析した。【結果】(1)28種類のタンパク質が抽出された。(2)(1)を直接調節している上流分子はAnnexinシグナル伝達に属する分子が多かった。(3)Exocytosis関連分子との直接制御関係を探索した結果、Annexinシグナル伝達、HSP90シグナル伝達の関与がみられた。(4)分泌関連分子との直接制御関係を探索した結果、同様にAnnexin、HSP90シグナル伝達の関与がみられた。【考察】本研究により28種類の細胞外に局在するタンパク質群と、これらを制御する複数のパスウェイを抽出することが可能であった。これらのターゲットは、液体を用いた低侵襲な診断方法の開発に貢献できる可能性が示唆された。

P-18-1

邦人口腔扁平上皮癌における HRAS 遺伝子の
変異解析
Mutation analysis of the HRAS gene in Japanese oral squamous cell carcinoma

○内堀 雅博¹、青山 謙一³、梶原 景正²、金子 明寛¹、太田 嘉英¹、
木村 稔²

¹東海大学医学部 口腔外科、²東海大学医学部 基礎医学系分子生命科学、³東海大学医学部大磯病院 口腔外科

Masahiro Uchibori¹, Kenichi Aoyama³, Kagemasa Kajiwara², Akihiro Kaneko¹, Yoshihide Ota¹, Minoru Kimura²
¹Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Tokai University School of Medicine, ²Tokai University School of Medicine, Molecular Life Sciences, ³Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Tokai University School of Medicine Oiso Hospital

【目的】近年、頭頸部扁平上皮癌において、TP53など既知の癌関連遺伝子に加え、NOTCH1とHRAS遺伝子に高頻度の変異を認めると報告された(StranskyらScience 2011)。クロストークするとされるRASとNOTCH経路が口腔扁平上皮癌(OSCC)にどう関与するかを解析すべく、われわれは臨床・基礎両面からアプローチし、その手始めとしてNOTCH1の変異解析を行い、細胞外領域のリガンド結合領域においてアミノ酸変異を伴う新規の変異を9.5%と高頻度に発見した(AoyamaらBBRC 2014)。今回はHRASの変異解析を行った。【対象・方法】2010年4月から2012年12月までに東海大学医学部付属病院口腔外科で根治的手術を行った84症例のOSCC新鮮患者を対象とし、腫瘍組織および正常粘膜の凍結保存試料を採取した。ゲノムDNAを抽出し、HRAS変異のhot spotとされるコドン12、13、59、61を含むExon2、3に対しPCRを行い、サンガー法により配列を解析した。【結果】HRAS変異は1症例(1.2%)に認められ、G>T transitionであり、アミノ酸変異(p.Gly13Val)を伴い、既報の変異例と同じであった。諸外国と比較し変異率は低かった。変異症例は、pT2N2bMO stage4Aの左舌癌で、初回に手術療法行うも、再発転移を繰り返し、手術、化学、放射線療法に治療抵抗性を示し、初診より3年3カ月で死亡した予後不良症例であった。【結論】日本人のOSCCにおいて、既報の変異と同一のHRASの変異を認めた。変異症例は予後不良であった。

P-17-1

NDRG2 は口腔癌の発癌およびリンパ節転移
に関与する癌抑制遺伝子の候補となりうる
NDRG2 can be a candidate tumor suppressor genes
involved in carcinogenesis and lymph node metastasis of
oral cancer

○田村 知文¹、市川 朝永²、田川 友梨¹、近藤 雄大¹、長井 健太郎¹、
森下 和広²、山下 善弘¹

¹宮崎大学医学部 歯科口腔外科、²宮崎大学医学部 腫瘍生化学分野

Tomohiro Tamura¹, Tomonaga Ichikawa², Yuri Tagawa¹, Yudai Kondou¹, Kentarou Nagai¹, Kazuhiro Morishita², Yoshihiro Yamashita¹
¹Oral And Maxillofacial Surgery, Faculty of Medicine, Miyazaki, Japan, ²Division of Tumor and Cellular Biochemistry, Faculty of Medicine, Miyazaki, Japan

N-myc down-stream-regulated gene 2(NDRG2)は様々なタイプの癌において、がん抑制遺伝子の候補として報告されている。我々は過去にAdult T-cell leukemia/lymphoma(ATLL)とoral squamous-cell carcinoma(OSCC)において、NDRG2ががん抑制遺伝子の候補であり、PTENリン酸化によるPI3K/Akt経路のシグナル伝達の調整が可能であることを報告した。NDRG2欠損マウスでは、T細胞リンパ腫、肺癌、肝細胞癌といった様々なタイプの腫瘍を発症し、すべての器官においてAktとGSK3βのリン酸化の亢進を伴っていた。OSCC発症におけるNDRG2の機能を調べるため、我々は4-nitroquinoline-1-oxide(4-NQO)誘導OSCCモデルを利用した。4-NQOを投与したNDRG2欠損マウスにおいて腫瘍発生、悪性度やリンパ節転移の増加を認めた。さらに、NDRG2は4-NQOによるAkt経路とTGFβによるEMT経路の活性化を抑制した。これらのデータは、NDRG2の欠失は、Akt経路の活性化によりOSCCを含む様々なタイプの腫瘍の発症とEMT経路を介したリンパ節転移の促進的な役割を果たしていることを示した。

P-18-2

口腔扁平上皮癌におけるΔNp63を介した浸潤・
転移の分子機構に関する研究
~ Wnt5a-Ror2シグナル経路との関連 ~

A study on molecular mechanisms of invasion and metastasis by deltaNp63 in oral squamous cell carcinoma-relations with Wnt5a-Ror2 signaling -

○坂本 泰基¹、川野 真太郎¹、松原 良太¹、後藤 雄一²、神野 哲平¹、
丸瀬 靖之¹、金子 直樹¹、橋口 有真¹、大部 一成¹、中村 誠司¹

¹九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座顎顔面腫瘍制御学分野、²鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 顎顔面機能再建学講座顎顔面疾患制御学分野

Taiki Sakamoto¹, Shintaro Kawano¹, Ryota Matsubara¹, Yuichi Goto², Teppei Jinno¹, Yasuyuki Maruse¹, Naoki Kaneko¹, Yuma Hashiguchi¹, Kazunari Oobu¹, Seiji Nakamura¹

¹Section of Oral and Maxillofacial Oncology, Division of Maxillofacial Diagnostic and Surgical Sciences, Faculty of Dental Science, Kyushu University, Fukuoka, Japan, ²Department of Maxillofacial Diagnostic and Surgical Science, Field of Oral and Maxillofacial Rehabilitation, Kagoshima University Graduate School of Medical and Dental Sciences, Kagoshima, Japan

【目的】これまで我々は、ΔNp63の発現減弱により口腔扁平上皮癌(OSCC)細胞に上皮間葉転換が誘導され、浸潤・遊走能が高まることを示してきた。しかし、その分子機構は不明なままである。そこで今回、OSCC細胞におけるΔNp63を介した浸潤・遊走能の分子機構について検討した。【材料および方法】ΔNp63低発現OSCC細胞株であるSQUU-B細胞にΔNp63を過剰発現させた細胞株(SQUU-BO)と陰性対照細胞株(SQUU-BC)を用いてマイクロアレイ解析を行い、浸潤・遊走能に関わる遺伝子を同定した。次に、5種類のOSCC細胞株(HSC-2、-3、SAS、SQUU-A、SQUU-B)を用いて、同定した遺伝子の発現をRT-PCR法、real-time PCR法にて検索した。さらに、OSCC生検材料を用い、その発現を免疫組織化学的に検索した。【結果】マイクロアレイ解析よりWnt5aを同定し、その受容体Ror1、2とともにOSCC細胞株における発現を検索したところ、Wnt5aおよびRor2はSQUU-B細胞で最も発現が強く、他のOSCC細胞株ではほとんど発現を認めず、SQUU-BO細胞では発現量は有意に低下していた。一方、Ror1は各細胞間で発現に差を認めなかった。そこで、OSCC生検組織におけるWnt5aおよびRor2の発現を免疫組織化学的に検索したところ、どちらも癌組織に強く発現が認められた。【考察】OSCCにおいて、Wnt5a-Ror2の発現はΔNp63によって制御されており、その発現亢進が浸潤・遊走能亢進に関与している可能性が示唆された。

P-19-1

肺転移をきたした高齢者の下顎悪性エナメル上皮腫の1例

A case of mandibular malignant ameloblastoma with pulmonary metastases in the elderly

○緒方 絹子、岩本 修、東 拓弥、原田 真知子、武富 孝治、楠川 仁悟

久留米大学医学部 歯科口腔医療センター

Kinuko Ogata, Osamu Iwamoto, Takuya Higashi, Machiko Harada, Takaharu Taketomi, Jingo Kuskawa
Dental and Oral Medical Center, Kurume University School of Medicine

【緒言】再発を繰り返した下顎骨エナメル上皮腫が肺転移をきたした高齢者の下顎悪性エナメル上皮腫の1例を経験したので報告する。

【症例】患者：81歳、男性。現病歴：2009年5月左下顎骨エナメル上皮腫に対し摘出搔爬術を施行。2010年10月再発し左下顎区域切除術、腸骨移植術を行った。2013年4月左頬粘膜に再発、2014年3月に再々発し腫瘍切除を行った。さらに2014年11月左下顎骨離断部に再発したが積極的な治療を希望しなかった。しかし、2015年4月頃より急激に増大し左顔面皮膚へ及ぶ小児頭大の腫瘍を認めた。また両側肺野に転移と思われる点状結節が多数確認された。下顎骨病変部の生検ではAmeloblastoma, Follicular typeであった。下顎悪性エナメル上皮腫の診断にて、下顎顔面部に対して放射線治療計60Gyを行ったところ、原発巣は著明に縮小した。現在照射終了後1ヶ月であり、今後は肺病変も含めて慎重な経過観察を行う予定である。

P-19-3

乳癌におけるPCP4/PEP19の浸潤転移、細胞形態、接着への関与

The role of PCP4/PEP19 in the invasion, metastasis, and adhesion in breast cancer

○吉村 卓也、比地岡 浩志、石田 喬之、久米 健一、中村 典史
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 顎顔面機能再建学講座 口腔顎顔面外科学分野

Takuya Yoshimura, Hiroshi Hijioka, Takayuki Ishida, Kenichi Kume, Norifumi Nakamura
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Field of oral and maxillofacial Rehabilitation, Kagoshima University Graduate School of Medical and Dental Sciences, Kagoshima, Japan

【緒言および目的】PEP19は小脳で特異的に発現し、抗アポトーシス機能を持つとされており、我々はこれまでに乳癌における発現と抗アポトーシス作用について報告してきた。しかし未だ不明な点は多く、今回、PEP19の新たな機能・メカニズムを解明することを目的とした。【材料および方法】乳癌細胞株MCF7を用い、PEP19とBmi-1をKnockdownする(si-PEP19、si-Bmi-1)ことで細胞に与える影響をreal-time PCR、Western Blot、wound healing assay、浸潤試験、免疫染色、RhoA/Cdc42/Rac1活性化実験、細胞接着実験、細胞周期分析を用いて評価した。【結果】si-Bmi-1ではPEP19の有意な発現減少を認め、si-PEP19ではBmi-1の減少も認めた。両群ともにWestern BlotにてEMT関連タンパクの発現変化を認め、機能的にも遊走能、浸潤能の有意な減少を認めた。細胞形態は両群とも敷石状へと変化し、filopodia様突起の数は減少したが、si-Bmi-1ではRhoA/Cdc42/Rac1の活性変化を認め、これに対し、si-PEP19では変化がなかった。またsi-PEP19細胞を再播種すると接着能が低下し、接着した細胞でもsubG1期が増加していた。【結論】PEP19は乳癌において細胞形態、遊走能、浸潤能、接着能にも影響している可能性が示唆された。また、唾液腺癌サンプルにおいてPEP19の発現増強を確認しており、今後は唾液腺癌における研究も行う予定である。

P-19-2

デンタルインプラント周囲粘膜に生じた下顎歯肉扁平上皮癌の1例

A case of mandibular squamous cell carcinoma arising in the dental implant surrounding mucosa

○森寺 邦康、野口 一馬、高岡 一樹、岸本 裕充
兵庫医科大学 歯科口腔外科学講座

Kuniyasu Moridera, Kazuma Noguchi, Kazuki Takaoka, Hiromitsu Kishimoto
Departments of Dentistry and Oral Surgery, Hyogo College of Medicine

【はじめに】デンタルインプラントは欠損補綴の有効な治療法の1つとして確立しているが、インプラント周囲に悪性腫瘍が発生した報告も散見される。今回われわれは、インプラント周囲歯肉に、下顎歯肉癌が生じた1例を経験したので報告する。【患者】78歳、女性。【主訴】下顎歯肉痛。【現病歴】2010年に、42T24部にインプラントを埋入し6-6までの術者可撤式補綴物を装着した。左下6遠心頬側歯肉の白色病変を認め、2013年6月に紹介来科した。扁平苔癬の診断で経過観察中に同病変が肥厚し、2014年10月に全摘出した。病理診断は上皮過形成であった。2015年3月に左下4部歯肉腫瘍を生じ、かかりつけ医のCTで、インプラント周囲の骨吸収像を認め、インプラント周囲炎と診断された。上部構造をいったん撤去したところ、左下4部のインプラントが脱落した。腫瘍が改善しないため、同年6月に当科を受診した。【現症】左下4から6相当歯槽頂部に周囲に硬結を伴う腫瘍を形成。左下4部の骨吸収は下顎骨に達していた。【処置および経過】生検の結果、下顎歯肉扁平上皮癌(cT4aNOMO, StageIVa)の診断で、7月に下顎骨区域切除術、左側頸部郭清術、遊離腓骨皮弁による再建術を施行し、術後経過良好である。【考察】インプラント周囲の骨吸収が生じた場合、インプラント周囲炎と安易に判断せず、悪性腫瘍の可能性も考慮して、慎重に対応する必要がある。

P-19-4

上顎臼歯部顎堤に生じたoral focal mucinosisの一例

A case of oral focal mucinosis of the upper molar region

○高橋 紗也子^{1,2}、五味 暁憲^{1,2}、井出 宗則³、内山 壽夫¹、横尾 聡²

¹前橋赤十字病院 歯科口腔外科、²群馬大学大学院医学系研究科 顎口腔科学分野、³前橋赤十字病院 病理診断科

Sayako Takahashi^{1,2}, Akinori Gomi^{1,2}, Munenori Ide³, Toshio Utiyama¹, Satoshi Yokoo²
¹Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Maebashi Red Cross Hospital, Maebashi, Japan, ²Department of Stomatology and Maxillofacial Surgery, Gunma University Graduate School of Medicine, Maebashi, Japan, ³Department of Pathology, Maebashi Red Cross Hospital, Maebashi, Japan

【緒言】Oral focal mucinosis(以下、OFM)は、1974年にTomichが最初に報告した稀な疾患である。われわれは、左側上顎臼歯部顎堤に発生したOFMの1例を経験したので、その概要を報告する。【症例】67歳女性。左側上顎臼歯部顎堤の腫瘍形成を主訴に受診した。同部に14×8×4mm、弾性硬、表面ほぼ平滑で、広基性、有茎性の腫瘍を認めた。CTでは腫瘍に一致した骨吸収が認められた。MRIではT1、T2ともに高信号であった。生検にてOFMの病理診断を得たため、摘出の方針とした。摘出術は外来局所麻酔下に行った。腫瘍周囲2mmの安全域を設け、骨膜下で剥離し摘出した。定期観察しているが再発は認められない。【考察】OFMは特異的な臨床所見がなく、病理組織診断は必須とされている。本症例の場合、腫瘍に一致した骨吸収が認められたことから腫瘍性病変を疑い、病理検査でOFMの確定診断後に治療方針を決定した。OFMは紡錘形の線維芽細胞が何らかの要因により粘液基質を過剰産生し蓄積されて生じると考えられている。本症例では粘液基質はPAS染色に陰性で、Alcian blue染色で陽性である酸性ムコ多糖類の粘液が認められ、OFMの特徴とされる病理所見と一致した。【結論】左側上顎臼歯部顎堤に生じたOFMの1例を経験したので報告した。

P-19-5

肺好酸球性肉芽腫症を併発した舌癌の 1 例

A case of tongue cancer with pulmonary eosinophilic granuloma

○伊原木 聡一郎、吉岡 徳枝、奥井 達雄、國定 勇希、志茂 剛、佐々木 朗

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 腫瘍制御学講座口腔顎顔面外科学分野

Soichiro Ibaragi, Norie Yoshioka, Tatsuo Okui, Yuki Kunisada, Tsuyoshi Shimo, Akira Sasaki
Department of Oral and Maxillofacial Surgery Okayama University Graduate School of Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences, Okayama, Japan

【緒言】肺好酸球性肉芽腫症は、ランゲルハンス細胞の非腫瘍性増殖と好酸球浸潤を特徴とする原因不明の疾患である。多くの症例が喫煙歴を有し喫煙が誘因と考えられる。今回われわれは、肺好酸球性肉芽腫症を併発した舌癌の 1 例を経験したので、その概要を報告する。**【症例の概要】**症例：68 歳、男性。主訴：乾性咳嗽。既往歴：高血圧、高脂血症。喫煙歴：20 本/日×40 年。2012 年 10 月に禁煙し最近喫煙を再開していた。現病歴：右側舌癌 (cT3N0M0) に対して 2012 年 10 月舌部分切除術、肩甲舌骨筋上郭清術を施行した。術後補助化学療法として TS-1 内服を行った。口腔内所見：舌に再発は認めなかった。画像所見：2015 年 2 月 CT で両肺野に多発結節を、PET-CT で FDG 集積を認めた。臨床診断：多発肺転移。処置および経過：呼吸器内科に対診し CT ガイド下で肺生検を施行した。病理学的診断：好酸球性肉芽腫症。禁煙後、両肺野の結節は縮小傾向にあるため経過観察中である。**【考察】**肺好酸球性肉芽腫症と口腔癌はいずれも喫煙が危険因子と考えられるため、併発例は多いと考えられたが、今までの報告例は 1 例のみであった。併発した場合、口腔癌の肺転移と肺好酸球性肉芽腫症の鑑別は困難である。肺好酸球性肉芽腫症の予後は良好で禁煙により自然寛解することもあるが、呼吸不全により死亡に至る症例もあるため、早期診断が必要であると考えられた。

P-19-7

BRONJ に fibrosarcoma が併発した一例

Fibrosarcoma complicated by bisphosphonate-related osteonecrosis of the maxilla

○桐生 萌、石原 修、山田 龍平、大竹 一平、泉山 大介、平田 真弓

大阪府立急性期総合医療センター 口腔外科

Megumi Kiri, Osamu Ishihara, Ryuhei Yamada, Ippei Otake, Daisuke Izumiyama, Mayumi Hirata
Osaka General Medical Center Oral and Maxillofacial surgery, Osaka, Japan

【緒言】今回我々は結節性多発動脈炎にて PSL, MTX, Bp 製剤内服中の患者に発生した BRONJ の手術標本に fibrosarcoma が混在していた症例を経験しその概要を報告する。**【症例】**77 歳男性。2014 年 6 月頃に上顎左側臼歯部の疼痛を自覚し近医歯科受診。経過観察を行うが同年 8 月頃に同部に 10×8mm の骨露出を認め精査加療を目的に 8 月 29 日当院初診。**既往歴**：結節性多発動脈炎にて PSL, MTX, Bp 製剤内服。初診時所見：上顎左側側副歯肉より排膿を伴う疼痛、骨露出を認めた。レントゲン、CT 所見にて骨髄炎様病変を認めた。**経過**：上顎歯肉の生検にて MTX-LPD は否定され、BRONJ の診断のもと抗菌薬加療開始するが 10 月頃より骨露出部の拡大、12 月頃より瘻孔および鼻瘻を認めるようになった。2015 年 7 月 27 日全身麻酔下にて上顎骨腐骨、上顎洞炎、上顎洞瘻孔に対し周囲肉芽組織を含めた上顎骨腐骨除去術、上顎洞根治術、瘻孔閉鎖術を施行。病理組織検査の結果、腐骨や肉芽組織の中に少量ではあるが核分裂像を伴う異型細胞の胞巣を認め fibrosarcoma と診断を受けた。術後、全身 CT および PET 検査を施行したが遠隔転移や腫瘍残存所見は認めず、今後も厳重な経過観察を予定している。**【結語】**Bp 製剤投与患者に発生した骨露出の周辺に炎症性肉芽形成を認める頻度は高い。自験例では MTX を服用していたために生検を施行したが MTX-LPD は認めず、BRONJ と fibrosarcoma が併発していた極めてまれな症例と考えられた。

P-19-6

小腸転移による消化管穿孔をきたした上顎歯肉癌の 1 例

A case of perforation of the small intestine by metastasis of squamous cell carcinoma of the upper gingiva

○山本 大介、長谷川 利聡、目瀬 浩
福山市民病院 歯科口腔外科

Daisuke Yamamoto, Kazuaki Hasegawa, Hiroshi Mese
Dentistry and Oral Surgery, Fukuyama City Hospital, Hiroshima, Japan

【緒言】口腔癌の遠隔転移は肺、肝、骨、脳、皮膚などの臓器への転移が多く消化管への転移の頻度は極めて少ない。今回われわれは、小腸転移による穿孔性腹膜炎を生じた上顎歯肉癌の 1 例を経験したので報告する。**【症例の概要】**患者は 86 歳男性。初診：2014 年 5 月。主訴：上顎歯肉の腫脹。現病歴：上顎前歯部歯肉に 34×18mm の易出血性腫瘍を認めた。既往歴：原発性肺癌、前立腺肥大、虫垂炎。処置および経過：生検結果は上顎歯肉扁平上皮癌。CT 検査にて上顎歯槽骨は破壊され一部鼻腔にも浸潤あり T4aN0Mx の診断のもと上顎部分切除術施行。術後 1 週目に消化管出血を認め内科対診し内視鏡 (上部) 施行し逆流性食道炎にてプロトンポンプ阻害薬投与と輸血継続。術後 5 週目より放射線療法を開始するも、6 週目に下腹部痛が出現し 8.8Gy にて中止。CT 検査にて右側上腹部に遊離ガスを認め消化管穿孔と急性汎発性腹膜炎と肝転移を指摘され外科対診。緊急開腹手術 (小腸部分切除・バイパス術) 施行、小腸腫瘍よりの消化管穿孔と腹膜播種が確認された。病理組織診断の結果、上顎歯肉扁平上皮癌の小腸転移と診断された。術後 11 週目に在宅訪問診療の支援あり自宅療養のため退院。術後 6 か月経過し上顎歯肉癌の再発は認めなかったが、徐々に全身状態悪化し呼吸不全にて死亡した。**【結語】**口腔癌の小腸転移はまれであるが突然の腹痛を認めたときは、小腸転移の穿孔の可能性も念頭に置いた全身検査が必要である。

P-19-8

歯肉溝上皮から発生したと考えられた 19 歳女性の下顎歯肉扁平上皮癌の 1 例

A case of squamous cell carcinoma of the lower gingiva possibly occurred from oral sulcular epithelium in a 19-years-old woman

○東 拓弥、緒方 絹子、原田 真知子、武富 孝治、岩本 修、楠川 仁悟

久留米大学医学部 歯科口腔医療センター

Takuya Higashi, Kinuko Ogata, Machiko Harada, Takaharu Taketomi, Osamu Iwamoto, Jingo Kusukawa
Dental and Oral Medical Center, Kurume University School of Medicine

【緒言】歯肉溝上皮から発生したと考えられた 19 歳女性の下顎歯肉扁平上皮癌の 1 例を経験したので報告する。**【症例】**患者：19 歳、女性。**【現病歴】**2012 年 11 月初旬に左下顎臼歯部歯肉の腫瘍形成と鈍痛を認めた。近歯科医院を受診したところ、悪性腫瘍を疑われ精査加療目的に当科紹介受診。**【現症】**7 舌側歯肉に局限した約 10mm×5mm で健常粘膜で覆われた腫瘍を認め、同部の歯肉溝には乳頭状腫瘍が認められた。**【処置】**生検にて高分化型扁平上皮癌との診断にいたり、全身麻酔下で下顎部分切除を行った。**【病理】**歯肉外縁上皮の基底膜は保たれており、歯肉溝上皮と連続する癌胞巣を認め、歯肉溝上皮からの発生が考えられた。現在、術後 2 年 9 か月が経過し再発、転移はなく、良好に経過している。

P-19-9 肝転移を来した下顎骨原発性骨内扁平上皮癌の1例
A Case of Liver Metastasis from Primary Intraosseous Squamous Cell Carcinoma of the Mandible

○白水 敬昌、寺沢 史誉、服部 晴吉、足立 潤也、内藤 裕嗣
豊橋市民病院 歯科口腔外科

Takamasa Shirozu, Fumitaka Terasawa, Haruyoshi Hattori, Junya Adachi, Hirotsugu Naitoh
Dept. of Oral and Maxillofacial Surgery, Toyohashi Municipal Hospital, Aichi, Japan

【緒言】扁平上皮癌が歯原性上皮を由来として顎骨中心性に発生することがまれにあり、2005年のWHO歯原性腫瘍組織分類からは原発性骨内扁平上皮癌(PIOSSC)と呼称され、その高い悪性度は周知の通りである。日本臨床腫瘍学会による2015年頭頸部がん薬物療法ガイドランスでは、再発・転移頭頸部がん(R/M SCCHN)の標準的初回薬物療法として、CDDP+5-FU+セツキシマブのBio-Chemotherapy(BCT)を「科学的根拠があり、行うよう勧められる」と記載している。今回われわれは一次治療後に肝転移を来した下顎骨PIOSSCに対して、BCTを施行し良好に経過した症例を経験したため報告する。

【症例と経過】症例：64歳・男性、主訴：左顎下部の腫脹。当院耳鼻科で原発不明のSCCリンパ節転移と診断され、原発巣精査目的で当科を受診した。口腔粘膜には異常はなく、左下顎智歯抜歯窩からの生検で、下顎骨内PIOSSCと診断し原発巣を確定した。DTX+CDDPによる導入動注化学放射線療法後に下顎辺縁切除術を施行した。治療後は局所再発等なく経過良好であったが、血清CEA値の経時的な増加があったため消化器内科を対診した。CT、PET-CTにて肝実質内に多発性の占拠性病変が発見され、肝生検によってSCCの肝転移と診断された。BCTを施行したところ著明にCEA値が減少し、画像上でもほぼCRとなった。有害事象としては一時的な血球減少とご瘡様皮疹、爪囲炎のみであった。BCTを施行した肝転移R/M SCCHN症例を報告する。

P-19-11 口腔に発生したリンパ上皮性嚢胞の2例
Lymphoepithelial cysts of the oral cavity; Report of two cases

○松本 暢久、林 幸央、恩田 健志、渡部 幸央、柴原 孝彦
東京歯科大学歯学部 口腔顎顔面外科学講座

Nobuhiko Matsumoto, Kamitika Hayashi, Takeshi Onda, Yukio Watabe, Takahiko Sibahara
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Tokyo Dental College, Tokyo, Japan

【緒言】リンパ上皮性嚢胞は、側頸嚢胞や鰓嚢胞とも呼称され、多くは側頸部に発生し、病理組織学的には嚢胞上皮直下にリンパ濾胞の形成を特徴とする疾患である。口腔内に発生する事は稀である。今回、口腔内に発生したリンパ上皮性嚢胞の2例を経験したので報告する。【症例1】45歳男性。上顎前歯部歯肉類形部の腫瘍を主訴として来院した。左側上顎口腔前庭部に類円形の直径5mm大の境界明瞭、可動性、弾性硬な腫瘍を認めた。局所麻酔下に摘除生検施行し、病理組織検査でリンパ上皮性嚢胞と診断した。現在まで再発なく経過良好である。【症例2】74歳女性。舌下面の腫瘍を主訴として来院した。右側舌下部に類円形の直径8mm大の境界明瞭、可動性、弾性硬な腫瘍を認めた。局所麻酔下に摘除生検施行し、病理組織検査で、リンパ上皮性嚢胞と診断した。現在まで再発なく経過良好である。【考察】口腔内に発生するリンパ上皮性嚢胞の発生機序に関しては不明な点が多く、定説をみないのが現状である。種々の臨床所見からリンパ上皮性嚢胞と診断する事は困難であり、腫瘍として外科的切除される事が多く、全摘すれば再発は無く予後は良好であるとされる。自験例においても病変と被覆粘膜上皮を含め周囲常組織と一塊として切除し、いずれも現在まで再発は認めない。しかしながら、鰓嚢胞からはいわゆる鰓原性癌が発生するとの報告もあり、慎重な経過観察が必要であると考えられた。

P-19-10 上顎歯肉に発症したメトトレキサート関連リンパ増殖性疾患の1例
A case of methotrexate-associated lymphoproliferative disorder in the maxillary gingiva of the RA patient

○古川 祥子¹、大部 一成¹、林田 淳之将¹、佐古 沙織¹、森山 雅文¹、新井 伸作¹、松原 良太¹、清島 保²、中村 誠司¹

¹九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座顎顔面腫瘍制御学分野、²九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座口腔顎顔面病態病理学分野

Sachiko Furukawa¹, Kazunari Oobu¹, Jun-Nosuke Hayashida¹, Saori Sako¹, Masafumi Moriyama¹, Shinsaku Arai¹, Ryota Matsubara¹, Tamotsu Kiyoshima², Seiji Nakamura¹
¹Section of Oral and Maxillofacial Oncology Division of Maxillofacial Diagnostic and Surgical Sciences Faculty of Dental Science, Kyushu University, ²Laboratory of Oral Pathology and Medicine, Department of Maxillofacial Diagnostic and Surgical Sciences, Faculty of Dental Science, Kyushu University

【緒言】メトトレキサート(MTX)は関節リウマチ(RA)に対する治療薬であるが、近年MTX投与患者でリンパ増殖性疾患の合併が報告されるようになり、MTX関連リンパ増殖性疾患(MTX-LPD)と呼ばれている。MTX-LPDは節外症状を呈することが多く、口腔顎顔面領域における発生はまれである。今回、MTX投与患者の上顎歯肉に発生したMTX-LPDを経験したので報告する。【症例】患者：81歳、女性。主訴：左側上顎歯肉側側歯肉の潰瘍。内服薬：RAに対し6年前からBP製剤およびMTX服用中。初診時、¹4567の側側歯肉を中心に壊死を伴う歯肉潰瘍を認め、周囲には軽度硬結を認めた。²4567部は歯根と歯槽骨が露出していた。細胞診で異型を伴うリンパ球を認めたため、悪性疾患を疑い組織生検を施行、EBV陽性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫の診断を得た。PET検査では左側上顎歯肉部以外の領域には集積を認めなかった。血液腫瘍内科に対診した結果MTX-LPDが疑われたためMTXを中止したところ、歯肉潰瘍は徐々に縮小していった。現在のところ潰瘍の拡大およびRAの増悪ともに認めていない。【結論】MTXの口腔内に症状を呈する副作用には口内炎やリンパ増殖性疾患がある。またRA患者はステロイド剤やBP製剤が投与されていることが多いため、多様な口腔症状を伴うことがあることを念頭に置く必要がある。

P-19-12 岡山大学病院口腔がん専門外来と岡山市歯科医師会の連携による口腔がん検診研修会の概要とアンケート結果について
Seminars on oral cancer screening held by outpatient clinic specialized in oral cancer in Okayama University Hospital cooperated with Okayama City Dental Association and their questionnaire survey results

○岸本 晃治¹、西山 明慶¹、松村 達志²、伊原木 聡一郎¹、銅前 昇平¹、吉岡 徳枝¹、志茂 剛¹、中野 敬介³、長塚 仁³、飯田 征二²、佐々木 朗¹

¹岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 口腔顎顔面外科学分野、²岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 顎口腔再建外科学分野、³岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 口腔病理学分野

Koji Kishimoto¹, Akiyoshi Nishiyama¹, Tatsushi Matsumura², Soichiro Ibaragi¹, Shohei Domeae¹, Norie Yoshioka¹, Tsuyoshi Shimo¹, Keisuke Nakano³, Hitoshi Nagatsuk³, Seiji Iida², Akira Sasaki¹
¹Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Okayama University Graduate School of Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences, ²Department of Oral and Maxillofacial Reconstructive Surgery, Okayama University Graduate School of Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences, ³Department of Oral Pathology, Okayama University Graduate School of Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences

【緒言】岡山大学病院口腔がん専門外来は岡山市歯科医師会と連携し、開業歯科医師を対象に口腔がん検診研修会を2013年3月より行っている。これまでに本研修会を4回開催し計50名が研修を修了したので、その概要と受講者に実施したアンケートの集計結果を報告する。また、本年度より細胞診の実習も行うようになったので併せて報告する。【研修会の概要】研修会は、平日の2日間を利用し1日2時間の計4時間とし、講義と実習を行った。講義内容は、口腔がん概論、鑑別診断と具体的対応、症例提示、予診票・問診票・検診票について記入の要点説明、検診方法の説明とビデオ視聴である。実習内容は、症例を提示しての検診票の記入実習および検診・触診の方法の実習である。

【アンケート内容と集計結果】アンケート内容は、受講者の臨床経験年数、専門領域、研修会の有益性、口腔がんに遭遇した経験の有無等である。集計の結果、総数は50(複数回の受講者あり)、臨床経験年数は8~42年(中央値23.2年)、専門領域は全員GPであり、口腔がんに遭遇した経験有り34人・無し16人であった。本研修会の時間・レベル・内容は概ね適切であるとの回答を得たが、内容にできるだけ多くの症例写真を組み込みで欲しいとの要望が多かった。

【結語】現在、研修内容の改善を検討しているが、より実践的な内容を増やすとともに、前癌病変の段階からの診断能力を養う内容も盛り込んでいく必要があると考えられる。

P-19-13 両側舌縁部脂肪腫症の 1 例
Bilateral lipomatosis of the tongue: a case report

○見立 英史¹、川野 真太郎¹、前原 隆¹、後藤 雄一²、清島 保³、河津 俊幸³、中村 誠司¹

¹九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座顎顔面腫瘍制御学分野、²鹿児島大学大学院歯学総合研究科 顎顔面機能再建学講座顎顔面疾患制御学分野、³九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座口腔病理学分野、⁴九州大学大学院歯学研究院 口腔顎顔面病態学講座口腔画像情報科学分野

Eiji Mitate¹, Shintaro Kawano¹, Takashi Maehara¹, Yuichi Goto², Tamotsu Kiyoshima³, Toshiyuki Kawazu³, Seiji Nakamura¹
¹Section of Oral and Maxillofacial Oncology, Division of Maxillofacial Diagnostic and Surgical Sciences, Faculty of Dental Science, Kyushu University, Fukuoka, Japan, ²Department of Maxillofacial Diagnostic and Surgical Science, Field of Oral and Maxillofacial Rehabilitation, Graduate School of Dental Science, Kagoshima University, Kagoshima, Japan, ³Laboratory of Oral Pathology, Division of Maxillofacial Diagnostic and Surgical Sciences, Faculty of Dental Science, Kyushu University, Fukuoka, Japan, ⁴Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Faculty of Dental Science, Kyushu University, Fukuoka, Japan

脂肪腫症は非上皮性良性腫瘍であり、被膜を持たず、組織内にびまん性に浸潤する特徴がある。後頸部、肩部、背部に多くみられ、口腔領域ではまれである。アルコール多飲や脂質代謝障害等と関連が指摘されているが、成因についての詳細は不明である。今回われわれは両側舌縁部に発生した脂肪腫症の 1 例を経験したので報告する。

症例：71 歳の男性。2005 年頃から両側舌縁部の腫瘍を自覚したが、疼痛がないため放置していた。2008 年 8 月かかりつけの歯科医院にて精査を勧められ、2008 年 9 月当科初診。その後再来が途絶えたが、両側とも腫瘍が増大してきたため、2014 年 6 月に再来した。

両側舌縁部の腫瘍は、超音波検査では比較的明瞭な辺縁を認め、内部血流は乏しく、内部エコーは不均一であった。また MRI では T1WI、T2WI で高信号、脂肪抑制で信号低下を認めた。慢性心房細動に対してバイアスピリンを内服しており、術後の創部腫脹による気道閉塞を考慮して 2 回に分けて切除を計画した。2014 年 9 月に右側、2015 年 2 月に左側の腫瘍減量術を行なった。両側とも被膜を持たず、舌筋組織内にびまん性に浸潤していた。全摘出は困難と判断し、舌の形態を考慮した減量術とした。現在まで増大所見なく経過している。

1947 年から 2015 年の間に、両側舌縁部脂肪腫症は自験例を含め 46 例が報告されている。文献的考察と合わせて報告する。

P-19-15 舌背部に生じた原発性扁平上皮癌の 2 例
Two cases of primary carcinoma on the dorsum of the tongue

○森本 泰成¹、美馬 孝至¹、李 篤史¹、鏡内 肇²

¹NTT 西日本大阪病院 歯科口腔外科、²社会医療法人大道会森之宮病院 歯科診療部

Yasanari Morimoto¹, Takashi Mima¹, Atsushi Lee¹, Hajime Kagamiuchi²
¹Department of Oral and Maxillofacial Surgery, NTT West Osaka Hospital, Osaka, Japan, ²Department of Dentistry, Morinomiya Hospital

【緒言】口腔癌の 60% を占める舌癌の好発部位は側縁部であり、舌背部における発生頻度は稀である。われわれは舌背部に発生した舌扁平上皮癌を 2 例経験したのでその概要を報告する。【症例の概要】症例 1：66 歳男性。2007 年 6 月に舌背部の発赤を自覚し当院を受診する。舌背部に φ 20 × 12mm の隆起性のびらんを認めた。生検術を実施し、病理組織学的診断にて低分化型扁平上皮癌の診断を得た。同年 7 月に舌部分切除術、右側頸下部郭清術、前腕皮弁移植術を実施した。その後現在まで再発を認めていない。症例 2：57 歳女性。2014 年 5 月に右側舌縁部の疼痛を主訴に近医歯科を受診。扁平苔癬の疑いにて当科紹介となった。右側舌縁部に 20 × 10mm のびらん形成を認めた。その後 6 月頃より舌背部の腫瘍を自覚し、同年 9 月再診時に舌背正中中部有郭乳頭の前方に φ 8mm の境界明瞭な隆起性病変を認めた。2014 年 10 月に全麻下で全切除生検を実施したところ、低分化型扁平上皮癌の診断を得た。断端に上皮内癌を認めため、11 月に追加切除を実施、切除物内に腫瘍は認めなかった。その後現在に至るまで再発、転移所見は認めていない。【考察】舌背部に生じる悪性腫瘍の頻度はまれであるため、病変が小さく典型像に乏しい場合には診断を誤る可能性が報告されている。組織型が未確定な段階では、経過観察ではなく組織生検の必要性を認めた。【結語】舌背部に発生した舌扁平上皮癌の 2 例を経験したのでその概要を報告した。

P-19-14 下顎骨の原発性骨内扁平上皮癌と考えられた 3 例の検討
Clinical study on 3 cases of primary intraosseous squamous cell carcinoma of the mandible

○水野 貴行¹、榊原 典幸¹、加藤 卓己¹、坂田 健一郎¹、日笠 紘志¹、箕輪 和行²

¹日鋼記念病院 歯科口腔外科、²北海道大学大学院歯学研究科 口腔病態学講座歯科放射線学教室

Takayuki Mizuno¹, Noriyuki Sakakibara¹, Takumi Kato¹, Ken-ichiro Sakata¹, Hiroshi Hikasa¹, Kazuyuki Minowa²
¹Department of Dentistry and Oral Surgery, Nikko Memorial Hospital, Muroran, Japan, ²Dental Radiology, Department of Oral Pathobiological Science, Graduate School of Dental Medicine, Hokkaido University

【緒言】原発性骨内扁平上皮癌 (PIO SCC) は 2005 年 WHO 分類において歯原性癌腫の一つとして分類される顎骨内を原発として発生する扁平上皮癌で、比較的まれな疾患である。今回下顎骨の PIO SCC と考えられた 3 症例について検討した。【症例 1】75 歳男性。左側下顎臼歯部の無痛性腫脹で当科を紹介受診。左側下顎骨の PIO SCC、T4aNOMO にて術前照射後に手術。局所再発は認めなかったが、術後 8 か月目に右側下葉に肺転移を認め、化学放射線療法を施行。その 5 か月後には左側第 7 肋骨に転移し、2 ヶ月後に死亡した。【症例 2】54 歳女性。右側下顎歯肉の有痛性腫脹で紹介受診。右側下顎骨の PIO SCC、T4aNOMO にて術前照射後に手術。術後 1 年 7 か月を経過し局所再発、遠隔転移を認めていない。【症例 3】79 歳女性。近医歯科で左下 6 抜歯後の治癒不全およびオトガイ部皮膚知覚異常で紹介受診。左側下顎骨の PIO SCC、T4aNOMO にて術前照射後に手術。病理検査で頸部リンパ節レベル 1B、2A に計 4 個の転移を認めた。現在、術後 2 か月を経過し経過観察中である。手術は全症例に下顎区域切除、頸部郭清、遊離腓骨皮弁による下顎骨即時再建を施行した。【結語】PIO SCC は発見時に広範囲に進展していることが多く、本症例も全て T4 で、全症例で下顎区域切除が適応となった。

P-19-16 上口唇および口腔前庭の腫脹を伴った Trichofolliculoma の 1 例
A case of Trichofolliculoma

○竹内 豪、佐藤 文彦
一宮市立市民病院 歯科口腔外科

Go Takeuchi, Fumihiko Sato
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Ichinomiya Municipal Hospital, Aichi, Japan

【緒言】Trichofolliculoma は皮膚付属器由来の稀な過誤腫性病変である。臨床的には小結節で主に顔面に生じる。組織学的には囊様構造の中に角質塊、毛を含み毛包分化を示す細胞索が伸び毛乳頭に類似する構造を形成する。【症例】70 歳女性、初診の 1 週間前に近医歯科でマウスピースの作成をうけた後より右上口唇の腫脹を自覚し当院皮膚科を受診。上口唇および口腔前庭の腫脹のため当科に紹介された。XP にて歯と関連はなく、CT、MRI にて右上口唇に直径 15mm 大で球形の境界明瞭な充実性病変を認めた。なお、患者は 2 年前に当院耳鼻科および皮膚科にて右鼻腔内の疣贅の治療歴があり鼻前庭に癬痕形成を認めていた。鼻腔内疣贅の病理検査結果は verruca vulgaris であった。【経過】初診時に抗菌薬 (CFPN-PI) を処方。数日後に鼻前庭に排膿を認め縮小傾向となった。口唇腫瘍と考え静脈内鎮静法で歯肉頰移行部より切開し病変を切除した。病理検査にて上皮胞巣の辺縁では細胞が索状に配列し毛乳頭を模倣する構造を認め Trichofolliculoma と診断された。なお、病理組織学的に以前の鼻腔内の疣贅とは別の病変であると考えられた。【考察】本症は皮膚付属器由来の病変であるため口腔内に症状を呈することは稀である。鼻腔内の疣贅の治療歴があり、鼻前庭の癬痕のために病変が口腔前庭部に突出を認めた可能性がある。

P-19-17 舌癌の後発転移が疑われた顎下部リンパ上皮性嚢胞内の扁平上皮癌の1例
A case of malignant tumor of lymphoepithelial cyst in submandibular lesion

○秋森 俊行、志渡澤 和佳、原田 佳和、平島 惣一、宮脇 昭彦、大矢 亮一
産業医科大学病院 歯科口腔外科

Toshiyuki Akimori, Yawaka Shitozawa, Yoshikazu Harada, Soichi Hirashima, Akihiko Miyawaki, Ryoichi Oya
Department of Dentistry and Oral Surgery, University Hospital of Occupational and Environmental Health

【緒言】左側舌癌の経過観察中に、右顎下部に認められたリンパ上皮性嚢胞の一部が癌化した症例について報告する。【症例】63歳、女性。2011年5月、左側舌扁平上皮癌(T1N0M0)にて全身麻酔下で舌部分切除術を施行した。2012年10月、右顎下にCT上13.4×9.0mmのリングエンハンス様のリンパ節を認め、穿刺吸引細胞診を施行したが良性であった。2013年1月、CT上19.5×10.6mmへ増大した。原発不明嚢胞性リンパ節転移との鑑別のためFDG-PET検査を行ったが、同リンパ節はSUVmax=1.84の集積であり、他の頭頸部領域に異常集積はなかった。舌癌後発転移の疑いにて全身麻酔下にてリンパ節摘出術を施行した。術中迅速病理診断でリンパ上皮性嚢胞の診断を得た。しかし術後の永久標本で嚢胞壁の一部に扁平上皮癌を認め、リンパ上皮性嚢胞の癌化の診断であった。現在術後2年8か月経過するも経過良好である。【考察】リンパ上皮性嚢胞は比較的まれで、その悪性化は極めてまれである。頸部腫瘍の鑑別として、炎症性疾患、嚢胞性疾患、転移性腫瘍、原発性腫瘍が考えられる。本症例は舌癌の既往はあるが、健側のため舌癌からの転移は考えにくく、また頭頸部領域に原発巣はなく転移性腫瘍は否定的であった。また病理所見より嚢胞壁の一部に異型上皮と浸潤した扁平上皮癌を認めたことより原発性腫瘍と考えた。

P-19-19 原発不明の悪性黒色腫の1例
A case of malignant melanoma from an unknown primary site

○加須屋 浩、小谷 勇、土井 理恵子、谷尾 俊輔、藤井 信行、田村 隆行、領家 和男
鳥取大学医学部医学科 感覚運動医学講座 口腔顎顔面病態外科学分野

Hiroshi Kasuya, Isamu Kodani, Rieko Doi, Shunsuke Tanio, Nobuyuki Hujii, Takayuki Tamura, Kazuo Ryoke
Division of Oral and Maxillofacial Biopathological Surgery, Department of Medicine of Sensory and Motor Organs, School of Medicine, Tottori University Faculty of Medicine, Yonago, Japan

【緒言】悪性黒色腫は、皮膚・口腔粘膜などに発生するメラノサイト由来の腫瘍で、早期から血行性転移やリンパ行性転移をきたす予後不良の悪性腫瘍である。まれに原発巣が自然消滅し、原発不明の転移性腫瘍として発見されることがある。今回われわれは、顎下リンパ節に悪性黒色腫を認めた原発不明の1例を経験したのでその概要を報告する。【症例】患者:53歳、男性。平成23年12月、左顎下部の腫脹を主訴に当科を紹介受診した。初診時、左顎下部に拇指頭大と3mm大のリンパ節腫大を認め、CT、MRIでは、左顎下部にいくつかのリンパ節が癒合した腫瘍を認めた。平成24年1月に確定診断を得るため針生検を行い、悪性黒色腫リンパ節転移と診断し、PET-CTを行うも左顎下部にFDG集積を認めるのみで、原発巣を示す集積はなかった。DAV-Feron療法1クール行い、同年2月に左頸部郭清術と左下6舌側歯肉黒色斑の生検を施行した。黒色斑は金属沈着症との診断で原発巣の特定に至らなかった。術後補助療法としてDAV療法6クール行ったが、平成24年10月にMRIにて左下顎枝内側に転移を疑う所見を認め、左下顎骨半側切除術を行った。同年11月に肺転移が見られ、DAC-Tam療法3クール行い、左顎下部腫瘍再発・転移巣の増大を認め平成25年8月に死亡した。剖検を行ったが、原発巣は特定できなかった。

P-19-18 関節リウマチ患者の口蓋・顔面腫瘍で発見されたMTX関連リンパ増殖性疾患(MTX-LPD)の1例
Methotrexate-associated lymphoproliferative disorder (MTX-LPD) initially manifested as a maxillofacial tumor of a patient with rheumatoid arthritis: report of a case

○新美 奏恵¹、新垣 晋¹、三上 俊彦¹、船山 昭典¹、小林 正治¹、西山 秀昌²、林 孝文²、山崎 学³、丸山 智⁴

¹新潟大学大学院医歯学総合研究科 組織再建口腔外科学分野、²新潟大学大学院医歯学総合研究科 顎顔面放射線学分野、³新潟大学大学院医歯学総合研究科 口腔病理学分野、⁴新潟大学医歯学総合病院 歯科病理検査室

Kanae Niimi¹, Susumu Shingaki¹, Toshihiko Mikami¹, Akinori Funayama¹, Tadaharu Kobayashi¹, Hideyoshi Nishiyama², Takafumi Hayashi², Manabu Yamazaki³, Satoshi Maruyama⁴
¹Division of Reconstructive Surgery for Oral and Maxillofacial Region, Niigata University Graduate School of Dentistry, ²Division of Oral and Maxillofacial Radiology, Niigata University Graduate School of Dentistry, ³Division of Oral Pathology, Niigata University Graduate School of Dentistry, ⁴Oral Pathology Section, Department of Surgical Pathology, Niigata University Hospital

メトトレキサート(MTX)は関節リウマチ(RA)の第一選択薬として頻用されるが、長期投与でMTX関連リンパ増殖性疾患(MTX-LPD)を発症する。われわれは口腔顔面部腫瘍でMTX-LPDと診断された1例を経験したので報告する。【症例】60歳代、女性。【主訴】口蓋右側と左鼻翼基部の腫脹。【既往歴】23歳時からRA。最近約10年MTX8mg/週を服用。【現病歴】2014年6月に口蓋腫瘍、11月には鼻翼基部腫瘍が出現し、12月当初診。【初診時現症】全身状態良好。左鼻翼基部の半球状腫瘍と口蓋右側に潰瘍を伴う境界明瞭な丘状腫瘍。【画像所見】CTでは、口蓋腫瘍は造影性に乏しく、頸部リンパ節は軽度腫脹。さらに、腋窩・腹部大動脈周囲・鼠径部のリンパ節も腫大。【血液検査所見】EB-VCA-IgGとEBV-NA抗体がそれぞれ基準値の320倍、20倍であった。【病理組織学的所見】口蓋腫瘍は濾胞形成を伴う多彩なリンパ球系細胞(CD20・CD79a・CD10陽性B細胞主体)の増殖からなり上皮島を形成していた。【病理診断】MTX-LPD。【処置と経過】整形外科と血液内科に対診しMTXを休薬すると、約2週間で腫瘍は縮小し、3か月で完全に消失。9か月経過して再発はない。【考察】臨床的に悪性リンパ腫が疑われる場合、MTX長期服用症例ではMTX-LPDの可能性を考慮する必要がある。

P-19-20 妊娠中に発症した舌扁平上皮がんの治療経験
A case of tongue squamous cell carcinoma with a pregnant patient

○高岡 昇平¹、内田 文彦¹、山縣 憲司¹、大津 雄人¹、菅野 直美¹、伊藤 寛之²、長谷川 正午¹、鬼澤 浩司郎^{2,3}、柳川 徹¹、武川 寛樹¹

¹筑波大学医学医療系 顎口腔外科学、²茨城県厚生連総合病院水戸協同病院 歯科口腔外科、³筑波大学附属病院 水戸地域医療教育センター

Shohei Takaoka¹, Fumihiko Uchida¹, Kenji Yamagata¹, Yuto Otsu¹, Naomi Kanno¹, Hiroyuki Ito², Shogo Hasegawa¹, Kojiro Onizawa^{2,3}, Toru Yanagawa¹, Hiroki Bukawa¹
¹Department of Oral and Maxillofacial Surgery, University of Tsukuba, Ibaraki, Japan, ²Dental and Oral Surgery, Mito Kyodo General Hospital, Ibaraki, Japan, ³Mito Clinical Education and Training Center, Ibaraki, Japan

妊娠中に悪性腫瘍が発生する頻度は1/1000~1500例とされ、顎口腔領域での報告は非常にまれである。妊娠と悪性腫瘍が合併した場合、母体と胎児に対する腫瘍および治療の影響、治療法の選択と施行時期など考慮すべき点は多い。今回、妊娠中に発症した舌扁平上皮がんの治療を経験したので報告する。【症例】35歳、女性。主訴:舌の疼痛。既往歴:特記事項なし。現病歴:舌の疼痛を自覚し近医受診した。舌がんが疑われたが妊娠9週のため専門病院での治療を希望し、当科紹介受診となった。現症:妊娠9週で全身状態良好であった。頸部リンパ節の腫脹はみとめず、左舌側縁に15x13mm大の潰瘍を伴う硬結を認めた。臨床診断:左舌がん(T1N0M0)。処置および経過:産科併診のもと妊娠11週で全身麻酔下で舌部分切除術を施行した。初回手術後5か月に顎下リンパ節に後発転移を認めたため、妊娠34週で胎児心拍をモニタリングしながら根治的頸部郭清術を施行した。術後より子宮収縮があったため、リトドリン塩酸塩を2日間投与した。病理組織診断で2つの顎下リンパ節に転移、被膜外浸潤をみとめ、術後化学放射線療法を施行予定とした。妊娠38週で帝王切開が施行され、2805gの児を出生し先天異常は認めず、人工栄養下にて順調に成長している。頸部郭清術9週後より化学放射線療法(RTx:59.4Gy/33Fr + Cetuximab)を施行し、治療後5か月経過した現在再発、転移は認めていない。

P-19-21

舌に発生した筋肉内脂肪腫の 1 例
A case of intramuscular lipoma of the tongue

○柚島 宏和¹、橘 進彰¹、石田 優¹、辻 和志¹、松田 彩¹、古森 孝英²

¹ 加古川東市民病院 歯科口腔外科、² 神戸大学大学院医学研究科 外科系講座口腔外科学分野

Hirokazu Yutori¹, Akira Tatibana¹, Suguru Isida¹, Kazuyuki Tuji¹, Aya Matuda¹, Takahide Komori²
¹Department of Oral Maxillofacial Surgery, Kakogawa East City Hospital, Hyogo, Japan, ²Department of Oral Maxillofacial Surgery, Kobe University Graduate School of Medicine, Hyogo, Japan

【諸言】筋肉内脂肪腫は、脂肪腫全体の 1.8% を占める良性軟部組織腫瘍である。発生部位は、四肢に起こることが多く、口腔領域に発生することは極めてまれである。今回われわれは舌に発生した筋肉内脂肪腫の 1 例を経験したので、その概要を報告する。【患者】83 歳、男性。【主訴】右側舌の腫脹。【既往歴】特記事項なし。【家族歴】特記事項なし。【現病歴】舌が腫大している感じがする部分を確認、脂肪抑制 T1 強調 MRI で低信号を示す約 28 × 19 × 31 mm 大の腫瘤を認めた。【処置および経過】細胞診にて脂肪腫の診断を得て、舌筋肉内脂肪腫の臨床診断のもと、全身麻酔下に腫瘍摘出術を施行した。術後、発音、咀嚼などの運動障害や知覚麻痺は認められず、経過は良好で、術後 5 か月が経過しているが、再発は認められていない。【病理組織学的所見】腫瘍は成熟した大小不同の脂肪細胞の増殖から成り、内部に横紋筋線維束の小結節が認められ、筋肉内脂肪腫と考えられる組織像を示していた。【病理組織学的診断】筋肉内脂肪腫。【結語】83 歳男性の舌筋肉内脂肪腫の 1 例を経験したので報告した。

P-19-23

右下顎歯肉に発生した spindle cell sarcoma の一例
A case of spindle cell sarcoma of the right mandibular gingiva

○長谷川 稔洋¹、大山 定男¹、小川 千晴¹、福田 仁¹、加島 義久¹、山内 智博¹、内田 育弘^{1,2}、寺尾 保信³、大隈 知威⁴、元井 亨⁵

¹ がん・感染症センター都立駒込病院 歯科口腔外科、² 日野市立病院 歯科口腔外科、³ がん・感染症センター都立駒込病院 形成再建外科、⁴ がん・感染症センター都立駒込病院 骨軟部腫瘍科、⁵ がん・感染症センター都立駒込病院 病理科

Toshihiro Hasegawa¹, Sadao Ohyama¹, Chiharu Ogawa¹, Jin Fukuda¹, Yoshihisa Kashima¹, Tomohiro Yamauchi¹, Ikuhiro Uchida^{1,2}, Yasunobu Terao¹, Tomotake Ohkuma¹, Tohru Motoi¹
¹Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Tokyo Metropolitan Cancer and Infectious Diseases Center Komagome Hospital, Tokyo, Japan, ²Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Hino Municipal Hospital, Tokyo, Japan, ³Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Tokyo Metropolitan Cancer and Infectious Diseases Center Komagome Hospital, Tokyo, Japan, ⁴Department of Bone and soft tissue oncology, Tokyo Metropolitan Cancer and Infectious Diseases Center Komagome Hospital, Tokyo, Japan, ⁵Department of Pathology, Tokyo Metropolitan Cancer and Infectious Diseases Center Komagome Hospital, Tokyo, Japan

【諸言】肉腫は、間葉系組織である骨軟部組織に発生する悪性腫瘍で、悪性腫瘍全体に占める割合は約 1% であり、さらに頭頸部領域に発生するのはまれである。また、肉腫の希少性と分化の多様性から多彩な像を示すため病理診断に難渋することがある。今回、我々は右下顎歯肉に発生した spindle cell sarcoma の一例を経験したので報告する。【症例と経過】71 歳、男性。主訴は右下顎歯肉の腫脹。口腔内所見では、右下 3 ~ 右下 6 の歯肉に 30 mm 大の弾性硬な腫瘍を認め、生検で spindle cell sarcoma との診断を得た。頸部リンパ節、肺などに転移を認めないため、2008 年 4 月に全身麻酔下に下顎骨区域切除を実施。病理組織検査の結果は、紡錘形細胞を主体とした異型細胞が密に増殖しているが、腫瘍性の骨形成や軟骨形成は明らかではない、分化の方向性が不明な high grade な spindle cell sarcoma, NOS であった。術後化学療法を希望されず切除断端陰性であったため経過観察を行っていたが、2009 年 4 月に右顎下部にスキップ転移、7 月に右副神経リンパ節転移を認めた。再発術後の化学療法として MAID 療法を 4 クール、放射線治療を行ったが、2010 年 12 月に右顎下リンパ節転移、2011 年 4 月に頸部リンパ節と肺に多発転移、5 月に大腿骨、骨盤にも多発転移を認め、5 月下旬に呼吸不全のため永眠された。【結語】頭頸部領域の肉腫はまれであるため診断や治療に難渋する。今後、多施設での検討が必要であると考えられる。

P-19-22

シェーグレン症候群との関連が示唆された口蓋 MALT リンパ腫の 1 例
A case of MALT lymphoma of the hard palate suggesting an association with Sjogren's syndrome

○鈴木 崇嗣¹、金丸 健太¹、逢坂 竜太¹、吉田 佳史¹、関根 理予¹、佐々木 剛史¹、加藤 久視¹、大鶴 光信¹、青木 隆幸¹、太田 嘉英¹、金子 明寛¹、秋庭 健志²

¹ 東海大学医学部 外科学系口腔外科学、² 東海大学医学部専門診療学系 放射線治療学

Takatsugu Suzuki¹, Kenta Kanamaru¹, Ryuta Osaka¹, Yoshifumi Yoshida¹, Riyo Sekine¹, Masashi Sasaki¹, Hisashi Kato¹, Mitsunobu Otsuru¹, Takayuki Aoki¹, Yoshihide Ota¹, Akihiro Kaneko¹, Takeshi Akiba¹
¹Department of Oral and maxillofacial Surgery, Tokai University, School of Medicine, Kanagawa, Japan, ²Department of Radiation Oncology, Tokai University, School of Medicine, Kanagawa, Japan

MALT (Mucosa-associated lymphoid tissue) リンパ腫は 1983 年 Isaacson らによりその概念が提唱され、2008 年の WHO 分類では粘膜関連リンパ組織型辺縁帯 B 細胞リンパ腫として分類されている。唾液腺に発生するリンパ腫はその発症へのシェーグレン症候群の関与が示唆されている。今回われわれはシェーグレン症候群 (以下 SS) との関連が示唆された口蓋 MALT リンパ腫を経験したので、文献的考察を加えて報告する。【症例】71 歳、女性。【主訴】口の中が腫れてきた。【現病歴】歯科受診時に口蓋部の腫瘍を指摘され精査目的に当科紹介受診となった。初診時、右口蓋に周囲に発赤を伴う直径 7mm 大の弾性軟の無痛性腫瘍を認めた。造影 CT では軟組織の膨隆は認めるものの造影効果は乏しく、骨吸収は認めなかった。腫大した頸部リンパ節は認めなかった。【臨床診断】口蓋腫瘍。【処置および経過】組織生検にて MALT リンパ腫疑いの診断であり確定診断目的に局所麻酔下に切除術を施行した。病理組織学的診断：MALT リンパ腫。当院血液腫瘍内科へ依頼、FDG-PET を施行したところ口蓋部のみに集積を認めた。MALT リンパ腫の診断を踏まえ精査を進めたところ抗核抗体、抗 SS-A 抗体、ガムテスト、口唇腺生検のいずれも陽性であったことから SS の存在が明らかとなった。肉眼的に病変が切除されていたが、FDG 集積を認めたことに加え肉眼的にも再発を認め、口蓋部に放射線治療を施行、現在肉眼的にも病変は消失し経過観察中である。

P-19-24

口腔多発癌が生じた無汗性外胚葉形成不全症の一例
A case of oral multiple cancer in a patient with anhidrotic ectodermal dysplasia

○小林 孝憲¹、飯田 明彦¹、山田 瑛子¹、大貫 尚志¹、齋藤 太郎¹、成松 花弥¹

¹ 長岡赤十字病院 歯科口腔外科、² 新潟大学大学院医学歯学総合研究科 顎顔面口腔外科学分野

Takanori Kobayashi¹, Akihiko Iida¹, Eiko Yamada¹, Hisashi Ohnuki¹, Taro Saito¹, Kaya Narimatsu¹
¹Department of Dentistry and Oral Surgery, Nagaoka Red Cross Hospital, ²Division of Oral and Maxillofacial Surgery, Niigata, Japan

【緒言】無汗性外胚葉形成不全症 (AED) は、皮膚、毛、汗腺などの皮膚付属器および歯といった外胚葉由来組織の低形成を呈する遺伝性疾患である。今回、AED にもなる部分無歯症の経過観察中に口腔白板症が出現し、その後多発癌に進展した症例を経験したので報告する。【症例】24 歳、女性。家族歴：父親が AED で足底有棘細胞癌、肺癌にて 57 歳時に死亡。既往歴：AED で当院および某大病院皮膚科通院中。現病歴：某大病院にて部分無歯症に対し義歯を製作したが、調整につき当科を紹介され初診した。現症：全身所見：身長 149cm、体重 46kg。乳房の低形成が認められた。口腔外所見：頭髪、眉毛は薄く、老人様顔貌を呈していた。口腔内所見：現在歯は上下左右第一大臼歯のみで、口腔粘膜に異常はなかった。【処置および経過】義歯調整を続けていたが、27 歳時に左側上下顎臼歯部歯肉に白色変化が出現。徐々に拡大したため 29 歳時に生検を行い異型上皮の診断であった。30 歳時に扁平上皮癌へ進展し上顎骨部分切除術を施行した。31 歳時には左側頬粘膜切除断端部に再発するとともに左側頸部リンパ節の腫大がみられ、上顎骨全摘、左側根治的頸部郭清術ならびに補助的放射線治療を施行した。33 歳時に右側下顎小臼歯部に扁平上皮癌が出現したため、下顎骨辺縁切除術を行い、現在経過良好である。AED に口腔癌を併発した報告は見当たらず、発症メカニズムの解明などのため症例の蓄積が必要と思われる。

P-19-25

口腔癌治療におけるエコーガイド下末梢挿入型中心静脈カテーテルの有用性

Availability of peripherally inserted central venous catheter with ultrasound guidance in the oral cancer treatment

○金子 哲治¹、菅野 千敬²、山崎 森里生¹、遠藤 学³、門馬 勉³、武石 越郎⁴、長谷川 博¹

¹福島県立医科大学 歯科口腔外科、²国際医療福祉大学三田病院 頭頸部腫瘍センター、³大原総合病院 口腔外科・歯科、⁴鶴岡市立荘内病院 歯科口腔外科

Tetsuharu Kaneko¹, Chihiro Kanno², Morio Yamazaki¹, Manabu Endo³, Tsutomu Monma³, Etsuro Takeishi¹, Hiroshi Hasegawa¹

¹Department of Dentistry and Oral Surgery, Fukushima Medical University School of Medicine, ²Head and Neck Oncology Center, International University of Health and Welfare, Mita Hospital, ³Department of Oral Surgery and Dentistry, Ohara General Hospital, ⁴Department of Dentistry and Oral Surgery, Tsuruoka Municipal Shonai Hospital

【緒言】口腔癌の治療において、従来の中心静脈カテーテルは鎖骨下静脈や大腿静脈が選択されてきたが、これらの穿刺部位は気胸や感染のリスクが高いことから、安全性がきわめて高い末梢挿入型中心静脈カテーテル (peripherally inserted central catheter : PICC) が普及した。しかし、PICC は前腕部あるいは上腕部から穿刺するため、前腕部で留置した場合に肘を曲げることで滴下不良や、血管径が狭い部位からの留置による静脈炎や血栓のリスクが比較的高いという欠点がある。これを改善するため、近年ではエコーガイド下に上腕部への PICC 挿入 (US-PICC) が推奨されている。当科では、2007 年 4 月から PICC を使用しており、2014 年 2 月からは US-PICC を導入し、有用性を認めたので報告する。

【材料と方法】2014 年 2 月から 2015 年 9 月まで、7 人の口腔癌患者に US-PICC を実施した。穿刺血管の第一選択は尺側皮静脈、次に橈側皮静脈とした。エコーで尺側皮静脈および上腕動脈を特定し、穿刺を行った。穿刺は 22G 静脈留置針で行い、従来のセルジンガー法で Argyle PICC 4Fr × 60 cm (COVIDIEN 社) を留置した。【結果】尺側皮静脈への穿刺成功率は 100% で、穿刺時あるいは留置中の血管炎、血栓症の合併症はなく、適正に管理を行えばかなりの長期的留置も可能であった。【結論】PICC 挿入時のエコーは必須であり、PICC の目標達成につながる。

P-19-27

上顎悪性黒色腫を発生したアルツハイマー型認知症患者の 1 例

Malignant melanoma in the maxillary gingiva of the dementia patient: A case report

○桂野 美貴、石井 純一、八木原 一博、土田 絵梨
埼玉県立がんセンター 口腔外科

Miki Katsurano, Junichi Ishii, Kazuhiro Yagihara, Eri Tsuchida
Department of oral surgery, Saitama Cancer Center, Saitama, Japan

認知症はがん治療を行う上でさまざまな問題となり、しばしば標準治療を遂行できない。今回高齢の認知症患者の上顎歯肉に発生した悪性黒色腫の治療を経験した。患者：81 歳、男性。主訴：上顎歯肉の黒色斑。既往歴：糖尿病、アルツハイマー型認知症。経過：2013 年 7 月、近歯科で上顎歯肉の黒色斑を指摘され、当科受診。上唇粘膜から上顎歯肉に 10mm 大の黒色肉芽様病変伴う黒色斑を認めた。初診時臨床診断：悪性黒色腫。PET/CT で転移性病変なし。認知症があったが、同居の妻と長男の支援が得られることから、QOL 低下のないことを基本的に治療適応と判断。8 月に妻付き添いで個室管理の上、上唇～上顎歯肉腫瘍切除術、サージカルパックによる創部被覆、上顎義歯装着とし、手術翌日から経口摂取を開始、術後 9 日目に軽快退院した。経過観察中、口蓋粘膜黒色斑が目立つようになり、再発の診断。2014 年 4 月口蓋腫瘍切除術、テルダーミスによる創部被覆、上顎シーネ装着し、早々に経口摂取開始、術後 11 日目で退院となった。8 月に左顎下リンパ節転移を確認したが、本人、家族ともに手術の希望なく、外来で経過観察を行った。腫瘍は緩徐に増大し、2015 年 9 月 (転移確認後 1 年 1 か月) に全身に紫斑が出現し、DIC と診断した。特に苦痛症状なく、家族の希望もあり、往診医を導入し在宅管理とし、9 月下旬に死亡した。

P-19-26

頬粘膜癌術後の経過観察中に結核性頸部リンパ節炎を認めた 1 例

Development of cervical tuberculous lymphadenitis in a patient with buccal mucosa carcinoma

○平井 秀明、松川 祥、大迫 利光、田口 貴英、望月 裕美、富岡 寛文、島本 裕彰、原田 浩之

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 顎口腔外科学分野

Hideaki Hirai, Sho Matsukawa, Toshimitsu Osako, Takahide Taguchi, Yumi Mochizuki, Hirofumi Tomioka, Hiroaki Shimamoto, Hiroyuki Harada
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Graduate School, Tokyo Medical and Dental University, Tokyo, Japan

結核は全身臓器に認めうる疾患で、頸部リンパ節結核は肺外結核の中で胸膜炎に次いで多い。今回、左側頬粘膜癌術後の経過観察中に結核性頸部リンパ節炎を認めた 1 例を経験したので報告する。症例は 67 歳女性、既往に小児期の結核を認めた。左側頬粘膜癌 (cT2N1) の診断にて気管切開、頸部郭清、腫瘍切除、下顎辺縁切除、遊離前腕皮弁移植、分層植皮術を施行した。病理診断は中分化型扁平上皮癌で、顎下リンパ節に転移を 1 個認めた。術後 1 年 6 か月、右副神経リンパ節の腫大を認め、FDG-PET にて SUVmax 10.5 の FDG 集積を示し、頬粘膜癌の転移が疑われた。局麻下にリンパ節生検を施行し、caseous epithelioid cell granuloma の病理所見を認め、結核を疑った。胸部 CT にて活動性肺病変は認めず、痰症状も認めなかった。胃液・尿・便の抗酸菌培養は全て陰性であり、痰液の結核菌 PCR も陰性であったが、生検リンパ節の組織培養にて抗酸菌陽性、核酸同定法で M.tuberculosis と同定され、結核性頸部リンパ節炎と診断した。本学呼吸器内科にて、EB, PZA の 2 剤を含む 4 剤結核標準治療 (A) 法を施行した。結核性頸部リンパ節炎の診断は難渋することがあるため、同疾患を疑う場合は、リンパ節生検時に組織培養検査も提出することが早期の診断・治療につながると思われる。

P-19-28

両側頸部リンパ節転移をきたした舌腺扁平上皮癌の 1 例

A case of adenosquamous carcinoma of the tongue metastasized to the bilateral cervical lymph nodes

○藤永 桃歌¹、佐藤 徹¹、館原 誠晃¹、戸田 麗子¹、井出 信次¹、関谷 秀樹²、里村 一人¹

¹鶴見大学歯学部 口腔内科学 (口腔外科学第二) 講座、²東邦大学医療センター大森病院 口腔外科

Momoka Fujinaga¹, Toru Sato¹, Seiko Tatehara¹, Reiko Toda¹, Shinji Ide¹, Hideki Sekiya², Kazuhito Satomura¹
¹Department of Oral Medicine and Stomatology, School of Dental Medicine Tsurumi University, Yokohama, Japan, ²Department of Oral Surgery, School of Medicine, Toho University, Tokyo, Japan

腺扁平上皮癌は扁平上皮癌と腺癌の病理像を併せ持つまれな疾患で、予後不良とされている。今回左舌縁に発生した本疾患の 1 例を経験したので報告する。患者：64 歳の男性。主訴：左舌縁の接触痛。現病歴：初診の半年前に舌の接触痛を自覚し、1 か月前から同部が潰瘍化してきたために当科初診となった。現症：左舌縁に小潰瘍を伴って中央が深く陥凹した 30 × 20 × 20 mm の硬結を認めた。画像検査では頸部転移や遠隔転移を示す所見はなかった。処置と経過：生検にて腺扁平上皮癌と診断された。舌癌 T4aN0M0 の臨床診断下に舌垂全摘出術と左頸部郭清術を行い、舌は腹直筋皮弁にて即時再建した。病理検査にて Level II に被膜外浸潤を伴うリンパ節転移を 3 個認めたため CCRT を施行した。術後 9 か月で舌骨の右外側にリンパ節転移をきたし、右頸部郭清術を施行した。病理検査にてこのリンパ節にも被膜外浸潤を認めたため、右頸部に再度 CCRT を施行した。病理所見：表層近くでは角化傾向を示す扁平上皮癌で、深部では異型の著しい腫瘍細胞が筋線維に沿って増殖しており、神経周囲浸潤を認めた。表層近くの腫瘍細胞には管腔構造をなす部分が散見された。リンパ節転移巣は両側とも原発巣と同様に扁平上皮癌と腺癌の混在像を呈しており、後者では立方状の腫瘍細胞からなる管腔構造が明瞭であった。右頸部郭清術から 1 年で再発や遠隔転移の兆候はないが、今後も厳重な経過観察を行う予定である。

P-19-29

鼻唇溝皮弁を用いた口腔再建症例の臨床的検討
Clinical evaluation of lip reconstruction with nasolabial flap

○迎 まりえ、篠崎 勝美、竹下 裕子、緒方 絹子、原田 真知子、
武富 孝治、岩本 修、楠川 仁悟
久留米大学病院医学部 口腔医療センター

Marie Mukae, Katsumi Shinozaki, Yuko Takeshita, Kinuko Ogata, Machiko Harada, Takaharu Taketomi, Osamu Iwamoto, Zingo Kusakawa
Dental and Oral Medical Center, Kurume University School of Medicine

【緒言】鼻唇溝皮弁は、以前より局所皮弁として口腔再建に利用されている。今回われわれは鼻唇溝皮弁を用いて口腔再建を行った 5 症例について臨床的に検討し報告する。【対象・方法】対象は当センターで口唇・口腔癌に対し、口唇全層切除を行い鼻唇溝皮弁を用いて再建した 5 症例について、臨床的検討した。【結果】5 症例の平均年齢は 71.6 歳、性別は男性 1 例、女性 4 例であった。原疾患は下唇 2 例、上唇 2 例、唇交連 1 例であった。切除は全て、口唇の全層切除が行われていた。病理組織学的診断は、扁平上皮癌 3 例、疣贅癌 1 例、エクリン腺癌 1 例であった。T 分類は T1 が 1 例、T2 が 3 例、T3 が 1 例であった。【考察】鼻唇溝皮弁は、採皮部の傷が鼻唇溝に一致するため、術後の瘢痕が目立ちにくく移動性も良いことから、適応範囲が広く腫瘍切除後の審美的、機能的要素の回復を図ることが可能である。【結論】口唇切除後の再建として鼻唇溝皮弁は有用であった。

P-19-31

麻布赤坂・芝歯科医師会における口腔がん検診の取り組みとその現状

The efforts and the present state of the oral cancer screening in Azabu-Akasaka and Shiba Dental Association

○柳下 寿郎¹、児玉 重明²、矢島 正隆³、岡 和雄³、
荘司 洋文⁴、岡部 貞夫¹

¹日本歯科大学附属病院 歯科放射線・口腔病理診断科、²(公社) 東京都港区麻布赤坂歯科医師会、³(公社) 東京都港区芝歯科医師会、⁴日本歯科大学附属病院 口腔外科

Hisao Yagishita¹, Shigeaki Kodama², Masataka Yajima³, Kazuo Oka³, Hirohumi Shouji⁴, Sadao Okabe¹

¹Division of Oral Diagnosis, Dental and Maxillofacial Radiology and Oral Pathology Diagnostic Service, The Nippon Dental University Hospital, ²Azabu-Akasaka Dental Association, ³Shiba Dental Association, ⁴Oral and Maxillofacial Surgery, The Nippon Dental University Hospital

港区では麻布赤坂歯科医師会と芝歯科医師会が相互に連携しながら地域歯科医療を担っている。口腔がん検診事業においても両会が様々な情報を共有し、地域住民、在勤者の口腔がんに対する啓発活動を行い、口腔がんの早期発見が出来るように日々取り組んでいる。会員が口腔がん検診事業を実施するに当たり、両会は共同して年 3～4 回の口腔がんに関連する講習会を催し、会員のスキルアップを図っている。【対象】平成 20 年 6 月から平成 26 年 12 月末までに個別あるいは集団（平成 25 年から）口腔がん検診を 565 名が受診した。【結果】女性 285 名、男性 280 名で、年代別では 60 歳代 139 名、50 歳代 108 名、40 歳代 97 名であった。部位別では舌 34.2%、頬粘膜 28.8%、下顎歯肉 13.6%、口蓋 8.2%、上顎歯肉 4.3%、口底 3.8%、その他 7.1%であった。診断結果は異常無し 356 名、要経過観察 127 名、要精査 42 名、その他 23 名であった。要精査中 10 名に悪性腫瘍が認められ、加療となった。悪性腫瘍の検出率は 1.77%であった。細胞診検査が実施された部位は 184 か所で、診断結果は Class I 145 名（1 名が悪性腫瘍）、II 20 名、III 16 名（1 名が悪性腫瘍）、IV 1 名、V 1 名で、4 名の口腔がん患者を発見した。【まとめ】両会が主体となり、会員および地域住民、在勤者の口腔がんへの関心を高め、口腔がんの早期発見に努めていく。

P-19-30

口腔内多発性粘膜神経腫により診断された多発性内分泌腫瘍症 2B 型の 1 例

A case of multiple endocrine neoplasia type 2B diagnosed on the basis of multiple mucosal neuromas in the oral cavity

○前川 裕貴、河原 康、近藤 佑亮、大平 芽実、小栗 崇、
山本 圭一
岐阜県立多治見病院 歯科口腔外科

Yutaka Maekawa, Kou Kawahara, Yusuke Kondo, Memi Ohira, Tkashi Oguri, Keiichi Yamamoto
The Oral and Maxillofacial Surgery, Gifu Prefectural Tajimi Hospital, Gifu, Japan

【緒言】多発性内分泌腫瘍症 (multiple endocrine neoplasia, 以下 MEN) は、複数の内分泌腺に特定の組み合わせで腫瘍が生じる疾患である。中でも MEN2B 型は口腔内に多発する粘膜神経腫が必発し、甲状腺髄様癌・褐色細胞腫に合併する稀な疾患である。我々は、舌、口唇、歯肉に生じた口腔内多発性粘膜神経腫により、MEN2B 型と確定された 1 例を経験したので、概要を報告する。【症例】27 歳男性【現病歴】幼少期より口唇・舌の小結節を自覚。2015 年 7 月呼吸苦にて当院救急搬送。両側副腎褐色細胞腫クリーゼの診断の下、当院に入院。【現症】顔貌は細長、手足が長く (Marfan 兆候)、上下唇の腫大を認めた。口腔内の舌尖、舌側縁および舌背部、上顎歯肉に多数の小腫瘍を認めた。【臨床診断】MEN2B【経過】舌・上顎歯肉・口唇の結節に対して生検術を施行。すべて神経線維腫の診断であった。両副腎褐色細胞腫・甲状腺髄様癌の存在もあり、MEN2B と診断された。【考察】MEN は 3～4 万人に 1 人の割合で生じるとされ、中でも MEN2B 型は 7% 程度であり、極めて稀な疾患である。口腔に生じる粘膜神経腫は肉眼的に観察しうる部位に多発性に出現し、特徴的な顔貌を呈する。粘膜下神経腫は、幼少期より認める場合が多く、MEN の早期発見の重要性を考えると、粘膜神経腫および MEN を十分に認識する必要があると考えられた。

P-19-32

新たな口腔がん検診システムの構築を目指して

Toward the improvements of the oral cancer screening system

○岩田 洋^{1,2}、横澤 茂^{2,3}、滑川 初枝^{2,3}、小林 建⁴、畑下 友美⁴、
大嶋 依子^{2,5}、関川 陽子^{2,5}、岩上 麻由香^{2,5}、植松 裕美^{2,5}、
百瀬 恵美^{2,5}、中谷 泰志⁶、園田 茂晴⁶、柳下 寿郎^{1,2}

¹日本歯科大学附属病院 歯科放射線・口腔病理診断科、²歯科人間ドック、³日本歯科大学附属病院 総合診療科、⁴ルネス青山デンタルクリニック、⁵日本歯科大学附属病院 歯科衛生室、⁶デジタルワン株式会社

Hiroshi Iwata^{1,2}, Shigeru Yokozawa^{2,3}, Hatsune Namekawa^{2,3}, Ken Kobayashi⁴, Tomomi Hatashita⁴, Yoriko Oshima^{2,5}, Youko Sekikawa^{2,5}, Mayuka Iwagami^{2,5}, Hiromi Uematsu^{2,5}, Emi Momose^{2,5}, Yasushi Nakatani⁶, Shigeharu Sonoda⁶, Hisao Yagishita^{1,2}

¹Division of Oral Diagnosis, Dental and Maxillofacial Radiology and Oral Pathology Diagnostic Services, The Nippon Dental University Hospital, ²Dental Human Dock, ³General Dentistry, The Nippon Dental University Hospital, ⁴Reinass Aoyama Dental Clinic, ⁵Dental Hygienist office, The Nippon Dental University Hospital, ⁶Digital One, Inc

先人達が地域歯科医療に地道に取り組まれてきた結果、地域住民や在勤者の口腔がんに対する認知度、関心が高まり、一方でそれらの話題がネットやSNSメディアにより取り上げられ、多様な形で情報発信されているため口腔がん検診を受診される方が増加している。今回、当ドックではある会社から口腔がん検診の依頼を受けたことにより、これまでの検診システムを見直し、より質の高い検診を目指した。そのため、口腔がん検診のシステムを作成している企業と連携して本検診を行うことにした。本学会ではその検診結果の概要を報告する。本検診は企業側の施設に行き、7 日間で計 82 名について検診を行う。使用する主要な機器は Velscope、カメラ、iPad である。検査者は当センターに所属する歯科医師と歯科衛生士で、2 人 1 組になって検診を行う。事前に個人情報と問診票の結果を iPad に入力し、検診当日は円滑に検診が実施できるようにする。検診の流れとしては、視診・触診を歯科医師が実施、Velscope 検診・口腔内写真撮影は歯科医師と衛生士の 2 人でやり、その後衛生士がう蝕・歯周病検診を行う。この間に歯科医師は撮影画像を iPad に入力、検診報告書を作成、印刷し、う蝕・歯周病検診の結果と併せて患者に説明を行う (所要時間 45 分)。細胞診検査が必要な場合にはその場で同検査を実施し、その施設内で染色、鏡検し、検診同日に細胞診検査の結果を報告する。

P-19-33 口底癌頸部郭清術後に創部に多発した縫合糸膿瘍の1例
A case of multiple suture abscess after neck dissection of oral floor carcinoma

○古藤 悠希¹、野口 忠秀¹、森 良之¹、神部 芳則¹、土屋 欣之¹、早坂 純一¹、岡田 成生¹、大谷津 幸生¹、山下 雅子¹、西原 良治¹、今野 悠¹、去川 俊二²
¹自治医科大学医学部 歯科口腔外科講座、²自治医科大学医学部 形成外科学講座

Yuki Koto¹, Tadahide Noguchi¹, Yoshiyuki Mori¹, Yoshinori Jinbu¹, yoshiyuki tsuchiya¹, Jyunichi Hayasaka¹, Naruo Okada¹, Yukio Ooyatsu¹, Masako Yamashita¹, Ryoji Nishihara¹, Yu Konno¹, Syunji Sarukawa²
¹Department of Dentistry, Oral and Maxillofacial Surgery, Jichi Medical University, ²Department of Plastic Surgery, Jichi Medical University

【緒言】頭頸部悪性腫瘍の術後に縫合糸膿瘍に遭遇することがしばしばあるが、局所再発やリンパ節転移との鑑別を要することがある。今回われわれは、口底癌に対する頸部郭清術後の創部に多発した縫合糸膿瘍の1例を経験したので報告する。【患者】患者は71歳女性。初診2014年6月下旬。【主訴】口底の腫れ。【現病歴】2014年6月頃、右口底部腫脹を自覚し近歯科医院受診し同部の精査加療目的に当科紹介。【既往歴】甲状腺機能低下症、腎盂腎炎。【現症】右側口底にやや隆起した潰瘍性病変を認めた。【処置及び経過】右側口底扁平上皮癌（T2N0M0）の診断のもと全身麻酔下に両側肩甲骨筋頸部郭清術、口底腫瘍切除、左側遊離前腕皮弁による再建術を行った。術後約2か月、両側頸下部から頸部の切開創に一致した皮下膿瘍を認めた。CT、MRI所見でも頸部皮下にrim enhancementを伴った多発腫瘍を認め、FDG-PETでも同部に集積を認め頸部リンパ節転移は否定できなかった。局所麻酔下に右側頸下部の皮下膿瘍の切開ならびに左側頸部の皮下膿瘍に対し摘出生検を施行したところ、内部より縫合糸が確認できた。摘出物の病理組織学的所見でも縫合糸による異物反応に相当する組織像であった。また術後の舌拘縮に対し全身麻酔下に修正術を行った際に、左側深頸部の腫瘍と、左上腕の皮弁採取部の腫瘍も摘出したところ、同様の病理組織像であった。現在、再発転移の所見なく、創部に膿瘍の再発も認めていない。

P-19-35 口腔に生じた基底細胞腺癌の4例
Basal cell adenocarcinoma in oral cavity: 4 Clinical cases

○生田 稔¹、平井 秀明²、島本 裕彰²、富岡 寛文²、望月 裕美²、松川 祥²、及川 悠²、小野里 祐佑²、山形 優子²、原田 浩之²、栢森 高³
¹さいたま赤十字病院 口腔外科、²東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 顎口腔外科学分野、³東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 口腔病理学分野

Minoru Ikuta¹, Hideaki Hira², Hiroaki Shimamoto², Hirohumi Tomioka², Yumi Mochizuki², Syou Matsukawa², Yu Oikawa², Yusuke Onozato², Yuuko Yamagata², Hiroyuki Harada², Kou Kayamon³
¹Department of Oral Surgery, Saitama Red Cross Hospital, ²Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Tokyo Medical and Dental University, ³Department of Oral Pathology, Tokyo Medical and Dental University

基底細胞腺癌（BCAC）は、主に耳下腺に発症する低悪性の唾液腺腫瘍であり、小唾液腺の由来は稀である。当科で経験した4例を報告する。症例1：76歳、男性。右上顎大臼歯部の違和感を主訴に当科初診した。生検では基底細胞癌の診断で、右側上顎全摘・腹直筋皮弁再建術を施行した。手術標本にてBCACの診断を得た。術後経過良好も8年で他因死亡した。症例2：69歳、女性。右硬口蓋部の腫脹を主訴に当科初診した。生検では悪性唾液腺腫瘍の診断で、右側上顎全摘、左側上顎部分切除、分層植皮術を施行した。手術標本ではBCACの診断で、切除断端陰性も、術後1年で原発巣再発を認め、陽子線照射施行した。その後、頸部リンパ節転移を認め、セツキシマブを投与するも、術後3年で原病死した。症例3：84歳、女性。口蓋正中に腫瘍を主訴に当科初診した。生検にて唾液腺腫瘍の診断を得て、切除施行した。切除標本はBCACの診断で、術後2年経過し予後良好である。症例4：72歳、女性。右頬粘膜の腫瘍を主訴に当科初診した。生検にて基底細胞腺癌の診断で切除施行するも、切除標本にてBCACの診断であり、断端陽性のため追加切除施行した。術後3か月に経過良好である。BCACは無痛性に発症して増大するため、発見が遅れることがある。本来、低悪性であるが、予後不良症例を1例経験した。本症例は、原発巣が進展していたことが一因と考えられ、病変の早期発見、早期治療が望まれる。

P-19-34 BRONJ治療後の骨改造機転により誘発され局所の急速増大を示した多発性骨髄腫の1例
A case of multiple myeloma showed a rapid growth involving maxillary bone and gingiva after sequestrectomy

○銅前 昇平、矢尾 真弓、吉岡 徳枝、梅原 亜矢子、堀江 宙史、佐々木 朗
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 口腔顎顔面外科学分野

Shohei Domae, Mayumi Yao, Norie Yoshioka, Ayako Umehara, Hirohumi Horie, Akira Sasaki
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Okayama University Graduate School of Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences

【諸言】多発性骨髄腫は、形質細胞の悪性腫瘍であり、異型の形質細胞が骨髄内で増殖し免疫グロブリンを単クローン性に産生することを特徴とする。一方、髄外性形質細胞腫は形質細胞が存在するあらゆる部位に出現するといわれており、無痛性腫瘍を形成する。今回われわれはBRONJ腐骨分離除去後の骨改造機転により誘発され、局所の急速増大を示した多発性骨髄腫の1例を経験したので報告する。【症例】82歳男性。200X年、多発性骨髄腫の診断にて紹介元内科にて化学療法を開始、200X年以降はゾレドロン酸投与も開始された。201X年2月、抜歯を契機とした右側上顎骨露出と排膿を主訴に当科紹介初診となった。CTにて右側上顎小臼歯から大臼歯相当部では骨が腐骨様に分離していた。BRONJの診断のもと経過観察を行い、約1年後の201X年2月、同部の腐骨除去を行った。原疾患の多発性骨髄腫は継続して寛解状態であったが、同年7月ごろより骨分離部位に一致し肉芽腫性腫瘍の急速増大を認めた。生検を施行し、髄外性形質細胞腫との病理組織診断を得た。本症例では放射線療法を選択し同部腫瘍は消失したが、翌年201X年1月、化学療法不応となり永眠された。【考察】本症例の発症部位は、ゾレドロン酸投与による顎骨壊死の骨分離後の骨改造現象が活発な部位と一致していた。BRONJが多発性骨髄腫の局所の悪性化を惹起したと示唆される所見で、担癌状態においては腐骨分離後も十分な経過観察が必要と思われた。

P-19-36 角化嚢胞性歯原性腫瘍における歯牙の温存について
Teeth preservation in KCOT treatment with "Dredging Method"

○大廣 洋一、格口 渉、鄭 漢忠
北海道大学大学院歯学研究所 口腔病態学講座口腔顎顔面外科学教室

Yoichi Ohno, Wataru Kakuguchi, Kanchu Tei
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Graduate School of Dental Medicine, Hokkaido University

【目的】角化嚢胞性歯原性腫瘍（以下KCOT）の治療において、歯牙の温存は口腔の機能において重要である。しかし、歯牙を温存することで病変も残存させる可能性があることから、しばしば病変に含まれる歯牙の処置方針が問題となる。今回、われわれは歯牙の温存がKCOTの治療成績に影響を及ぼすか検討した。【対象と方法】当科ではKCOTに対して反復処置法を施行している。2005年3月から2014年2月までに、北海道大学病院口腔外科を受診し、病理でKCOTと診断された未治療例で、1年以上経過観察を行った36人、42病変を対象とした。画像所見にて根尖を含んでいたのは17人18病変であった。経過観察期間は12-112ヶ月（中央値33ヶ月）であった。【結果】病変に含まれていた歯牙は37本であった。保存不可能または病変をとりきれない4本に対して抜歯を行った。抜歯に至った歯牙は4本であった。歯根端切除術は7本に施行した。再発は42病変中2病変で（5%）に認め、いずれも歯根を含む病変であった。再発した病変に対して摘出または反復処置を施行し歯牙は温存した。【結論】KCOTに含まれる歯牙を温存することは、歯根周囲に病変を残存させる可能性はあるが、病変の再発率は5%であり、早期に対応することで病変を除去し、かつ歯牙の温存が可能であった。以上より、KCOTに含まれる歯牙は可能な限り温存すべきである。

ご案内
プログラム
特別講演
招聘講演
シンポジウム
ワークショップ
ワーキングセッション
学術セミナー
アブストラクトセッション
イノベーションセミナー
看護師・歯科衛生士セッション
フェイスセッション
インターネットホスティング
一般演題
発表者別索引

P-19-37

当科における口腔癌同時性重複癌の検討

A clinical study of oral cancer patients with synchronous double cancer in our hospital

○大澤 昂平、小栗 千里、大橋 伸英、高山 香名子、上田 潤、飯田 昌樹、岩井 俊憲、中島 英行、筑丸 寛、小泉 敏之、廣田 誠、來生 知、光藤 健司、藤内 祝

横浜市立大学大学院医学研究科 顎顔面口腔機能制御学

Kohei Osawa, Senri Oguri, Nobuhide Ohashi, Kanako Takayama, Jun Ueda, Masaki Iida, Toshinori Iwai, Hideyuki Nakashima, Hiroshi Chikumar, Toshiyuki Koizumi, Makoto Hirota, Mitomu Kioi, Kenji Mitsudo, Iwai Tohna
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Yokohama City University Graduate School of Medicine, Yokohama, Japan

【諸言】口腔癌における重複癌の発生率は他部位の悪性腫瘍患者における発生率よりも高いとされている。重複癌は治療方針に関わる重要な因子であり、多臓器に対するスクリーニング検査の重要性が報告されている。また、近年の癌患者の高齢化や診断技術の進歩により重複癌患者の増加も報告されている。今回われわれは当科を受診した口腔癌患者の全身スクリーニング検査によって発見された同時性重複癌について検討したので報告する。【対象・方法】2009年1月から2014年12月までの6年間に当科を受診した口腔癌患者662例。画像検査（CT, MRI, US, PETなど）、内視鏡検査にて全身スクリーニング検査を行った。【結果】同時性重複癌は31例（4.68%）に認められた。内訳は男性26例、女性5例であった。部位別では食道癌：10例、大腸癌：8例、胃癌：6例、肺癌：5例、乳癌：2例、肝癌：1例、膵癌：1例であった。そのうち三重癌は2例に認められた。喫煙歴と飲酒歴の習慣のあるものは、それぞれ21例（67.74%）、22例（70.97%）に認められた。【結語】口腔癌患者における全身スクリーニング検査は同時性重複癌を発見する目的において有用であり、特に喫煙歴、飲酒の習慣がある患者はその可能性が高いということが示唆された。

P-19-38

当科における転移性口腔癌の臨床的検討

A clinical study of metastatic tumors in the oral cavity in our hospital

○小杉 泰史、小栗 千里、大橋 伸英、高山 香名子、大屋 貴志、上田 潤、飯田 昌樹、岩井 俊憲、中島 英行、筑丸 寛、小泉 敏之、廣田 誠、來生 知、光藤 健司、藤内 祝

横浜市立大学大学院医学研究科 顎顔面口腔機能制御学

Yasufumi Kosugi, Senri Oguri, Nobuhide Ohashi, Kanako Takayama, Takashi Oya, Jun Ueda, Masaki Iida, Toshinori Iwai, Hideyuki Nakashima, Hiroshi Chikumar, Toshiyuki Koizumi, Makoto Hirota, Mitomu Kioi, Kenji Mitsudo, Iwai Tohna
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Yokohama City University Graduate School of Medicine, Yokohama, Japan

【目的】多臓器から口腔領域への転移性癌は口腔悪性腫瘍の数%に過ぎないが、予後は悪いとされている。今回われわれは当科における転移性口腔癌を臨床的に検討したので報告する。【対象と結果】2007年1月から2014年12月までの8年間に当科を受診した口腔悪性腫瘍新患例は869例であったが、その中の転移性口腔癌患者8例を対象とした。性別は男性6名、女性2名であった。年齢は59歳から80歳で平均年齢は67.6歳であった。原発部位は、肺2例、肝1例、大腸1例、十二指腸1例、甲状腺1例、腎1例、大腿1例であった。組織型は、腺癌と神経内分泌腫瘍がそれぞれ2例で、肝細胞癌、粘表皮癌、淡明細胞癌、悪性線維性組織球腫がそれぞれ1例であった。口腔内病変の発生部位は下顎が3例で最も多く、上顎が2例、舌、口底、顎下腺がそれぞれ1例であった。また、口腔内転移病変を機に原発巣が発見された1例を認めた。治療は陽子線治療、放射線治療、腫瘍切除がそれぞれ1例であった。その他5例は生検のみで口腔内病変に対しては治療は行わなかった。予後が確認できる症例は5例で、その内4例は7か月以内に死亡していた。陽子線治療を行った甲状腺より転移した症例の1例のみ6年5か月経過した現在も健在である。【結語】口腔癌の診断においては、転移性癌の可能性を考慮し、正確な病歴聴取や十分な審査が必要であると考えられた。