

全身倦怠感、湿性咳嗽、食思不振のため受診した80歳代女性

R B C	(386-492 × 10 ⁴ / μ L)	187	尿素窒素	(8.0-20.0 mg/dL)	7.2
H b	(11.6-14.8 g/dL)	7.7	クレアチニン	(0.46-0.79 mg/dL)	0.36
H t	(35.1-44.4 %)	23.0	血糖	(73-109 mg/dL)	98
M C V	(83.6-98.2 fL)	123.4	コリンエステラーゼ	(201-421 U/L)	103
M C H	(27.5-33.2 pg)	41.1	総蛋白	(6.6-8.1 g/dL)	4.9
M C H C	(31.7-35.3 %)	33.3	アルブミン	(4.1-5.1 g/dL)	3.0
血小板	(15.8-34.8 × 10 ⁴ / μ L)	4.4	L D	(124-222 U/L)	203
白血球	(3300-8600 / μ L)	1100	A S T	(13-30 U/L)	17
桿状核球		1.0	A L T	(7-23 U/L)	6
分葉核球		29.0	総ビリルビン	(0.4-1.5 mg/dL)	1.12
好酸球		0.0	直接ビリルビン	(0.00-0.20 mg/dL)	0.38
好塩基球		0.0	γ-G T P	(9-32 U/L)	13
単球		5.0	A L P	(106-325 U/L)	182
リンパ球		60.0	N a	(138-145 mmol/L)	142
異型リンパ球		5.0	K	(3.6-4.8 mmol/L)	3.2
網状赤血球	(0.3-2.5 %)	1.2	C l	(101-108 mmol/L)	108
C R P	(0.00-0.14 mg/dL)	0.80	C a	(8.8-10.1 mg/dL)	7.8
P T	(10.5-12.9 sec)	13.0	IgG	(861-1747 mg/dL)	838
A P T T	(23.0-40.0 sec)	38.1	IgA	(93-393 mg/dL)	180
フィブリンノーゲン	(155-415 mg/dL)	293	IgM	(56-269 mg/dL)	78
D-dimer	(<1.0 μ g/mL)	3.9	ハプトグロビン	(19-170 mg/dL)	20
AT	(80-120 %)	72			